




6nd



September 1899

R. W. Gibson - Inv.







# Flora von Mecklenburg

in

geographischer, geschichtlicher, systematischer,  
statistischer u. s. w. Hinsicht geschildert

von

**Ernst Boll.**

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

---

Neubrandenburg.

C. Brunsow. 1860.

Grundriss von Meissen

Verfasser: J. G. Meissen

Separatabdruck aus dem Archiv des Ver. der Freunde der  
Naturgeschichte in Meissenburg S. XIV.

Verlag

Verlag

Verlag

Verlag

	S.
Einleitung . . . . .	1
I. Die Artenrechte . . . . .	4
Wandelbarkeit der Wasserpflanzen . . . . .	9
Einfluß des salzhaltigen Bodens . . . . .	14
Aufzählung der Pflanzenvarietäten unserer Flora . . . . .	18
Die Bastardebildungen . . . . .	20
II. Die Pflanzennamen . . . . .	25
Die lateinischen Gattungs- und Speciesnamen . . . . .	25
Die plattdeutschen Pflanzennamen . . . . .	27
III. Das Bürgerrecht . . . . .	41
1. Die eingeborenen Pflanzen . . . . .	42
2. Die eingebürgerten Pflanzen . . . . .	43
3. Die erratischen (verwilderten und verirrt) Pflanzen Aufzählung aller diesen drei Classen angehörigen Pflanzen . . . . .	45 48
IV. Geographische Verbreitung der Pflanzen . . . . .	54
1. Die Haideflora . . . . .	57
Der Elbstrand und die Lewitz . . . . .	68
2. Die Sandflora . . . . .	70
3. Die Lehmflora . . . . .	74
Die Umgegend von Neubrandenburg . . . . .	76
Die Tolenze und andere Landseen . . . . .	87
4. Die Seestrands- und Salinenflora . . . . .	90
5. Die Dfsee-Flora . . . . .	96
V. Die Blüthezeit . . . . .	98
Pflanzenkalender für Mecklenburg . . . . .	100
VI. Die Nutzpflanzen und Giftpflanzen . . . . .	110
1. Pflanzen die zu culinarischen u. dgl. Zwecken dienen Geschichte derselben . . . . .	111 115
2. Die officinellen Pflanzen . . . . .	117
3. Aderweitige Nutzpflanzen . . . . .	127
4. Zauberpflanzen . . . . .	129
5. Zierpflanzen . . . . .	131
6. Giftpflanzen . . . . .	135

	S.
VII. Geschichte unserer Flora . . . . .	141
Literatur der Flora, chronologisch geordnet . . .	141
Die mecklenburgischen Botaniker und ihre Leistungen, alphabetisch geordnet . . . . .	146
Botan. Garten in Rostock und einige andere histor. Notizen . . . . .	178
VIII. Statistil der Flora . . . . .	179
Tabelle über die Entdeckungen der einzelnen Botaniker	179
Tabelle über die in den einzelnen Decennien gemachten Entdeckungen . . . . .	182
Statistil der Phanerogamen; vielleicht noch zu ent- deckende Arten . . . . .	182
Statistil der Farne; noch zu entdeckende Arten . .	192
der Laubmoose; desgl. . . . .	192
der Lebermoose; desgl. . . . .	193
der Algen; desgl. . . . .	194
der Flechten . . . . .	197
der Pilze . . . . .	198
IX. Systematische Aufzählung der Pflanzen . . .	201
1. Dicotyledonen . . . . .	203
2. Monocotyledonen . . . . .	302
3. Farne . . . . .	326
4. Laubmoose . . . . .	330
5. Lebermoose . . . . .	342
6. Algen . . . . .	346
7. Flechten . . . . .	355
8. Pilze . . . . .	362
X. Schluß (Berichtigungen und Zusätze) . . . . .	393
Register der Gattungsnamen . . . . .	398



Die Botanik ist die Wissenschaft, mit welcher ich meine naturhistorischen Studien zuerst begonnen habe. Schon im J. 1839 legte ich dem leider so früh verstorbenen Prof. Meyen in Berlin, dessen anregende botanischen Vorlesungen ich damals besuchte, eine von mir gefertigte tabellarische Uebersicht der meklenburgischen, pommerschen und holsteinischen Flora vor, und wurde von ihm zur Herausgabe derselben ermuntert. Die Veröffentlichung unterblieb aber, theils weil bald darauf andere Studien mich mehr fesselten, theils aber, weil ich Gelegenheit hatte mich zu überzeugen, wie sehr alle Ausgaben der gedruckten Florenverzeichnisse jener drei Länder, die ich bei der erwähnten Arbeit als Quellen benutzt hatte, einer sorgfältigen kritischen Revision bedurften, bevor sich ein zuverlässiges Resultat aus ihnen gewinnen ließe. Ich gab daher meinen Plan auf, und wendete nun fast gänzlich meine Thätigkeit einem noch brachliegenden Felde der vaterländischen Naturkunde zu, nämlich der Erforschung der Geognosie Mecklenburgs, indem ich mir dabei im Stillen mit der Hoffnung schmeichelte, daß inzwischen einer unserer vielen Botaniker, die das Studium der heimischen Flora ausschließlicher betrieben, als dies mit mir der Fall gewesen

war, uns mit einer neuen, sorgfältig gesichteten Uebersicht derselben beschenken würde.

Da aber diese Hoffnung unerfüllt blieb, entschloß ich mich endlich selbst wieder die Hand an das Werk zu legen. Mein früherer Plan genügte mir aber jetzt nicht mehr, denn seit dem J. 1839 hatten meine Anforderungen an eine Landes-Flora sich wesentlich gesteigert und erweitert. Dadurch aber waren auch die Schwierigkeiten, die sich mir in den Weg stellten, nur um so größer geworden, und oft noch, selbst nach dem Beginne der neuen Arbeit, war ich im Begriffe die Feder niederzulegen, weil ich fürchtete, meine Kräfte würden für dieselbe nicht ausreichen. Aber das lebhafteste Interesse, welches ich an der Sache selbst nahm, gestattete mir nicht, mich von derselben wieder los zu machen. So habe ich denn, freilich mit vielen Unterbrechungen, die Arbeit fortgesetzt, und sie nun, zwar nicht vollendet, aber doch zum Abschluß gebracht, was mir darum nöthig zu sein schien, weil sie mir täglich unter den Händen mehr und mehr anwuchs, und sie das bescheidene Maaß, welches die Geldmittel unseres Vereins für den Druck vorschreiben, weit zu überschreiten drohete.

Die Hülfsmittel, die mir bei dieser Arbeit zu Gebote gestanden haben, waren theils die sämmtlichen älteren, in dem langen Zeitraume von mehr als achtzig Jahren von den Freunden unserer Flora beschafften und an Werth sehr ungleichen literarischen Materialien, welche es hier nicht bloß zu sammeln, sondern auch zu prüfen, zu sichten und auf's Neue zu verarbeiten galt, — theils neue Mittheilungen vieler kenntnißreicher Botaniker, wie des Hrn. Dr. Betcke in Penzlin, des Hrn. Ober-Medic.

Rath Dr. G. Brückner in Ludwigslust, des Hrn. Dr. Fiedler in Dömitz, des Hrn. Pastor C. Griewank in Dassow, des Hrn. Apotheker F. Timm in Malchin, des Hrn. Dr. Weidner in Sülz, des Hrn. Zabel in Greifswald, des uns leider inzwischen durch den Tod entrissenen Wüstnei in Schwerin u. m. a., denen ich hier noch einmal öffentlich meinen Dank für ihre Mitwirkung ausspreche; endlich auch noch meine eigenen auf zahlreichen Excursionen in verschiedenen Landestheilen gesammelten Erfahrungen. — Die Art, wie diese Materialien verwendet sind, habe ich allein zu verantworten.

Die Aufgaben, welche ich mir zu besprechen gestellt habe, sind in der Kürze folgende: Erforschung der für viele Pflanzen unserer Flora noch streitigen Artenrechte; Feststellung der Pflanzennamen; Ermittlung derjenigen Pflanzenspecies, denen wirklich das Bürgerrecht in der mecklenburgischen Flora zukommt, sowie die Berichtigung ihrer Fundorte; Darlegung der geographischen Verbreitung dieser Pflanzen und Sonderung derselben in Gruppen, welche verschiedenen Perioden der Blüthezeit entsprechen; Angabe des Nutzens und Schadens, den die einheimischen Pflanzen stiften; Erörterung der Geschichte und Statistik unserer Flora; endlich eine systematische Aufzählung aller vom J. 1777 bis zum J. 1860 in Mecklenburg entdeckten Pflanzen. — Wir wollen diese einzelnen Punkte in dem Nachfolgenden noch etwas genauer ins Auge fassen. Wie aber immer aus denselbigen farbigen Glasstückchen durch Herumdrehen des Kaleidostops verschiedenartige Bilder hervorgebracht werden, muß auch ich zu den floristischen Bildern, die ich hier vorzuführen gedenke, mich immer derselben Objecte bedienen.



Die Gefahr, den Leser durch dies Verfahren zu ermüden, liegt sehr nahe, und ich bitte daher um Nachsicht, wenn es mir nicht gelingen sollte, diese Klippe glücklich zu umschiffen.

## I. Die Artenrechte.

Was zunächst die Abgränzung der einzelnen Pflanzenarten gegen einander betrifft, so fühle ich selbst sehr wohl, daß mir die Lösung dieser schwierigsten meiner Aufgaben nur sehr unvollkommen gelungen ist, und daß ich wahrscheinlich bei sehr vielen Botanikern durch die hier von mir befolgten Grundsätze großen Anstoß erregen werde. Ich kann mich nämlich, so weit meine eigenen Forschungen reichen, nicht davon überzeugen, daß alles das, was man in neuester Zeit als Species in Anspruch genommen hat, auch wirklich eine solche sei, sondern glaube, daß gar vieles ganz anders aufgefaßt werden müsse. Man hat sich hier (wie so oft nicht bloß im Leben, sondern auch in der Wissenschaft,) vor den Extremen zu hüten: der Speciesbegriff darf nämlich weder einem weiten Reifemantel gleichen, unter dem man gar manche Contrebande mit fortschaffen kann, noch auch einer Zwangsjacke, welche ihrem Träger auch nicht die geringste freie Bewegung gestattet. Während die älteren Botaniker gar häufig in das erste dieser beiden Extreme verfielen, sind in neuester Zeit die Floristen noch viel häufiger auf den zweiten jener Irrwege gerathen: Sie haben die Species mit wahrer „Kümmelspalterei“ auf die allerkleinsten Unterschiede begründet, und wenn sie dann die geringste Abweichung von dem Signalement auffinden, sind sie sogleich mit der Aufstellung einer neuen Species



fertig. Auf diese Weise sind in neuerer Zeit selbst sehr ansehnliche phanerogamische Pflanzenarten in mehrere Species zerlegt worden, welche in ihrem ganzen Habitus sich so gleich sind, daß man die Unterschiede kaum herausfinden kann. Aber die Natur spottet dieses künstlich hinaufgeschraubten Speciesbegriffes. Sie rächet sich an den Botanikern durch endlosen Hader über diese angeblichen Arten und durch endloses Verkennen derselben, indem sie sich in ihren Schöpfungen den so sehr ins Kleinliche gehende Diagnosen nicht immer gelassen fügt. Daher die vielen unglückseligen neuen Namen, welche die Folgen dieses Zwistes zu sein pflegen, und welche sicherlich da zum Vorschein kommen, wo die Pflanze sich nicht ganz genau dem polizeilichen Signalement der Diagnose anpassen will. So wächst die Masse der Synonymen lawinenartig von Tage zu Tage, und drohet mit baldigem Sturze Floras Reich unter einer starren und undurchdringlichen Decke zu begraben. — Und welcher Inconsequenz machen sich nicht die Naturforscher (denn das hier Gesagte gilt nicht von den Botanikern allein,) in der Verfolgung dieses Weges schuldig? Während sie einerseits durch die geringste Abweichung im Bau der Pflanzen und Thiere zur Creirung einer neuen Species sich berechtigt glauben, vertheidigen sie (wenigstens der Mehrzahl nach) noch immer die ebenso unberechtigte Meinung, daß alle habituell so sehr differirenden Menschen- und Hunderacen nur je eine einzige Species bildeten. Das heißt doch in der That Mücken durchseihen und Kameele mit Haut und Haar hinunterschlucken!

Wären die Floristen nicht so sehr dazu geneigt jede Erscheinung im Pflanzenreiche so isolirt aufzufassen, ohne

auf die Analogien Rücksicht zu nehmen, welche andere Pflanzen und selbst die Thierwelt darbieten, und welche zur Deutung des einzelnen vorliegenden Falles oft von großer Wichtigkeit sein können, so würde man den Speciesbegriff nicht willkürlich in so sehr enge Gränzen eingezwängt haben. Aber die subjective Beschaffenheit dieses künstlichen Begriffs verkennend, glaubt man daß er objectiv in der Natur begründet sei. Auch leistet ihm das fast jedem Floristen, man möchte sagen, angeborne Verlangen, als der Entdecker einer neuen Pflanzenspecies genannt zu werden, nicht geringen Vorschub, da es bei engen Speciesdefinitionen am leichtesten zu befriedigen ist. Ebenso auch die Sucht, für die Flora seines eigenen Landes eine möglichst große Anzahl von Pflanzenarten herauszurechnen; denn wie der erste jugendliche Ehrgeiz sich darin zu zeigen pflegt, daß jeder Knabe den Kirchturm seines Wohnortes für den höchsten hält, scheint der floristische Ehrgeiz sehr häufig darin gesetzt zu werden, daß man sich bemühet aus seinem Landesgebiete die möglichst größte Anzahl von Pflanzenarten namhaft zu machen.

Manche berühmte Botaniker sind erst mit zunehmenden Jahren auf den bezeichneten Abweg gerathen, wie z. B. C. Fries, dessen vielfache großen Verdienste um die Wissenschaft ich gewiß nicht verkenne; überblicke ich aber die ganze Reihe seiner botanischen Arbeiten, wie sie der Zeit nach auf einander folgen, werde ich recht lebhaft an die Gefängnisse erinnert, deren sich die Inquisition in Venedig bedient haben soll, und die angeblich so eingerichtet waren, daß ihre beweglichen Wände täglich mehr und mehr sich näherten, bis endlich der unglückliche In-

fasse zwischen ihnen zerbrückt wurde. Ebenso beweglich rücken die Speciesgränzen von Jahr zu Jahr näher zusammen. Dies ist ganz besonders bei Fries der Fall, wenn man seine früheren Arbeiten mit den späteren vergleicht; wie liberal und philosophisch spricht er sich in jenen (namentlich in den *Novitiis*) über die Natur der Species aus, und wie verfährt er nachher in der *Summa vegetabilium* nach ganz anderen Grundsätzen, wo nun, nachdem das Eis einmal durchbrochen, und die frühere Scheu neue Arten aufzustellen überwunden ist, eine *nova species* über die andere zum Vorschein kommt.

Langjährig fortgesetzter Verkehr mit der Natur, der nicht auf das Pflanzenreich allein beschränkt blieb, und bei welchem es mein hauptsächlichstes Bestreben war, ohne mich durch herkömmliche Meinungen leiten zu lassen, mit möglichst unbefangenen Blicke selbst zu prüfen, hat mich zu der Ueberzeugung hingeführt, daß wir die Hunderttausende von organischen Wesen, welche den Erdball bewohnen, überhaupt gar nicht mit einem und demselben starren Speciesmaasse messen dürfen.

Eine sehr große Anzahl derselben scheint zwar allerdings bei ihrem ersten Entstehen ein ganz bestimmtes Gepräge erhalten zu haben, von welchem die einzelnen, zu dieser Art gehörigen Individuen wenig oder gar nicht abweichen. Diese sind daher so unbeugsamen Characters, daß sie, wenn sie verschiedenen Lebensbedingungen ausgesetzt werden, dieselben, falls sie kräftig genug dazu sind, ertragen ohne sich zu verändern, oder sie erliegen den Einflüssen dieser neuen Bedingungen und gehen zu Grunde. Species von dieser Beschaffenheit gränzen sich

scharf und leicht von einander ab, weshalb ihre Determination und Classification den Botanikern und Zoologen keine große Schwierigkeit bereitet.

Es giebt aber neben diesen Arten auch noch gar viele organische Wesen, welche kein so unwandelbares Gepräge erhalten haben, sondern welchen eine größere Freiheit in der Entwicklung ihrer Formen verliehen ist, weshalb man sie in der beschreibenden Botanik und Zoologie nicht mit demselben starren Maasse messen darf, wie jene. Sie schwanken in ihren Formen um einen gewissen Mittelpunkt herum, indem sie einen kleineren oder größeren Cyclus von Abänderungen durchlaufen, und ihre Formen sich bald nach der einen, bald nach der andern Seite hin von dem Grundtypus entfernen. Was in jedem einzelnen Falle die Ursache sei, warum sie gerade nach dieser oder jener Richtung hin abändern, kann bei der großen Complication der Ursachen, und bei der geringen Aufmerksamkeit, welche man diesem Gegenstande bis jetzt gewidmet hat, nur erst selten nachgewiesen werden. Eine sehr wichtige Rolle bei diesem Formenwechsel spielen die veränderten Lebensbedingungen, denen diese Wesen ausgesetzt werden; es kommen dabei aber auch noch andere Ursachen ins Spiel, denn die Erfahrung hat gezeigt, daß Varietäten trotz eines Wechsels der Lebensbedingungen ihre Eigenthümlichkeiten von Generation zu Generation vererben können.

Unter jenen Lebensbedingungen, welche so wesentlich zu diesem Formenwechsel beitragen, verstehe ich Alles, was von außen her auf die organischen Wesen einwirkt: Temperatur, Druck und Feuchtigkeitsverhältnisse der



Luft, sonnigen oder schattigen Standort, geognostische und chemische Beschaffenheit des Bodens, und bei den Wasserpflanzen die Beschaffenheit des Wassers, in welchem sie leben, ob es seicht oder tief, ruhig oder bewegt, klar oder schlammig, süß oder salzig sei. Gerade diese letztere Klasse von Organismen, welche so ganz unter dem Einflusse eines Mediums stehen, das viel kräftiger auf sie einwirkt, als die Luft auf die in ihr lebenden Landpflanzen und Landthiere, zeigen fast alle eine der großen Veränderlichkeit jenes Mediums entsprechende Unbeständigkeit ihres Characters, welche z. B. bei den Algen so groß ist, daß Kützting durch das specielle Studium dieser Pflanzenklasse sogar zu dem Ausspruch veranlaßt ist: „es gäbe keine feststehende Species in der Natur, und alle Bestrebungen für exacte Begrenzung der Species seien unnütz.“

Dennoch bemühen sich die Botaniker unablässig diese proteischen Gestalten zu erfassen, aber vergebens! Die Pflanzen des süßen Wassers (denn diese trifft das hier Gesagte vorzugsweise, da das Meereswasser auf großen Räumen einen viel beständigeren Character zeigt,) lassen sich nun einmal nicht in enge Speciesgränzen einzwängen. Hätten die Botaniker nur den verwandten Bestrebungen der Zoologen größere Aufmerksamkeit geschenkt, so würden sie durch die trauerigen Erfahrungen, welche z. B. die Conchyliologen in Betreff der Formveränderlichkeit der Süßwassermollusken gemacht haben, an dem Erfolge ihrer eigenen Bestrebungen schon etwas zweifelhafter geworden sein. Mit der Gattung *Unio* z. B. war man in Deutschland schon bis zu mehr als 30 Arten hinaufgestiegen und noch immer fanden sich neue Formen, die sich den zahl-

reichen Diagnosen nicht anpassen wollten und daher mit demselben Rechte, wie ihre unfügsamen Vorgänger, zu neuen Arten erhoben werden mußten, als endlich tüchtige Forscher den eingeschlagenen Irrweg erkennend, die proteische Natur der Unionen richtig würdigten, und eine massenhafte Reduction der angeblichen Arten vornahmen.<sup>1</sup>

Ähnlich verhält es sich mit den Pflanzen der süßen Gewässer, wofür uns sogleich eine der ersten Gattungen der mecklenburgischen Flora ein lehrreiches Beispiel darbietet. Linnees *Ranunculus aquatilis*, jetzt den Typus der Gattung *Batrachium* bildend, ist von den neueren Botanikern in eine große Anzahl von Arten zerpalten worden. Die deutschen Florenverzeichnisse führen jetzt als solche auf: 1. *Batr. aquatile* L. 2. *hololeucum* Lloyd. 3. *minutum* Döll. 4. *divaricatum* Schrk. 5. *paucistamineum* Tausch. 6. *fluitans* Lam. 7. *Bachii* Wirtg., welche alle im süßen Wasser vorkommen, und außerdem noch 8. *confusum* Godr. (*tripartitum* Nolte) und 9. *Baudolii* Godr. aus dem Brackwasser, denen Fries für Schweden noch ein *B. marinum* und mehrere andere hinzufügt. Auf den ersten Blick erscheinen allerdings manche dieser angeblichen Arten so verschieden, daß man eine spezifische Trennung derselben für

---

1. E. Peiffer und Rossmäßler. — Eine gleiche Unbeständigkeit des Speciescharacters zeigen fast alle Gattungen der Süßwassermollusken, nicht allein in Europa, sondern auch in Amerika und wahrscheinlich auch in den anderen Erdtheilen, wo man sie bis jetzt noch wenig beachtet hat. Man denke nur an das zahllose, jährlich noch wachsende Heer der nordamerikanischen Unionen! -- Der Einfluß mancher Gewässer auf die in ihnen lebenden Mollusken ist so groß, und ertheilt ihnen ein so eigenthümliches Gepräge, daß ein geübter Conchyliologe sogleich die ihnen entstammenden Exemplare herausfindet, wenn sie ihm mit denen anderer Fundorte gemischt vorgelegt werden.

gerechtfertigt halten möchte; allein bei genauerer Betrachtung des Verhältnisses, in welchem sie zu einander stehen und der Formveränderlichkeit, die sie zeigen, halte ich es dennoch nicht für unmöglich, daß ein tieferes Studium dieser merkwürdigen Formenreihe die Botaniker noch einmal veranlaßte, sie sammt und sonders wieder auf einige wenige Arten zurückzuführen. Besteht doch selbst Fries in der Summa S. 140 zu: *florum magnitudinem, staminum et carpellorum numerum manifeste variare vidimus, ut etiam foliorum natantium praesentiam et defectum*. Er hätte nur noch einen kleinen Schritt weiter zu gehen brauchen, und sämtlichen Pflanzentheilen eine Veränderlichkeit innerhalb gewisser Gränzen zugestehen, so wäre das Räthsel vielleicht befriedigend gelöst gewesen. Denn außer den von Fries namhaft gemachten Organen, möchte auch noch der Stengel abändern (rund, oder etwas kantig, stehend<sup>1</sup> oder aufrecht), die Gestalt und Festigkeit der Blattzipfel, die Anheftung der Blätter (sitzend, und kürzer oder länger gestielt), die Anzahl der Blumenblätter (5 bis 12), und die Oberflächenbeschaffenheit der ganzen Pflanze, besonders der Karpelle (glatt oder behaart). Je nachdem mehr oder weniger dieser Modificationen bei einem und demselben Pflanzenindividuum zusammentreffen, entfernt sich dasselbe

1. Daß der lange, stehende Stengel des *R. fluitans* nichts für die spezifische Trennung dieser angeblichen Art von *R. aquatilis* beweiset, zeigen die analogen Erscheinungen bei *Montia fontana*, *Polygonum amphibium*, *Sparganium simplex*, *Juncus supinus* und *Hippuris vulgaris*, die auch alle mit stehendem Stengel abändern. Mit der Var. *fluitans* der letztgenannten Art kommt *R. fluitans* auch noch in seiner häufig stattfindenden Unfruchtbarkeit überein. — Hinsichtlich der Veränderlichkeit der Blätter bei den Wasserpflanzen erinnere ich nur an das bekannte Beispiel des *Alisma Plantago*.

mehr oder weniger von dem Grundtypus und kann dadurch ein so eigenthümliches Gepräge erhalten, daß die Zerspaltung in mehrere Arten dadurch erklärlich, wenn auch nicht gerechtfertigt wird. Aehnlich, wie mit *Batrachium*, verhält es sich mit der Gattung *Potamogeton*; auch diese ist in so viele angebliche Arten zerspaltet worden, daß z. B. Sonder aus dem kleinen Gebiete der Flora von Hamburg deren nicht weniger als 21 aufzählt, zu denen dann noch 13 Varietäten hinzukommen. In der Gattung *Callitriche* begnügen sich die deutschen Floren zwar mit 5 Arten, aber diese ändern nach dem *Compendium florae Germanicae* (ed. 2. 1836) von Bluff, N. v. Esenbeck und Schauer in 36 Varietäten ab. Auch die Gattung *Zannichellia*, von der man vor etwa 40 Jahren nur eine einzige Art in Deutschland kannte, ist durch Zerspaltung derselben jetzt schon auf 5, und *Nymphaea alba* L. auf fast ein Duzend Species gebracht worden. Erwägt man nun endlich noch die schon oben erwähnte Formveränderlichkeit der Algen, so wird es überflüssig sein, noch weitere Beispiele für die polymorphe Natur der Wasserpflanzen anzuführen.<sup>1</sup>

1. Außer in ihrer Wandelbarkeit bieten die Süßwasserpflanzen Deutschlands auch noch eine andere Analogie mit den deutschen Süßwassermollusken dar, indem sie eben so weit und allgemein verbreitet sind, wie diese, während sich in den Landpflanzen (wie bei den Landmollusken) der einzelnen deutschen Florengebiete eine viel größere Differenz zeigt. Der Grund dieser Erscheinung liegt wohl hauptsächlich darin, daß erstere durch ihre Wasserbedeckung einer viel gleichmäßigeren Temperatur ausgesetzt sind, wie letztere, und daher von klimatischen Einflüssen, die in der Atmosphäre stärker hervortreten, weniger abhängig sind. Doch trägt zu ihrer weiteren Verbreitung ohne Zweifel auch die Leichtigkeit bei, mit der ihre am Gefieder der Wasservögel festklebenden Samen von einem Gewässer zum andern verschleppt werden können.



Aber auch manche Landpflanzen verändern je nach dem Standpuncte ihre Formen oft auf eine merkliche Weise, obgleich nicht so ins Unendliche wie die oben bezeichneten Wasserpflanzen; es finden sich zwar bei einzelnen Gattungen derselben, wie z. B. bei *Rubus*, *Mentha*, *Salix*, *Viola*, *Verbascum* u. s. w., ebenso zahlreiche und fast unentwirrbare Formenreihen, wie bei *Potamogeton* und *Callitriche*, doch haben zur Hervorbringung derselben andere Umstände eingewirkt, auf die wir hernach zurückkommen werden. Für die durch locale Einflüsse hervorgerufene Veränderlichkeit der Landpflanzen mag hier das Beispiel des *Lotus corniculatus* genügen. In allen nur einigermaßen sorgfältig durchsuchten deutschen Florengebieten wird man ihn in Gesellschaft des *L. uliginosus* antreffen; ich fand beide am Rhein unter denselben Verhältnissen, unter welchen sie hier in Mecklenburg vorkommen, und auch noch nach Schweden hinüber begleiten sie sich. Ihr Habitus ist so gleich, daß Anfänger in der Botanik sie in der Regel kaum zu unterscheiden vermögen, denn *L. uliginosus* erscheint nur als der üppigere *corniculatus*. Läßt sich nun diese üppigere Entwicklung, wodurch einzelne Theile eine kräftigere Ausbildung und etwas abweichende Gestalt bekommen, nicht ganz naturgemäß aus den verschiedenen Standpuncten der beiden Formen erklären, indem *corniculatus* an trockenen, sonnigen Plätzen (auf Tristen, trockenen Wiesen, an Wegerändern, Dämmen, Ackerrainen und auf Sandplätzen) vorkommt, während die Form, welcher man den Namen *uliginosus* beigelegt hat, nur an feuchten, sumpfigen und schattigen Standorten angetroffen wird?

Von *L. corniculatus* ist in neuerer Zeit noch ein *L. tenuifolius* als dritte Art abgezweigt worden, welche nur auf salzhaltigem Boden am Seestrande gefunden wird. Sie leitet uns dazu hinüber, den wichtigen Einfluß, den ein solcher salzhaltiger Boden auf die Pflanzen ausübt, etwas genauer ins Auge zu fassen. Die am Seestrande wachsenden Pflanzen lassen sich in folgende Gruppen sondern:

1. Es findet sich daselbst eine beträchtliche Anzahl binnenländischer Pflanzen, welche mit einer so kräftigen Organisation begabt sind, daß sie den Salzgehalt des Bodens ertragen können, ohne die geringste Veränderung zu erleiden. So wachsen z. B. auf dem mit Geröllern bedeckten Seestrande der Halbinsel Zasmund *Rubus caesius*, *Convolvulus arvensis*, *Stachys palustris*, *Rumex crispus*, *Equisetum hiemale*, an steilen Lehmufern, *Hippophaë rhamnoides*, *Medicago falcata* und *lupulina*, *Tussilago Farfara*, *Equisetum Telmateja* u. s. w., auf sandigen Strecken *Ammophila arenaria*, *Elymus arenarius* u. s. w., welche sich alle von den gleichnamigen binnenländischen Pflanzen durchaus nicht unterscheiden.

2. Andere binnenländische Pflanzen wachsen zwar gleichfalls am Meeresstrande, erleiden dort aber eine mehr oder weniger auffallende Abänderung ihres ursprünglichen Habitus. Theils wirkt der Salzgehalt fördernd und kräftigend auf sie ein, und sie entwickeln sich entweder im Allgemeinen oder in einzelnen Organen üppiger, — theils aber tritt auch das Gegentheil ein. Ersteres zeigt sich z. B. bei der *Chondrilla juncea*  $\beta$ . *robusta*, welche Detharding früher sogar unter dem Namen *Ch. acanthophylla* als eigene Species unterschied; bei anderen Pflanzen wird die Be-

haarung stärker, wie z. B. bei *Ranunculus polyanthemos* var. *littoralis* Zab. (der auch größere Blumen, aber einen niedrigeren Wuchs erhält), *Trifolium pratense* var. *maritimum* Zab., *Anthyllis Vulneraria*, *Galeophis Tetrahit*, *Euphrasia officinalis* β. *maritima*, *Taraxacum officinale* β. *hirtum*, *Plantago lanceolata* β. *lanuginosa*, *Artemisia campestris* β. *sericea*; bei *Sonchus oleraceus* werden die sonst glatten Blütenstiele drüsig behaart, *Equisetum arvense*<sup>1</sup> wird ganz rauh von scharfen Punkten; andere Pflanzen, wie z. B. *Malva neglecta* Wallr. β. *littoralis* Deth. erhalten größere Blumen, andere aber fleischigere Blätter, wie z. B. *Linaria vulgaris*, *Viola tricolor* var. *syrtica*, *Polygonum aviculare* var. *salinum*, *Plantago major* var. *scopulorum* Fr., *Senecio vulgaris* var. *squalidus* Mey., *Chrysanthemum inodorum* β. *maritimum*, *Sagina procumbens* β. *maritima* Fr.; auch *Atriplex latifolium* durchläuft an salzhaltigen Orten eine ganze Reihe von Formveränderungen. — Eine Verkümmernng dagegen zeigt sich z. B. bei dem ästigen *Centunculus minimus*, von welchem Fries an dem schwedischen Strande eine var. *simplex* fand; bei *Polygonum aviculare* β. *littorale* und *Erythraea ramosissima*, welche gleichfalls weniger verästelt am Meeresufer auftreten; *Centaurea*

*Atriplex latifolia*  
β. *salina*

1. Daß diese Art zwischen den Geröllen am Strande auf Zasmund (wo sie dem Wellenschlage häufig ausgesetzt ist,) wächst, habe ich schon in Archiv II S. 80 gesagt; Hr. Dr. Meyn hat dies in seiner Abhandlung über „die nachhaltige Vertilgung des Durocks“ (Weimar 1854) S. 40 übersehen, indem er aus meiner Schilderung der See-strands- und Salinenflora einen Beweis dafür ableitet, daß alle Equisetaceen den Salzboden fliehen. Auch E. Telmateja und hiemalo wachsen auf Zasmund so, daß sie nicht selten mit dem Meereswasser in Berührung kommen.

*Jacea*, *Bupleurum tenuissimum*, *Sonchus arvensis*, *Capsella bursa pastoris* und *Jasione montana* sind gleichfalls im Binnenlande viel kräftiger, *Cerastium semidecandrum* kommt an der Küste mit 4theiligen und 4männigen Blumen vor, und *Taraxacum officinale* ändert auf recht naßsalzigem Boden mit sehr schmalen Blättern ab.

3. Zu allen diesen Pflanzen gesellen sich aber auch noch eine Anzahl solcher, die ausschließlich auf salzhaltigem Boden (am Meeresstrande und um Salinen) vorkommen, und welche sich sogleich auf den ersten Blick als von unseren binnenländischen Arten gänzlich verschieden zeigen. Dahin gehören z. B. an unserem Ostseestrande: *Cochlearia Linnaei* und *danica*, *Cakile maritima*, *Crambe maritima*, *Halianthus peploides*, *Pisum maritimum*, *Eryngium maritimum*, *Aster Tripolium*, *Artemisia maritima*, *Samolus Valerandi*, *Glaux maritima*, *Statice Limonium*, *Plantago maritima* und *Coronopus*, *Chenopodina maritima*, *Obione pedunculata*, *Salsola Kali*, *Salicornia herbacea*, *Juncus maritimus*, *Carex extensa* und *Triticum junceum*.

4. Neben diesen soeben genannten und von allen Botanikern als gute Arten anerkannten Pflanzen wachsen am Strande aber auch noch andere, die meistens gleichfalls als gute, dem Salzboden eigenthümliche Pflanzen gelten, bei denen aber die Berechtigung als selbstständige Arten beansprucht werden zu müssen, nicht so sehr in die Augen fällt, da sie mit anderen Strand- und binnenländischen Pflanzen in mehr oder weniger nahen verwandtschaftlichen Beziehungen stehen. In unserer mecklenburgischen Flora sind dies folgende:



- Cochlearia anglica* + *officinalis*.  
*Sagina stricta* + *procumbens*.  
*Lepigonum marinum*, *medium* + *rubrum*.  
*Lotus tenifolius* + *corniculatus*.  
*Chrysanthemum maritimum* + *inodorum*.  
*Erythaea linarifolia* + *Centaurium*.  
*Euphrasia verna* + *Odotites*,  
*Statice maritima* + *Armeria*.  
*Atriplex litorale* + *hastatum*.  
*Potamogeton marinus* + *filiformis*.  
*Ruppia rostellata* + *maritima*.  
*Zannichellia pedicellata* + *palustris*.  
*Juncus balticus* + *glaucus*.  
*Juncus Gerardi* + *compressus*.  
*Blysmus rufus* + *compressus*.  
*Glyceria maritima* + *distans*.

Diese Gegenüberstellung der verwandten Arten darf aber nicht etwa so verstanden werden, als wollte ich damit bezeichnen, daß die im ersten Gliede stehenden Strandpflanzen alle auf die im zweiten Gliede genannten als Varietäten zurückzuführen wären; bei manchen aber wird dies geschehen müssen, und bei welchen ich mich dazu genöthigt gesehen habe, darüber werde ich in der späteren systematischen Uebersicht der Flora weitere Auskunft geben. Ich kann nicht umhin bei dieser Gelegenheit unseren Botanikern das sorgfältige Studium dieser Pflanzen ganz besonders dringend ans Herz zu legen. Denn der Einfluß, welchen salzhaltiger Boden oder salziges Gewässer auf die Umgestaltung der Pflanzen ausübt, ist noch viel zu wenig erforscht worden, und ich halte es nicht für unwahrscheinlich, daß er sich in der Folge noch als größer herausstellt, wie man jetzt zuzugeben geneigt ist. Ich habe diesen Ge-

genstand schon früher einmal zur Sprache gebracht<sup>1</sup>, und gezeigt, wie vorsichtig wir in Beurtheilung der Artenrechte der in der Ostsee lebenden Pflanzen und Thiere sein müssen, weil dies Wasserbecken ein Mittelbing zwischen Meer und Landsee ist, und es seine Bevölkerung theils aus der Nordsee, theils aus den Flußmündungen erhalten hat, und daß Pflanzen und Thiere in diesem schwachsalzigen Wasser eine solche Umgestaltung erlitten haben, daß man manche derselben für neue, der Ostsee eigenthümliche Arten hielt. So machte man z. B. aus der *Clupea Harengus* der Nordsee eine baltische *Cl. Membras*, aus der *Tellina solidula* der Nordsee eine *T. baltica*, aus der *Neritina fluviatilis* unserer Landseen und Flüsse eine *N. baltica*, aus dem *Fucus vesiculosus* einen *F. balticus* u. s. w. — lauter Trennungen, die gänzlich unberechtigt waren. Dies Beispiel, im Verein mit den Thatfachen, die ich S. 14 f. schon über den Einfluß mitgetheilt habe, welchen salzhaltiger Standort auf manche binnenländische Pflanzen ausübt, rechtfertigt es gewiß, wenn ich die Ueberzeugung hege, daß die Acten über die Artenrechte mancher der obengenannten Pflanzen noch keineswegs geschlossen sind.

Der bequemern Uebersicht wegen will ich schließlich alle diejenigen angeblichen Arten, die ich als Varietäten einzuziehen mich genöthigt gesehen habe, hier zusammenstellen. Es sind folgende:

<i>Thalictrum flexuosum.</i>	<i>Cardamine sylvatica.</i>
<i>Ranunculus paucistamineus.</i>	<i>Camelina dentata.</i>
<i>tripartitus.</i>	<i>Cochlearia anglica.</i>
<i>nemorosus.</i>	<i>Viola Riviniana.</i>
<i>Barbareae arcuata.</i>	<i>Polygala comosa.</i>

1. In meiner Schilderung der Ostsee im 1. Bde. unseres Archivs.

- Sagina depressa.*  
*Spergula maxima.*  
*Spergularia media,*  
     *marginata.*  
*Alsine viscosa.*  
*Cerastium glutinosum,*  
*Elatine triandra.*  
*Malva Dethardingii.*  
*Lotus uliginosus,*  
     *tenuifolius.*  
*Vicia sativa.*  
*Rubus suberectus,*  
     *affinis,*  
     *sylvaticus,*  
     *discolor,*  
     *villicaulis,*  
     *corylifolius,*  
     *Wahlbergii,*  
     *thyrsiflorus.*  
*Potentilla cinerea.*  
*Crataegus monogyna.*  
*Callitriche stagnalis,*  
     *platycarpa.*  
*Montia rivularis.*  
*Sedum purpurascens.*  
*Pimpinella nigra.*  
*Chrysanthemum maritimum,*  
*Senecio aquaticus,*  
     *barbaraeifolius.*  
*Lappa minor,*  
     *tomentosa.*  
*Hieracium vulgatum,*  
     *boreale,*  
     *rigidum,*  
     *stoloniflorum,*
- Myosotis caespitosa.*  
*Solanum miniatum,*  
     *humile.*  
*Verbascum thapsiforme.*  
*Moenchii.*  
*Potentilla opaca,*  
     *polita.*  
*Euphrasia verna.*  
*Thymus angustifolius.*  
*Lamium incisum.*  
*Galeopsis versicolor,*  
     *bifida,*  
     *pubescens.*  
*Ballota borealis.*  
*Anagallis coerulea.*  
*Statice maritima.*  
*Atriplex prostratum,*  
     *Sackii,*  
     *laciniatum.*  
*Rumex palustris.*  
*Ulmus suberosa.*  
*Salix vitellina,*  
     *amygdalina,*  
     *aquatica,*  
     *uliginosa,*  
     *repens,*  
     *fusea,*  
     *argentea.*  
     *rosmarinifolia.*  
     *laeta,*  
     *angustifolia.*  
*Potamogeton fluitans,*  
     *nitens,*  
     *acutifolius.*  
*Zannichellia pedicellata.*

<i>Platanthera montana.</i>	<i>ericetorum.</i>
<i>Juncus effusus.</i>	Oederi.
<i>sylvaticus.</i>	<i>Alopecurus fulvus.</i>
<i>alpinus.</i>	<i>Koeleria glauca.</i>
Gerardi.	<i>Poa fertilis.</i>
<i>Heleocharis uniglumis.</i>	<i>Bromus racemosus.</i>
<i>Scirpus Tabernaemontani.</i>	<i>commutatus.</i>
<i>Carex divulsa.</i>	

Endlich finden sich an unserer Seeküste auch noch einige sehr merkwürdige Pflanzen, welche im Binnenlande noch nicht gefunden sind und die in ihrem ganzen Habitus geradezu die Mitte zwischen je zwei anderen am Strande häufigen Pflanzen halten. Es sind dies *Ammophila ballica*, zwischen *A. arenaria* und *Calamagrostis Epi-geios* stehend, — *Triticum strictum*, zwischen *Tr. acutum* und *Elymus arenarius*, und *Triticum acutum*, zwischen *Tr. repens* und *junceum*. — Hrn. Prof. Köper gebührt das Verdienst uns diese räthselhaften Pflanzen zuerst richtig gedeutet zu haben, indem er es bei der ersteren derselben mit Bestimmtheit, und hinsichtlich der anderen beiden als sehr wahrscheinliche Vermuthung aussprach, daß sie nichts anderes als Bastarde jener Arten seien, deren Kennzeichen sie theilweise in sich vereinigen.<sup>1</sup>

Man hat sich in neuerer Zeit Seitens der Naturforscher schon mehrfach bequemen müssen althergebrachte Meinungen fallen zu lassen, und man wird sich endlich auch wohl zu dem Zugeständnisse entschließen, daß Bastardbildungen nicht allein weit häufiger sind und in weiteren Kreisen vorkommen, als man früher einräumen wollte, sondern auch, daß die Bastarde keineswegs immer un-

1. Köper zur Flora Mecklenburgs II. S. 192. 269—271.



fruchtbar sind. Zu Gunsten dieser so manches Räthsel lösenden Lehre von den Bastardbildungen erheben sich schon nach und nach immer mehr gewichtige Stimmen unter den Botanikern, wie z. B. von Wimmer, welcher in der Denkschrift der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur im J. 1853 (S. 143 ff.) 92 Pflanzenbastarde, worunter 56 allein der Gattung *Salix* angehören, aufzählt, und bei dieser Gelegenheit sagt: „so weit meine Erfahrungen bei den Weiden reichen, sind allerdings manche Bastarde unfruchtbar; andere dagegen geben keimfähigen Samen, wie ich dies namentlich bei *S. silesiaca* - *Lapponum* beobachtet habe, und wie Hr. Wichura an *S. ambigua* Ehr. und *S. Doniana* Sm. unzweideutig erwiesen hat. Durch die Versuche desselben scheint es auch dargethan zu sein, daß ein Bastard sich mit demselben Bastard, wie auch mit einem anderen befruchten lasse.“ — Muß man dies endlich in Bezug auf die Pflanzen als Thatsache zugestehen, so wird man auch wohl nicht umhin können, diese Lehre auf die Thiere anzuwenden, eine Lehre, durch welche die Entstehung der mannigfachen Gestaltungen, in denen sich z. B. das Menschengeschlecht zeigt, am einfachsten würde erklären lassen.<sup>1</sup>

Man verliert sich aber durch Anerkennung fruchtbarer Bastardbildungen hinsichtlich der Erkenntniß der Species, —

1. Diese ganz aus der Luft gegriffene Idee von der specifischen Einheit des Menschengeschlechtes ist für die Entwicklung des Speciesbegriffes ebenso verderblich gewesen, als die mosaikische Kosmologie für die Geologie. Die sogenannten Menschenrassen mußten alle in eine Species hineingepreßt werden, die Hunde gleichfalls, um für ersteres eine Analogie zu haben, und als man so Verschiedenartiges unter einen Hut gebracht hatte, da konnte man mit den „Species“ der übrigen organischen Wesen schalten und walten, wie es beliebt!

wenn dieselbe auch sehr dadurch erschwert wird, — nicht so völlig ins Bodenlose, wie dies auf den ersten Anblick erscheinen mag. Denn wie bei Weitem die Mehrzahl (wenigstens der phanerogamischen Pflanzen) einen durchaus constanten Artencharacter an sich trägt, und nur der Minderzahl ein variabler Character verliehen ist, ebenso verhält es sich mit den geschlechtlichen verwandtschaftlichen Beziehungen, welche zwischen den einzelnen Arten stattfinden. Zwischen den meisten scheinen gar keine solche vorhanden zu sein, und sie vermischen sich weder im freien Zustande, noch auch durch künstlichen Zwang mit einander. Unter manchen Arten aber giebt es eine Verwandtschaft, und je nachdem dieselbe schwächer oder stärker ist, kommen seltener oder häufiger Bastardbildungen zwischen ihnen vor. Lockerer ist offenbar diese geschlechtliche Verwandtschaft z. B. zwischen *Anemone nemorosa* und *ranunculoides*, zwischen *Geum urbanum* und *rivale*, als zwischen unseren *Verbascum*- und *Salix*-Arten; denn obgleich die ersteren der genannten Pflanzen so häufig in Mecklenburg durch- und nebeneinander wachsen, werden Bastarde unter ihnen doch nur selten angetroffen, während dort, wo mehrere Arten der beiden letzteren Gattungen zusammen vorkommen, auch ihre Bastarde nicht weit zu suchen zu sein pflegen. Es ist also der Bastardbildung von der Natur selbst eine ganz bestimmte Schranke gesetzt, und die Besorgniß, daß die Anerkennung dieser Bildungen die Erkenntniß der wirklichen Pflanzenarten aufheben würde, indem damit die Möglichkeit einer unendlichen Wandelbarkeit aller Pflanzenformen gegeben sei, ist eine durchaus unbegründete. In einigen Gattungen zwar, deren Arten sich geschlechtlich vorzugs-

weise nahe stehen, ist allerdings jene Befürchtung zur Wirklichkeit geworden, und ihre Arten sind theils durch ihren wandelbaren Character selbst, theils durch die in verschiedenen Richtungen dazwischen tretenden Bastarde, so unkenntlich gemacht und durcheinander gewirrt worden, daß die Botaniker fast daran verzweifelt sind, die ursprünglichen Arten noch herausfinden zu können.

Was die Pflanzen nun betrifft, die mir in unserer mecklenburgischen Flora für Bastarde gelten, so sind dies nicht etwa bloß Strandpflanzen, sondern sie finden sich durch das ganze Land zerstreuet. Ich rechne dahin nämlich:

*Anemone sulphurea* Pritz.

*Nasturtium anceps* Reich.

*Tilia intermedia* DC.

*Geum intermedium* Ehr.

*Circaea intermedia*.

*Galium ochroleucum* Wolf.

*Cirsium hybridum* Koch, oleraceo-acaule.

*Hieracium Pilosello-Auricula* Griew.

*Verbascum ramigerum* Lk., *collinum* Schr., *adulterinum* Koch,  
*Schottianum* Schr., *collino-nigrum* Brockm.

*Mentha nepetoides* Lej.

*Lamium intermedium* Fr., *purpureo-maculatum*.

*Stachys ambigua* Sm.

*Rumex maximus* Schr.

*Salix cuspidata* Sch., *Russeliana* Sm., *undulata* Ehr. *ambigua* Ehr.,  
*angustifolia* Fr.

*Populus canescens* Sm.

*Calamagrostis baltica* Schr.

*Festuca loliacea* Huds.

*Triticum strictum* Deth., *acutum* DC.

Wahrscheinlich wird sich dies Verzeichniß mit der Zeit noch durch mehrere Bastarde, zu denen auch wohl

die Gattung *Rubus* noch ihr Contingent stellen wird, vergrößern lassen. — Manche der vorstehend genannten Pflanzen sind durch künstliche Befruchtung schon als Bastarde erwiesen, andere sind durch das Consortium der Stammpflanzen als solche indicirt, und bei noch anderen macht sie der Doppelcharacter, in welchem sie sich zeigen (bald der einen, bald der anderen Stammpflanze in ihrem Habitus sich stärker zuneigend,) im höchsten Grade eines hybriden Ursprungs verdächtig.

Ich habe hier einige der hauptsächlichsten Schwierigkeiten angedeutet, mit denen der Botaniker bei der Abgränzung der Species zu kämpfen hat. Diese Schwierigkeiten für alle Pflanzen selbst nur eines so kleinen Pflanzengebietes, wie das unserige, genügend zu beseitigen, übersteigt bei weitem die Kräfte eines einzelnen Beobachters. Nur Theilung der Arbeit kann hier zu einem genügenden Ziele hinführen, und ich halte es für meine Pflicht unsere Botaniker darauf hinzuweisen, daß sie durch Lösung der vorstehend angedeuteten Fragen und Zweifel mehr zur wahren Förderung der Wissenschaft beitragen können, als wenn sie etwa eine neue, bisher innerhalb der Gränzen des mecklenburgischen Landes noch nicht gesehene Pflanzenart aufspüren.

Dem außer dem, daß die Befolgung der von mir im Voraufgehenden entwickelten Grundsätze meiner Uebersetzung nach eine naturgemäßere Erkenntniß des Pflanzenreiches, als man durch das jetzt beliebte Zersplitterungssystem erlangt, anbahnt, wird dadurch auch die Orientirung unter den Gewächsen in vielen Fällen sehr erleichtert werden. Der Botaniker findet z. B. unter



den Bürgern seiner Flora *Thalictrum minus* und *flexuosum* aufgezeichnet: ersteres kennt er schon und will nun letzteres auffuchen, geht aber lange daran vorbei, weil er, — wozu der eigene Speciesname ihn berechtigt, — eine von *minus* wesentlich in ihrem Habitus verschiedene Pflanze sucht. Wird er dagegen auf *Thal. minus var. flexuosum* verwiesen, so wird ihn dieser Fingerzeig viel schneller ans Ziel führen. Warum also den Weg absichtlich erschweren, wenn dies auf eine so einfache Weise vermieden werden kann?

## II. Die Pflanzennamen.

Der schwankende Zustand des Gattungs- und Artenbegriffes wirkt höchst nachtheilig auch auf die Namen der Pflanzen ein. Hinsichtlich dieser letzteren befinden sich unsere Floren fast in einem Zustande, wie der alte Heraklit die ganze Welt sich dachte, nämlich in einem beständigen Flusse (*πάντα ῥεῖ*). Hastlos treiben sich viele Species von Gattung zu Gattung, nirgends wird ihnen eine bleibende Ruhestätte gewährt, weil beständig an den Gattungsgränzen gerückt wird, indem man dieselben bald enger bald weiter steckt. Wenn wir nun auch der Species (wenn wir gleich den Begriff derselben noch nicht bestimmt definiren können!) eine objective Gültigkeit zugestehen müssen, so ist dies doch mit der Gattung keineswegs der Fall. Diese ist nichts objectiv in der Natur begründetes, in dessen Auffassung sich endlich alle Botaniker nothwendig einigen müßten, sondern sie ist und bleibt etwas Subjectives, zur Erleichterung der Orientirung in dem großen Pflanzenheere durch menschlichen Scharfsinn Erdachtes, daher

aber auch etwas Schwankendes. — Würde man nun nicht mehr in dem wahren Interesse der Wissenschaft handeln, wenn man jetzt, wo man kaum erst die Hälfte der Baumaterialien kennt, die zur Errichtung der *Flora universalis* benutzt werden müssen, einstweilen ruhig weiter bauete, um doch endlich einmal eine, wenn auch nicht fehlerfreie, Uebersicht über den ganzen Formenreichtum und viele andere Beziehungen der Flora, die wichtiger, als die endliche Feststellung der Gattungen sind, zu erhalten, als daß man fortwährend den kleinen schon dastehenden Theil des Gebäudes umgestaltete? Etwas conservative Gesinnung ist mitunter ganz gut, und ich glaube, daß sie bei der jetzigen Lage des botanischen Wissens gerade hier am rechten Orte sei. Ich werde daher in der später folgenden Aufzählung der mecklenburgischen Pflanzen manche Neuerung, die von anderen hinsichtlich der Gattungen vorgenommen ist, unberücksichtigt lassen.

Wo ich aber Umstellungen vorgenommen habe, da habe ich mir (wenigstens vorläufig bei den phanerogamischen Pflanzen,) hinsichtlich der lateinischen Speciesnamen eine Aenderung erlaubt, die mir sehr nothwendig erschien.

Die Ehre der Namengebung gebührt nämlich ohne Frage dem ersten Entdecker der Species. Indem nun aber späterhin die Gattungen andere Abgränzungen erfahren haben und daher viele Arten in andere Gattungen versetzt worden sind, als welchen sie von ihren ersten Entdeckern zugewiesen wurden, ist bei den Botanikern leider die Unsitte eingerissen, dann nicht den Entdecker der Art, sondern denjenigen, durch den die Versetzung bewirkt worden ist, als Autor der Species zu nennen. Auf diese

Weise wird Jahr für Jahr namentlich den älteren großen Koryphäen der Wissenschaft eine Art nach der anderen entzogen, und wenn dies noch einige Jahrzehnte so fortgeht, könnte es sogar dahin kommen, daß wir z. B. Linnees Namen ganz und gar aus unseren floristischen Handbüchern verschwunden sähen! Das darf nicht sein. — Ich habe daher die jetzt von den Paläontologen gebrauchte, zuerst von den Engländern vorgeschlagene Methode der Benennung auch auf die Pflanzen angewendet, und bei der Versetzung einer Species in eine andere Gattung den Namen ihres Entdeckers mit dem Zusätze *sp. (species)* als Autornamen hinzugefügt. Sollten dabei meinerseits einige Mißgriffe vorgekommen sein, so bitte ich dieselben durch den Mangel mancher literarischer Hülfsmittel, die zur genauen Feststellung der ersten Autorschaft nöthig sind, zu entschuldigen: ich wollte auch hier wenigstens den Weg andeuten, den man auch in dieser Hinsicht meiner Ueberzeugung nach zu gehen hat.

Auch die in Mecklenburg gebräuchlichen deutschen Pflanzennamen, zu deren näherer Begründung und Erklärung bis jetzt so gut wie Nichts geschehen ist, habe ich zwar mit in den Kreis meiner Forschung gezogen, aber hier bleibt noch gar vieles zu leisten übrig. Denn die Unsicherheit in der Benennung der einzelnen Pflanzen ist selbst bei den Leuten, welche ihr Lebensberuf am meisten in practische Berührung mit dem Pflanzenreiche bringt, zum Erstaunen groß. Befragt man die Landleute, so wissen sie viele sehr hervorragende Pflanzenarten entweder gar nicht zu benennen, oder sie taufen sie nach Belieben, oder sie bringen sie bei gewissen sehr dehubaren Collectiv-

namen unter. Die Zahl derer, denen in weiteren Kreisen durchgängig ein bestimmter Name beigelegt wird, ist nur geringe.

Es giebt nun zwar schon ein älteres Verzeichniß der mecklenburgischen Pflanzennamen, welches Siemssen im J. 1793 im 2. Bde. des von ihm herausgegebenen Magazins veröffentlicht hat, und auch Niemann<sup>1</sup> u. a. haben späterhin dazu noch einige Beiträge geliefert, aber diese Verzeichnisse leiden an dem großen Uebelstande, daß sowohl manche Pflanzennamen aus Mangel einer feststehenden Schreibart sehr entstellt worden sind, als auch daß manche, da sie von Leuten gesammelt wurden, die keine Botaniker waren, eine unrichtige Deutung erfahren haben.

Man wundere sich daher nicht, wenn man in meinem nachfolgenden alphabetisch geordneten Namensverzeichnis viel weniger Namen, als bei meinen Vorgängern antrifft. Ich habe nämlich nicht allein manchen mir zweifelhaften Namen ausgeschlossen, sondern auch alle die plattdeutschen Namen, welche bloße Uebersetzungen der hochdeutschen sind. Von letzteren (den hochdeutschen) habe ich nur einige wenige aufgenommen, welchen bei uns eine andere Bedeutung, als im übrigen Deutschland, beigelegt wird, oder über deren Etymologie einige Bemerkungen zu machen waren,<sup>2</sup> — von den plattdeutschen nur diejenigen allgemeiner verbreiteten, die wirklich einen von der hochdeutschen Benennung ganz abweichenden Namen führen. Eine Vergleichung dieser letzteren Namen mit den verwandten Sprachen zeigt, daß darunter noch manche alte

1. T. Niemann diss. inaug. sistens prodromum Idiotici Mecklenburgensis etc. Rostock 1798. 8to. 28 pag.



germanische Benennungen sind, die im Hochdeutschen verloren gegangen sind, sich aber im Plattdeutschen erhalten haben und deshalb auch festgehalten zu werden verdienen; doch darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, daß vielleicht manche dieser Namen, besonders die mit den schwedischen verwandten, vielleicht durch die engen Beziehungen, in denen Mecklenburg und Vorpommern seit dem 30jährigen Kriege mit Schweden gestanden haben, erst in neuerer Zeit in unseren Gegenden wieder eingeführt worden sein mögen. Hinsichtlich der dänischen und schwedischen Pflanzennamen habe ich mich an *Neders Nomenclator botanicus* (zum Gebrauche bei der *Flora Danica*, Copenhagen 1769 Sto) gehalten. Einige Ableitungen aus dem Gothischen theilte mir Hr. Stud. jur. K. Schröder (aus Treptow) mit.

*Adebarsbloom*, — brod (*Adebar* = Storch) soll *Iris-Pseud-acorus* heißen.

*Adebarskasbeeren* oder — *Kasperm* auch *Ahsbeeren*, sind die Früchte des *Ribes nigrum*, das von seinen stark duftenden Blättern auch den Namen *Stinkstruhl* führt. — *Kasbeeren* oder *Kasperm* ist corruptirt aus dem alt-plattdeutschen *Karsbeeren*, welches wiederum von (*Prunus*) *Cerasus* abstammt; *Adebarskasbeeren* heißt also „*Storchkirschchen*.“

*Acker*, *Ecker* ist die Eichel; engl. *acorn*, gothisch *akran* (= Frucht.)

*Aegel*, *Egellörn*, *Säkel* und *Säker* sollen alles Namen der *Stratiotes aloides* sein, wofür aber die verwandten Sprachen gar keine Analogien darbieten.

*Aepelbuhrn*, *Eperle* soll *Acer campestre* genannt werden.

*Aesche* und *Aespe*, — diese Schreibart ist wohl nach Analogie der verwandten Sprachen der gewöhnlichen (*Eishe* und *Espe*) vorzuziehen. Ersterer Baum (*Fraxinus excelsior*) führt in Mecklenburg auch den Namen *zähe Aesche*, — die faule Aesche ist *Populus nigra*.

Die Aespe ist *Populus tremula*, die in *M.* auch *Bewer=Aesch* genannt wird.

*Ahl* nennen die Kinder die jungen Pflanzen des *Acorus Calamus*, mit denen sie im Frühlinge unter sich einen lebhaften Handel treiben.

*Ahlbeeren* s. *Adebarskasbeeren*.

*Ahlboom* aber ist *Lonicera Xylosteum*.

*Ahtenflott* wird in *M.* die *Wasserluse* (*Lemna*) genannt, in Schweden heißt sie *Andmat*, in Dänemark *Andemad*, d. i. *Entenspeise*; *flott* stammt von *flöttern* (engl. *to float*) und bezeichnet im Plattdeutschen die *Sahne*, weil sie oben auf der *Milch* schwimmt. *Entenflott* wäre demnach *Enten=Sahne* d. h. eine Lieblingspeise der Enten.

*Aisranke*, ist in *Meklenburg* und *Vorpommern* *Lonicera Periclymenum*, in anderen Gegenden Deutschlands soll es *Solanum Dulcamara* sein.

*Amtswied* wird in *M.* *Salix viminalis* genannt, weil diese *Weide* in den großherzogl. Ämtern von den Insassen vorschriftsmäßig in bestimmter Anzahl gepflanzt werden muß; auch *Elfwied* (*Elswiede*) wird sie genannt.

*Apen=ärseken* soll nach *Siemssen* die *Mispel* in *M.* genannt werden, mir ist der Name noch nicht vorgekommen. Es wäre dies ein merkwürdiges Zusammentreffen mit dem englischen *Volkswig*, der diese Frucht auf gleiche Weise bezeichnet, wie z. B. *Mercutio* in *Romeo und Julie* (II, 1) sagt: *maids call medlars, when they laugh alone, — an open arse.*

*Beefinge* stammt (nach *Mafmann*) von dem alt-gothischen Worte *basi* ab, und ist also nur ein Gattungsname, welcher „*Beere*“ bedeutet. Demgemäß deutet man bei dem Worte *Beefinge* durch hinzugefügte Bestimmungen an, welche Art von *Beere* gemeint sei: schwarze *Beefinge* sind *Vaccinium Myrtillus*, rothe *B.* *Vac. Vitis Idaea*, *Erd=Beefinge* aber *Erdbeeren*. — In *Meklenburg* ist dies Wort wenig gebräuchlich, desto mehr aber in der benachbarten *Mark Brandenburg*.

*Bewer=Aesch* — s. *Aesche*.

Bewergras, von „bewern“ d. h. zittern, ist *Briza media*; im Dänischen heißt sie *Befvergraes* und im Schwedischen *Baefwegraes*.

Bitterwied (wegen des bitteren Geschmacks der Rinde) und Blankwied (wegen ihrer glänzenden Blätter) heißt *Salix pentandra*.

Bizbeeren, Bickbeeren, — aus Bocksbeeren corrumpt, heißen die Früchte des *Vaccinium Myrtillus*; hin und wieder hört man in M. dafür auch wohl den Namen schwarze Beesinge, er ist aber wenig gebräuchlich.

Blankwied s. Bitterwied.

Blaugras ist *Carex stricta*, wegen der bläulichen Farbe ihrer Blätter, — nicht *C. acuta*.

Boarendred d. i. Bärenbred, Brommelbeeren werden in M. die Brombeeren genannt; auch Theerbeeren soll man sie nennen.

Brookwied ist *Salix triandra* und *cinerea*, welche beide feuchte Standorte lieben.

Bullgrawen, Drunkelbeeren, Puttgnaben sind Namen, welchen die Früchte des *Vaccinium uliginosum* führen sollen, von denen ich aber nur den zweiten aus eigener Erfahrung verbürgen kann.

Bullenpüsel heißen durch Metapher die Blüthenkolben der *Typha*-Arten; in England heißt die Pflanze bullrusch (rusch, welches sich in der deutschen Redensart „Rusch und Busch“ noch erhalten hat, bezeichnet überhaupt Sumpfgewächse verschiedener Art mit gras- und binsenartigen Blättern). Ob bei Shakespeare in Heinrich IV. Th. I. A. 2. Sc. 4. Falstaff mit dem Bull's pizzle auch unsere Pflanze bezeichnet, oder ob der Ausdruck ohne Metapher zu verstehen sei, muß ich dahingestellt sein lassen. — In M. soll die Pflanze auch Kettik heißen, und in der Mirower Gegend Dunnerkuel, dem dänischen *donnemorsköller* entsprechend.

Butterblume heißt ganz allgemein in M. das *Taraxacum officinale*.

Dag un Nacht ist in vielen Gegenden Mecklenburgs *Parietaria erecta*; auch im Dänischen führt sie diesen Namen (*dag og nat*); bei Ludwigslust aber (wie im Schwedischen *natt og dag*) bezeichnet dieser Name eine andere Pflanze, nämlich *Melampyrum nemorosum*.

Dowe (d. i. taube) Kattel s. Kattel.

Dreeblatt (d. h. Drei-Blatt) ist *Menyanthes trifoliata*.

Drunkelebeeren s. Bullgraven.

Dull Bitterkruth, Dull Dill, Dullkruth ist alles *Hyoscyamus niger*.

Dunnernettel (d. h. Donner-Messel) ist *Urtica dioica*.

Duwif, Duwof (bei Hamburg Dunop) *Equisetum spec.*

Genbeeren, Enekenbeeren sind die Früchte des *Juniperus communis*, der in M. die beiden Namen Wachholder und Knirr führt; im Schwed. heißt er En, Enbuske, Enebaerstraed und im Dän. Enebaertrae, Jenbaertrae, Ene, Ener, und Eine.

Egelhörn s. Aegel.

Eibenbaum s. Eibenboom.

Elfwied s. Amtswied.

Eller, im Schwed. alder ist der niederdeutsche Name für die Erle oder Else (*Alnus glutinosa*); das sehr ähnliche englische Wort elder bezeichnet aber eine ganz andere Pflanze, nämlich den Hollunder (*Sambucus nigra*).

Eperle s. Aepelduhrn.

Erd-Beesinge s. Beesinge.

Ejelsfortt, ein unästhetischer Name, den *Onopordon Acanthium* in M. führen soll.

Fettgras *Triglochin spec.*

Fiminstaaft soll *Fumaria officinalis* sein.

Foßbeeren, d. i. Fuchsbeeren, auch Hundbeeren (?) sind die Früchte des *Rubus caesius*.

Fothenkruth *Chenopodium Vulvaria*.

Fuhl-Aesch s. Aesche.

Fuhl-Boom d. h. Faulbaum, wird gewöhnlich *Prunus Pädus* genannt, aber auch *Rhamnus Frangula* wird darunter verstanden.

Fuhl-Liese, rode Mihre ist *Anagallis arvensis*.

Gähl (d. h. gelb) Wied ist *Salix vitellina*.

Gerste; sollte der engl. Name Barley wohl nicht mit dem gothischen *Baris* zusammenhängen?



Glansen sind die zum Gelbfärben benutzten Blumen der *Genista tinctoria*.

Gölling ist in *M. Calendula officinalis*.

Goosfleder, d. h. Gänsefleder, ist *Viburnum Opulus*.

Grän, — im Dän. und Schwed. Gran, ist *Pinus Abies*, — nicht *Picea*.

Grasnelle, ist *Statice Armeria var. maritima*.

Grundnettel (d. h. Grund = Nessel) ist ein Collectivname für verschiedene am Boden der Gewässer wachsende Pflanzen, namentlich *Potamogeton spec.* *Batrachium spec.* und? *Chara spec.* Vergl. Schwänbel.

Habbif, ist *Raphanus Raphanistrum*. — Als hochdeutscher Name für diese Pflanze, wie auch für *Sinapis arvensis*, wird in den Floren immer Heberich angegeben, ein Name, der in den verwandten Sprachen für diese Pflanzen fehlt und welcher, wie ich glaube, nur der *Glechoma hederacea* gebührt, — vergl. Huber.

Haffburn, d. i. Meer- oder Seedorf, im Dän. und Schwed. Haftorn, ist *Hippophaë rhamnoides*.

Hagebuche, Weißbuche *Carpinus Betulus*.

Hambutten, Luus- (d. h. Läuse) Beeren, sind die Früchte der wilden Rosen.

Hartboom *Cornus sanguinea*.

Hasenbraam, englisch broom, *Sarothamnus scoparius*.

Hasenklee (= Klee), Schwedisch harsyra (Hasensäure) ist *Oxalis Acetosella*. Vergl. Rukufsalat.

Hasenpöppeln *Malva sylvestris*; die Früchte dieser und der *M. neglecta* sind Pöppelkees (d. i. Käse) und Rattenkees.

Hidbernettel, (corrupt in Hirrennettel) hochdeutsch Eider- oder Eiternessel, ist *Urtica urens*, schwed. eternässla, von dem alt-hochdeut. eidan brennen; (des schwed. ettar und dän. edder heißt Eiter, Schlangengift).

Himbeere, engl. hind-berry, (Beere der Hindin) dän. hindbaer, himbaer, schwed. hinnbaer, ist die Frucht des *Rubus Idaeus*; bei Toitenwinkel sollen sie Hinselbeeren genannt werden.

Hölzik. (b. h. Holz) Appel und — Beer sind die Früchte der wilden Apfel- und Birnbäume.

Huder ist corrumpt aus Hedera (terrestris), dem pharmaceutischen Namen für *Glechoma hederacea*; vergl. Habbif.

Hülshusch, holländ. hulst, angelsächsl. holoegn, engl. holly, ist *Ilex Aquifolium*, anderweitig auch Stechpalme genannt, wegen des Gebrauchs, den die katholische Kirche am Palmsonntage hin und wieder von den immergrünen Blättern dieses Strauches macht, wie Göthe dies in folgenden Zeilen erklärt:

„Im Vatican bedient man sich  
Palmsonntags ächter Palmen,  
Die Cardinäle beugen sich  
Und singen alte Psalmen.  
Dieselben Psalmen singt man auch,  
Delzweiglein in den Händen,  
Muß im Gebirg zu diesem Brauch  
Stechpalmen gar verwenden,  
Zulezt, man will ein grünes Reis,  
So nimmt man Weidenzweige“ —

und zwar nahm man ehemals in Norddeutschland dazu die Zweige der schönen, schon sehr früh im Jahre blühenden Saalweide (*Salix caprea*), die daher hier auch noch hin und wieder Palmweide genannt wird.

Hundblume, Hundecamille *Anthemis Cotula*.

Hundsbeer s. Fohbeeren.

Ibenboom, Eibenbaum *Taxus baccata*, so benannt, weil sein zähes Holz früher zur Anfertigung der Eiben (b. i. Armbruste) und Bogen benutzt wurde.

Iloff *Hedera Helix*.

Johannisblut *Scleranthus perennis*, an dessen Wurzeln der scharlachrothe *Coccus polonicus* lebt.

Iper, die kleinblättrige Ulme, *Ulmus campestris*.

Kattenkees s. Hasenpöppel.

Kenster, Marentafen soll *Viscum album* genannt werden.

Kettik s. Bullenpöfel.

Klaap *Pedicularis palustris?* (Siemssen).

Klette, plattdeutsch: Klieven (*Lappa spec.*), heißt im engl. burr, im Schwed. burrar und im Dän. burrer und burre, dieser Name scheint in den deutschen Dialecten aber nicht vorzukommen.

Klewer, hochdeutsch: Klee; dänisch: klevver; engl. clover.

Klöter=Jacob (Klapper=Jacob) *Rhinanthus Crista galli*. Diese Pflanze führt auch den Namen Dove (taube) Mattel, engl. rattle-grass, dänisch rassel, — lauter Namen, die von dem Umstande entlehnt sind, daß ihre Samen in den Kapseln „klötern oder rasseln.“

Knickelbeeren sind die Früchte der *Fragaria collina* (nicht vesca!) weil das Abpflücken derselben vom Stelche einen knackenden Ton erzeugt.

Knirk s. Cenbeeren.

Knopp, schwed. knopp-graes ist *Centaurea Scabiosa*, deren Blüthenköpfe sehr groß und kugelig sind: daher erklärt sich auch der ob schöne Name Papenklöten.

Kopp=Wied s. Kropfweide.

Kramsbeeren heißen auf Kilgen die Früchte des *Vaccinium Oxycoccus*.

Krazbeeren sollen nach Weigel und Siemssen die Früchte des *Rubus fruticosus* heißen, wahrscheinlich ist dies aber eine Verwechslung mit *R. saxatilis*, der im Schwedischen den Namen krassbaer führt.

Krekenboom *Prunus insititia*.

Krönsbeere (d. h. Kranichbeere) engl. cran-berry, Lytebeer dän. tyttebaer, Preusselbeere (ob von dem slavischen brussnitza durch Einschlebung der Sylbe — el, wie in Brummelbeere von Brombeere, und Hinselbeere von Himbeere?) auch rothe Beesinge, — sind alles Bezeichnungen der Früchte von *Vaccinium Vitis Idaea*. Schon im J. 1795, und früher, kam diese wohlschmeckende Frucht in kleine Tönnchen eingemacht, unter dem Namen „Lingon“ aus Norwegen nach Mecklenburg, und sie wird hier auch noch jetzt hin und wieder von dorthier eingeführt.

Kropf=Krutth ist *Tanacetum vulgare*, weil es gegen den Kropf der Pferde gebraucht wird.

Kropp-Weide, Kopp-Wied ist die gekröpfte (vergl. das engl. to crop d. h. abstußen) *Salix alba*, deren Stamm durch diese Behandlung eine kopfförmige Anschwellung erhält.

Kübidik, dän. kidike, ist *Sinapis arvensis*.

Kuhblume ist in M. durchgängig *Caltha palustris*; auch im Dän. heißt sie koeblomer.

Kukuksalat nennen die Kinder die säuerlich schmeckenden Blätter der *Oxalis Acetosella*; auch Hasenflewer heißen die Blätter.

Lügenblatt, schwed. laekeblad von laeka heilen, ist *Plantago major*, deren Blätter auf Wunden gelegt, für ein gutes Heilmittel galten. Der corrumpirte Name Lügenblatt hat zu einem Kinderspiele Veranlassung gegeben, indem die Kinder aus der Anzahl der aus einem durchrissenen Blatte hervorragenden Blattnerben die Anzahl der Lügen, die sie sich haben zu Schulden kommen lassen, ermitteln wollen.

Leetharl ist *Lolium arvense*; sollte der Name mit dem englischen darnel zusammenhängen?

Liesch, Lüsich, Rusch werden die breiten, schwerdtförmigen Blätter monocotyledonischer Wasserpflanzen (*Iris*, *Typha*) genannt. Erstere Namen könnten mit dem Namen flower de luce zusammenhängen, den die Schwertlilie (*Iris*) im Englischen führt.

Liese, die Faule, ist *Anagallis arvensis*.

Lilgenconsalgen, eine Corruption aus *Lilium convallium*, dem pharmaceutischen Namen der *Convallaria majalis*.

Lingon s. Kronsbeeren.

Löhn, dän. lönn, schwed. lonn, lunn, ist *Acer platanoides*.

Lünich, dän. lemmike, ist *Veronica Beccabunga*.

Lungraff *Lobaria pulmonaria*.

Luusbeeren, d. i. Läusebeeren (wegen der rauhen, kratzenden Samenförner), s. Hambutten.

Luuskrut heißt bei Ludwigskrust *Pedicularis palustris*, weil dort, wo diese Pflanze wächst, das Heu nur laustig (d. h. schlecht) gedeihet. Im Dän. entsprechend: luuseurt, lüusegraes.

Maibuche, Rothbuche *Fagus sylvatica*.

Marentaken s. Fenster.

Marl ist *Melica coerulea*.



Mar-retsch, engl. horse-radish, ist *Cochlearia Armoracia*; dieser Etymologie gemäß ist also auch im Hochdeutschen „Märrettig“ zu schreiben, da der Name von Mähre = Pferd, und nicht von Meer abzuleiten ist. — Andere Beispiele ähnlicher aus Mißverständnis des Plattdeutschen entsprungener hochdeutscher Wortverdrehungen bieten die Namen Maulwurf und Reitwurm dar, welche Mullwurf und Reißwurm lauten müssen, so wie die bekannte Redensart: „sein Schäfchen ins Trockene bringen,“ in welcher aus dem „Schiffchen“ (plattb. Scheepken) gar ein Schaf gemacht worden ist.

Mihre ist *Alsine media*. Rode Mihre *Anagallis arvensis*.

Möhsch, schwed. möska, myska, myskja, dän. myske, mysike, heißt in M. der Waldmeister (*Asperula odorata*).

Muusklewer (Mäuskelee) ist *Trifolium arvense*, wegen seiner grauen, haarigen Blütenköpfe.

Mägenknee, d. h. mit 9 Knieen versehen, dän. knaegraes, heißt *Spergula arvensis*, wegen ihrer vielen (bis 9) starken Internodien.

Oeschchen, corrumpt aus Oesterchen d. h. Osterblume, ist die um Ostern schon blühende *Anemone Hepatica*.

Palmweide s. Hülsbusch.

Papenklöten s. Knoop.

Plogstiert, Briewkruth ist *Ononis spinosa*. Diese Pflanze wird in M. als Anzeichen eines mergelhaltigen Bodens betrachtet, ist aber doch, wo sie häufiger vorkommt, dem Landmanne sehr unangenehm, da ihre starken, zähen und tief in den Boden hinabreichenden Wurzeln beim Pflügen sehr hinderlich sind; die Pflugschar soll sich mitunter eher umbiegen, als daß sie die Wurzel herausriffe.

Pöppelkees s. Hasenpöppeln.

Poggenstohl, engl. ebenso toadstool, ist eine generelle Bezeichnung der Pilze in Mecklenburg. Was mögen nach dem Volksaberglauben die Poggen (Frösche) mit diesen Pilzen zu thun haben?

Porst und Post, diese beiden Namen werden bei uns vielfach mit einander verwechselt, ersterer gebührt aber nur dem *Ledum palustre*, und mit letzterem bezeichnet man in Mecklenburg die Wasserleuchter-Arten (Characeen). Im Schwed. und Dän. ist pors = *Myrica Gale*, *Myrica* *Gale*.

Praesterkragen, dän. praestekrage, schwed. praestkrage, ist

eine von der Gestalt der Blume hergenommene, sehr bezeichnende Benennung des *Chrysanthemum Leucanthemum*.

Preusselbeeren s. Kronsbeeren.

Puttgnaden s. Bullgrawen.

Quecke (spottweise auch wohl Sandflewel genannt,) engl. quickgrass, schwed. quicka, quickrot, quickhwete, dän. quikku, quikketa, ist *Triticum repens*, weil es so quick d. h. voller Lebenskraft und schwer auszurotten ist. — Von eben diesem Worte stammt auch ab der Name:

Quitschenboom, engl. quicken-tree, wohl so benannt wegen der lebhaften rothen und weithin scheinenden Farbe ihrer Beeren. — *Min, weil*  
 Kattel s. Klösterjacob.

Reeth, engl. reed, ist *Phragmites communis*. Im hochdeutschen hat sich der Name nur in dem Worte Niedgras (*Carex*) erhalten.

Remaas, ein jetzt verschollener Name, den noch im 16. Jahrhundert in Vorpommern das *Allium ursinum* führte, gehört wohl der slavischen Sprache an. In Schlesien heißt die Pflanze noch jetzt Kamisch.

Rode Mihre s. Mihre.

Röleke, dän. und norweg. röllike, schwed. rölleka, ist *Achillea Millefolium*.

Rothbuche s. Maibuche.

Rusch s. Bullenpfeil.

Saalweide ist *Salix caprea*, im Dänischen Selje Vidje, Schwedisch Sälq.

Säkel, Säker s. Negel.

Salomonsjügel, — siegel (hochd.), Salomons Segl, S. Signet (dänisch), Salomon's Seal (engl.) Seeau de Salomon (franz.), trägt seinen Namen von den kreisrunden, siegelförmigen Narben, die der absterbende Stengel am Wurzelstock zurückläßt. Eine so wunderbar von der Natur gezeichnete Pflanze mußte nothwendig früher officinell sein.

Salzkraut, schwed. salt-graes, ist *Triglochin maritimum*, welches salzhaltige Standorte liebt, obgleich es nicht ausschließlich an solchen vorkommt.

Schalboom, dän. und schwed. alm, ist *Ulmus campestris*.

Schawrusch (nicht Schaffrusch!) engl. shavegras, schwed. skaf-roer von skafva schaben, also Schabe-gras oder -rohr, ist *Equisetum hiemale*, dessen rauhe Stengel zum Glätten und Abschaben von verschiedenen Handwerkern benutzt werden. Die Endsyllbe Rusch ist schon erklärt.

Schinnwatt, in der Umgegend von Münster (Westphalen) Schienefoot, ist *Chelidonium majus*.

Schmargeln und Schmarten sollen die Beeren des *Rubus alpinus* benannt werden.

Schnittgras sind *Carex spec.*, wegen der scharfen, beim Abpflücken schneidenden Ranten, welche die Stengel mancher Arten haben. Der hochdeutsche Name Segge findet sich auch in dem engl. sedge wieder. Vergl. Neeth.

Schriep wird in der Umgegend von Sitz *Plantago maritima* genannt.

Schwabengrüze sind die Samenkörner des Mannagrases (*Glyceria fluitans*).

Schwändel sind die Wasserranunkeln (*Batrachium aquatilo divaricatum, fluitans*), oder auch *Potamogeton spec.*, also ein Collectivname, wie Grundnettel.

Schwienkohl (d. h. Schweine-) ist *Sonchus oleraceus* und *asper*.

Schwulstkruth, Vögelkruth ist *Senecio vulgaris*.

Spierboom ist *Sorbus torminalis*.

Spillboom d. h. Spindelbaum (engl. spindle-tree) ist *Evo-nymus europaeus*.

Sprickern, schwed. sprakved d. h. Holz, welches im Feuer knack oder prasselt, ist *Rhamnus Frangula*.

Sprickilgen, Waldwinde, engl. woodbine (vielleicht aus woodbind, d. h. auch Waldwinde, corrupt?) ist *Lonicera Periclymenum*.

Sprockwied (sprock = brüchig) ist *Salix fragilis*.

Stäckführn (d. h. Stechkörner) sind die als Volksmittel gegen Seitenstechen verwandten Samen der *Datura Stramonium* und des *Silybum Marianum*.

Stah up und geh weg (stehe auf und wandele!); mit diesem Namen bezeichnete man nach Simon Pauli schon um das J. 1640 in Mecklenburg *Erythraea Centaurium*, und zwar ohne Zweifel, weil diese Pflanze früher als Mittel gegen das Podagra gebraucht wurde. — In neuerer Zeit scheint aber jener Name für diese Pflanze gänzlich verloren gegangen zu sein, und man hat ihn irrthümlich auf die etwas ähnliche *Gentiana campestris* übertragen, wo er aber gar nicht motivirt ist. F. Schults sagte mir vor etwa 25 Jahren einmal, daß man damals jene beiden Pflanzen so benenne, — jetzt versteht man nur noch die letztere allein darunter.

Stechpalme s. Hülsbusch.

Stiernschott d. i. Sternschuß oder — schuppe, ist *Nostoc commune*, welches sich nach warmem Regen oft plötzlich in Menge auf den Wiesen zeigt; daher im Schwed. ähnlich sky-fall d. h. aus den Wolken gefallen, und im Dän. skyefald.

Stinkstruht s. Adebarskasbeeren.

Sührken, dat rohde, ist *Rumex Acetosella*.

Taage (d. h. zähe) Aesche s. Aesche.

Teufelsabbiß (*Succisa pratensis*), dievelsbid (dän.), devil's-bit (engl.), mors de diable (franz.), ist von dem Eindruck der Zähne so benannt, den man an der Wurzel zu bemerken glaubte und den man dem Teufel zuschrieb; er biß die Wurzel ab, weil er ihre Heilskraft (gegen Zauberei) den Menschen nicht gönnte.

Theerbeeren s. Boarndreck.

Thremse ist *Centaurea Cyanus*.

Thunriede ist ein Collectivname für verschiedene die Büsche durchdringende Pflanzen, wie *Galium Aparine*, *Bryonia alba*, *Convolvulus sepium*.

Thunriede (Baunseide) aber ist *Cuscuta europaea*.

Tytebeeren s. Kronsbeeren.

Unvertreed (d. h. was nicht vertreten werden kann) ist *Polygonum aviculare*, eine äußerst wehrsame Pflanze, die daher auch im Schwed. den Namen trampgraes d. h. Tretgras führt.

Vögelkruth ist *Senecio vulgaris*, ein Lieblingsfutter für manche Stubenvögel, wie z. B. die Canarienvögel; s. auch Schwulstkruth.



Walbwinde f. Sprinklitzen.

Wäpeldurn soll *Rosa canina* sein; ebenso auch Weicheldurn und Weichselburn, doch möchte ich glauben, daß mit letzteren Namen, wie mit dem schwed. wigeltorn, vielmehr *Rhamnus catharticus* bezeichnet werde.

Weedwinde ist *Convolvulus arvensis*.

Weißbuche f. Hagebuche.

Weizen stammt von dem gothischen hvaiteis.

Wesselnbeeren (d. h. Wechsel-) heißen im Plattdeutschen die Vogelkirschen (*Prunus avium*).

Wied (Weide) f. die verschiedenen Arten unter „Amts-W., Bitter-W., Blank-W., Brook-W., Elf-W., Gäh-W., Kopp-W., Kropp-W., Palm-W., Saal-W., Sprock-W.“

Wintergrön (—grün) ein Collectivname für verschiedene immergrüne Pflanzen, wie *Hedera* und *Vinca*; im Dän. bez. vintergrön *Hedera*, *Pyrola* und? *Trientalis*.

Witt Wäselken, d. h. weißes Wieselchen, ist *Draba verna*.

Wödenbunk *Cicuta virosa*.

Wörmth, engl. worm-wood d. h. Wurmholz, ist *Artemisia Absinthium*; Water-W. ist *A. maritima*.

Wriewkruth f. Plogstiert.

Wulverlei, d. h. Wohl verlei, ist *Arnica montana*.

Zesenbraam ist *Mentha viridis*.

### III. Das Bürgerrecht.

Hinsichtlich des dritten Punktes auf den ich bei meiner Arbeit besonders Rücksicht genommen habe, tritt uns sogleich die Frage entgegen: „darf jede innerhalb der Landesgränzen gefundene Pflanze mit gleichem Rechte Anspruch an das Bürgerrecht erheben, oder sind in dieser Beziehung bestimmte Unterschiede zwischen ihnen zu machen?“ Ich glaube, daß letzteres geschehen muß, indem man einen viel klareren Ueberblick über die Landesflora gewinnt, wenn

man ihre Bestandtheile nach verschiedenen Kategorien trennt. Ich unterscheide demnach in unserer Landesflora die eingeborenen, die recipirten und die erraticen Pflanzen als besondere Gruppen.

1. Unter den eingeborenen oder Urpflanzen verstehe ich natürlich nicht diejenigen Pflanzen, welche während einer der früheren geologischen Epochen zuerst auf dem Raume der Erdkugel, welcher jetzt Mecklenburg genannt wird, emporkeimten, sondern diejenigen, welche in dem ersten Zeitraume der gegenwärtigen Epoche, bevor der Mensch seinen cultivirenden Einfluß auf unseren Boden ausübte, sich aus freien Stücken hier ansiedelten. Dies geschah nachdem die tertiäre Flora, deren reiche, leider noch unerforschte Reste in den Braunkohlenlagern bei Malliß und Parchim begraben liegen, durch die Diluvialkatastrophe vernichtet worden war, denn durch diese erhielt unser Boden eine neue, aus den Trümmern zerstörter Felsmassen bestehende Decke. Wie diese sich wieder mit neuem Pflanzenwuchs, — dem Grundbestandtheil unserer jetzigen Flora, — bekleidete, ist ein Räthsel zu dessen vollständiger Lösung uns die Hülfsmittel durchaus fehlen. Einzelne Arten tertiärer Pflanzen mögen in ihren Samen jene Katastrophe überdauert haben und von Neuem auf dem Diluvium emporgekeimt sein; die Samen anderer mögen uns mit den Diluvialmassen selbst aus nördlicheren Gegenden zugeführt sein<sup>1</sup>; andere

---

1. Auf diesen Gegenstand hat G. Brückner zuerst meine Aufmerksamkeit gelenkt, und damit einen neuen Berührungspunkt zwischen den Botanikern und Geognosten Mecklenburgs aufgefunden. Wenn diese Hindeutung auch jetzt noch ohne bestimmte Begründung dasteht, so kann sie vielleicht bei fernerer besonnener Forschung eine solche erhalten, und dann zu interessanten wissenschaftlichen Folgerungen führen,

wurden über den neuen Boden hin durch Wind, Vögel und andere Zufälle verbreitet, deren nähere Erörterung für uns von keinem erheblichen Interesse sein kann. Wie viel Zeit darüber verfloß, bevor das Land seinen neuen, aus den eben bezeichneten Bestandtheilen zusammengewebten Pflanzenteppich erhielt, kann uns ebenfalls gleichgültig sein; die Hauptsache für uns ist es, daß bei allen diesen Vorgängen die Mitwirkung des Menschen völlig ausgeschlossen war. Diese Pflanzen, welche sich ohne alle menschliche Beihülfe in der Urzeit der jetzigen geologischen Epoche hier ansiedelten, und welche auch jetzt noch immer der Zahl ihrer Arten nach ein großes Uebergewicht über die späteren Eindringlinge behaupten<sup>1</sup>, betrachte ich als den wichtigsten Theil, den eigentlichen Stamm unserer Flora; ihnen, deren Ansiedlung allein durch Naturgesetze und Naturkräfte bedingt war, würde, wenn man mit aller Strenge verfahren wollte, auch nur allein das Bürgerrecht in unserer Flora zukommen.

2. Neben diesen Pflanzen hat sich aber später, seit Menschen dies Land bewohnten und cultivirten, noch eine ansehnliche Zahl von Arten unter der Regide dieser Cultur hier eingenistet und sich ebenso völlig heimisch gemacht, als jene ersten Ansiedler es schon waren. Diese Pflanzen

---

weßhalb man sie im Auge zu behalten hat. Vielleicht, daß es noch einmal gelingt, eben so für die auffallenden Verbreitungskreise mancher unserer Pflanzen bestimmte, durch die Diluvialbildung bedingte Ausgangspunkte nachzuweisen, wie dies schon jetzt in Betreff mancher Gesteine, aus denen die Diluvialmassen bestehen, der Fall ist.

1. Fast völlig rein hat sich die große, wenigstens zwei Drittheile der mecklenburgischen Pflanzenarten enthaltende Classe der Acotyledonen von späteren Beimischungen erhalten, indem wir nur ein einziges Lebermoos und einige wenige auf bestimmten cultivirten Pflanzen schmarrigirende Pilze als solche nachweisen können.

sind es, welche ich unter dem Namen der recipirten oder eingebürgerten zusammenfasse, und welche einen zweiten, secundären Bestandtheil unserer Flora bilden. Diese recipirten Pflanzen sind theils solche, welche man in früherer Zeit als Nahrungspflanzen, Färbepflanzen, officinelle Pflanzen und auch Zierpflanzen allgemeiner cultivirte, und welche entweder aus angebornem Freiheitstrieb der Aufsicht ent schlüpften, oder, weil man ihrer bei verändertem Cultur zustande nicht mehr bedurfte, vernachlässigt die dargebotene Freiheit benutzten, und nun in Feld und Wald ent schlüpfend, sich in ihrer Lebensweise den alten Bürgern unserer Flora völlig gleich stellten, wie dies z. B. mit *Humulus Lupulus*, *Cochlearia Armoracia*, *Carum Carvi*, *Oenothera biennis*, *Anthemis arvensis*, *Onopordon Acanthium*, *Acorus Calamus*, *Datura Stramonium*, *Hyoscyamus niger*, *Artemisia Absinthium*, *Ornithogalum nutans* u. s. w. der Fall gewesen zu sein scheint. Noch weit zahlreicher aber waren diejenigen Pflanzen, welche seit den ersten Anfängen der Acker- und Garten-Cultur hieselbst als unzertrennliche Begleiter der Culturpflanzen, wider den Willen des Menschen, mit diesen zusammen als Unkräuter in das Land eingeschleppt wurden, und welche vermöge ihrer kosmopolitischen Natur, welche leider auch so vieles thierische Ungeziefer besitzt, dies Land bald völlig als ihre Heimath zu betrachten anfangen<sup>1</sup>. So schleppten z. B. die Cerealien

1. Bei manchen dieser Pflanzen ist aber (worauf Wahlberg schon vor längerer Zeit aufmerksam gemacht hat,) die Einbürgerung nur eine scheinbare, indem die Samen der Unkräuter jährlich mit den Culturpflanzen unabsichtlich eingeerndet und auch wieder ausgejät werden; ohne menschliche Beihülfe würden sie, der winterlichen Kälte ohne Schutz Preis gegeben, bald zu Grunde gehen.



die Papaver-Arten, *Agrostemma Githago*, *Centaurea Cyanus*, *Ranunculus arvensis*, *Lolium temulentum*, *Avena strigosa*, *Sinapis arvensis* u. s. w. ein; der Wein: *Camelina sativa*, *Neslea paniculata*, *Lolium arvense*, *Lepidium sativum*, *Cuscuta epilinum*; der Hauf: die Orobanche ramosa, die Küchengewächse: *Euphorbia Peplus*, *Solanus nigrum*, *Fumaria officinalis* u. s. w. Einzelne Arten endlich haben auch durch anderweitige Zufälle noch in neuerer Zeit sich völlig bei uns eingebürgert, wie z. B. *Erigeron canadense*, *Leersia oryzoides* und? *Alyssum calycinum*; noch andere scheinen sogar noch gegenwärtig damit beschäftigt zu sein, wie z. B. *Galinsogea parviflora*, *Rudbeckia laciniata* und *Collomia grandiflora*.

3. Zu allen diesen vorstehend bezeichneten Pflanzen gesellen sich nun noch einige, die ich mit dem Namen der erratischen bezeichne. Ich verstehe darunter solche, welche durch ihren fremdartigen Character, ihr vereinzelt und unbeständiges Vorkommen und ihre auffallenden Standorte als nur temporär verwilderte oder durch Zufall ausgesäete Pflanzen sich zu erkennen geben. So ist z. B. durch Zufall manche kultivirte Pflanze zeitweise den Gärten entschlüpft, was namentlich bei Ludwigslust geschehen ist, wo im Laufe des letzten Jahrhunderts theils in den fürstlichen, theils in privaten Gärten so viele ausländische Arten gezogen worden sind, von denen nun z. B. *Epimedium alpinum*, *Potentilla recta*, *Rosa pimpinellifolia*, *Omphalodes verna*, *Geranium phaeum*, *Biotia macrophylla*, *Allium carinatum* und manche andere über die Grenzen der Gärten hinausgeschweift sind, — lauter Pflanzen, welche unserer eingebornen norddeutschen Flora völlig fremd

sind. Manche Gartenpflanzen werden auch nicht selten mit Dung auf die Felder verschleppt, wo sie sich dann auf längere oder kürzere Zeit in kleinen Colonien ansiedeln, wie z. B. *Ornithogalum umbellatum*, *Muscari botryoides* u. a. Andere Fremdlinge zeigen sich hin und wieder unter dem Getreide, der Luzerne, dem Wein, aber stets nur vereinzelt und bald wieder verschwindend, weil ihr Same nur zufällig mit ausländischer Saat eingeführt wurde und sie sich hier nicht zu acclimatificiren vermögen, wie dies z. B. der Fall ist mit *Adonis aestivalis*, *Papaver hybridum*, *Saponaria Vaccaria*, *Silene noctiflora*, *Centaurea solstitialis* und *Calcitrapa*, *Helminthia echiodes*, *Specularia Speculum*. Noch andere Pflanzen dieser Art kommen endlich zufällig durch Schiffsverkehr an unsere Küsten, und zeigen sich an den Ballaststellen unserer Häfen und in der Nähe derselben, was namentlich bei Warnemünde und Rostock schon mehrfach beobachtet worden ist (z. B. *Fumaria densiflora*, *Diploxys tenuifolia*, *Hordeum maritimum*, *Bunias orientalis*).

Alle diese erratischen Pflanzen können nun ebenso wenig auf das Bürgerrecht in der mecklenburgischen Flora Anspruch machen, als z. B. die nordafrikanische *Otis houbara* und die südeuropäische *Sphinx Nerii* zu unserer Fauna gehören, obgleich beide schon einmal innerhalb der Grenzen unseres Landes als Streifzügler gesehen worden sind. Erwähnt müssen in den Florenverzeichnissen zwar auch diese verirrtten Pflanzen werden, es muß aber in der Weise geschehen, daß sie als ein fremdartiger Bestandtheil der Flora sogleich in die Augen fallen. Ich habe sie daher in dem späterhin folgenden Pflanzenverzeichnisse zwar namhaft ge-

macht, sie aber in der fortlaufenden Reihe unserer Pflanzenbürger ohne Zahl und mit kleinerer Schrift gedruckt, eingeschoben, so daß sie bei den statistischen Berechnungen nicht mit in Anschlag kommen.

Sehr wünschenswerth würde es sein, wenn wir auch die Gruppe der recipirten Pflanzen auf gleiche Weise aus unseren Florenverzeichnissen ausscheiden könnten, denn sie trüben sehr wesentlich die wissenschaftliche Erkenntniß und klare Anschauung der eigenthümlichen Landesflora, indem sie deren individuelle Eigenthümlichkeit verdunkeln und besonders die Vergleichung verschiedener Floren mit einander sehr trüglich machen. Will man z. B. zwei deutsche Florengebiete (etwa die von Mecklenburg und Nassau) mit einander vergleichen, und berechnen, wie viele gemeinschaftliche Pflanzen beide haben, und wie viele jedem dieser Länder nur allein zukommen, so wird man, wenn die recipirten Pflanzen nicht vorher ausgeschieden werden, zu einem gänzlich falschen Schlusse über den Grad der Verwandtschaft zwischen diesen Floren gelangen, indem die große Anzahl der in beiden eingebürgerten Pflanzen dieselbe weit größer erscheinen lassen wird, als sie in der That ist, wenn man nur die ihnen ursprünglich angehörigen in Anschlag bringt. Für die wissenschaftliche Betrachtung der Landesflora wäre es also, wie gesagt, sehr vortheilhaft, wenn man auch alle diese Eindringlinge ganz unberücksichtigt lassen könnte, — allein dem steht leider ein großes Hinderniß dadurch im Wege, daß man bei vielen Pflanzen nicht mit Bestimmtheit nachweisen kann, ob sie eben Eindringlinge sind, oder nicht. Zwar tragen sie eine Art von Geburtschein in der eigenthümlichen Weise ihres Vorkommens bei sich, indem

sie meistens ausschließlich, oder doch vorzugsweise auf cultivirte Plätze beschränkt sind, und daher wohl anzunehmen ist, daß sie, bevor es Bodencultur im Lande gab, aus Mangel an zuzugenden Wohnplätzen nicht vorhanden waren; allein allzu fest dürfen wir auch auf diese Annahme nicht bauen, da (wie Röper schon darauf hingewiesen hat,) auch einzelne Urpflanzen, deren Wohnplätze sich die Cultur bemächtigte, sich auf die cultivirten Räume geflüchtet und dort auch behauptet haben mögen. Doch dürfen wir wohl alle diejenigen Pflanzen wenigstens, welche durch weite Ländergebiete hindurch gleichmäßig und ausschließlich nur an cultivirten Orten vorkommen (wie sehr auch die Urpflanzen in diesen Ländern verschieden sein mögen), als fremde Eindringlinge betrachten, und von diesem Grundsatz ausgehend, werde ich in der später folgenden Uebersicht unserer Flora alle diejenigen Arten, bei denen es mir wahrscheinlich ist, daß sie in die Kategorie der recipirten Pflanzen gehören, zwar nicht aus der Zahl unserer Pflanzenbürger ausschließen, aber doch durch einen vorgesezten Stern sogleich kenntlich machen.

Stellen wir alle unserer Flora ursprünglich fremden Pflanzen, nach der Art, wie sie ihr Eindringen in Mecklenburg bewerkstelligt haben mögen, zusammen, so wird sich etwa folgendes Resultat ergeben:

1. Es haben sich wider den Willen des Menschen, in den meisten Fällen aber doch mit dessen unabsichtlicher Beihülfe, eingeschlichen und vollständig eingebürgert:

Ranunculus arvensis.	Papaver Rhoëas.
Delphinium Consolida.	dubium.
Papaver Argemone.	Chelidonium majus.



- Fumaria officinalis.*  
*Barbarea praecox.*  
*Sisymbrium officinale.*  
*Erysimum cheiranthoides.*  
*Sinapis arvensis.*  
*Alyssum calycinum.*  
*Camelina sativa.*  
*Thlaspi arvense.*  
*Lepidium campestre.*  
     *sativum.*  
*Senebiera Coronopus.*  
*Neslea paniculata.*  
*Raphanus Raphanistrum.*  
*Agrostemma Githago.*  
*Oxalis stricta.*  
     *corniculata.*  
*Ervum hirsutum.*  
     *tetraspermum.*  
*Oenothera muricata.*  
*Bryonia alba.*  
*Falcaria Rivini.*  
*Aethusa Cynapium.*  
*Caucalis daucoides.*  
*Chaerophyllum bulbosum.*  
*Sherardia arvensis.*  
*Asperula arvensis.*  
*Valerianella olitoria.*  
     *coronata.*  
     *dentata.*  
     *Auricula.*  
*Erigeron canadensis.*  
*Anthemis arvensis.*  
     *Cotula.*  
*Chrysanthemum segetum.*  
*Senecio vulgaris.*
- Cirsium arvense.*  
*Carduus acanthoides.*  
*Onopordon Acanthium.*  
*Centaurea Cyanus.*  
*Sonchus oleraceus.*  
     *asper.*  
*Xanthium Strumarium.*  
*Campanula Rapunculus.*  
     *rapunculoides.*  
*Cuscuta Epilinum.*  
*Lithospermum officinale.*  
     *arvense.*  
*Anchusa arvensis.*  
*Solanum nigrum.*  
*Hyoscyamus niger.*  
*Antirrhinum Orontium.*  
*Linaria minor.*  
     *Elatine.*  
     *vulgaris.*  
*Veronica agrestis.*  
     *Buxbaumii.*  
     *hederaefolia.*  
*Melampyrum arvense.*  
*Orobanche ramosa.*  
*Nepeta Cataria.*  
*Lamium amplexicaule.*  
     *purpureum.*  
*Galeopsis Ladanum.*  
     *ochroleucum.*  
*Stachys arvensis.*  
     *annua.*  
*Marrubium vulgare.*  
*Leonurus Cardiaca.*  
     *Marrubiastrum.*  
*Anagallis arvensis.*

<i>Chenopodium hybridum.</i>	<i>Panicum filiforme.</i>
<i>urbicum.</i>	<i>crus galli.</i>
<i>murale.</i>	<i>Setaria verticillata.</i>
<i>album.</i>	<i>viridis.</i>
<i>glaucum.</i>	<i>glauca.</i>
<i>polyspermum.</i>	<i>Alopecurus agrestis.</i>
<i>Vulvaria.</i>	<i>Leersia oryzoides.</i>
<i>Blitum bonus Henricus.</i>	<i>Apera Spica venti.</i>
<i>rubrum.</i>	<i>Avena strigosa.</i>
<i>Artiplex roseum.</i>	<i>fatua.</i>
<i>Polygonum Convolvulus.</i>	<i>Bromus secalinus.</i>
<i>dumetorum.</i>	<i>mollis.</i>
<i>Euphorbia helioscopia.</i>	<i>arvensis.</i>
<i>Peplus.</i>	<i>Gaudinia fragilis.</i>
<i>exigua.</i>	<i>Hordeum murinum.</i>
<i>Mercurialis annua.</i>	<i>Lolium temulentum.</i>
<i>Urtica urens.</i>	<i>perenne.</i>
<i>dioica.</i>	<i>arvense.</i>

2. Verwilderte, der Cultur entflohenen Pflanzen, von denen nur die mit einem \* bezeichnete Minderzahl als local oder allgemein eingebürgert zu betrachten ist, sind nach meinem Dafürhalten folgende:

<i>Eranthis hiemalis.</i>	* <i>Viola odorata.</i>
<i>Helleborus viridis.</i>	* <i>Reseda luteola.</i>
<i>foetidus.</i>	* <i>Saponaria officinalis.</i>
<i>Berberis vulgaris.</i>	<i>Silene Armeria.</i>
<i>Epimedium alpinum.</i>	<i>conica.</i>
<i>Brassica oleracea.</i>	<i>Malva mauritiana.</i>
<i>Rapa.</i>	<i>Geranium phaeum.</i>
<i>Napus.</i>	<i>pyrenaicum.</i>
<i>nigra.</i>	<i>Erodium moschatum.</i>
* <i>Sinapis alba.</i>	<i>Cytisus nigricans.</i>
<i>Hesperis matronalis.</i>	<i>Medicago sativa.</i>
* <i>Cochlearia Armoracia.</i>	* <i>Melilotus alba.</i>

- \*Trifolium pratense,  
     \*repens.  
 Galega officinalis,  
 Ervum monanthos.  
 \*Prunus insititia.  
     \*avium?  
 Potentilla recta.  
     alba.  
 Rosa pimpinellifolia,  
     cinnamomea.  
     turbinata.  
 \*Oenothera biennis.  
 Portulaca oleracea.  
 Sedum album,  
     hybridum.  
 \*Ribes grossularia,  
     \*rubrum.  
 \*Carum Carvi?  
 Bupleurum rotundifolium,  
 Levisticum officinale,  
 \*Pastinaca sativa?  
 Anthriscus Cerefolium,  
 Sambucus Ebulus,  
     \*nigra?  
 Aster salicifolius.  
     Novi Belgii.  
 Biotia macrophylla.  
 \*Inula Helenium.  
 Galinsogea parviflora,  
 Rudbeckia laciniata,  
 Helianthus tuberosus.  
 \*Artemisia Absinthium,  
     pontica.  
 \*Matricaria Chamomilla?  
 \*Chrysanthemum Parthenium,  
     \*inodorum.  
 Calendula officinalis.  
 Echinops sphaerocephalus.  
 Silybum marianum,  
 Tragopogon porrifolius.  
 Lactuca virosa.  
 Ligustrum vulgare.  
 Collomia grandiflora.  
 Omphalodes verna.  
 Borago officinalis.  
 Physalis Alkekengi.  
 Nicandra physaloides.  
 Atropa Belladonna.  
 Lycium barbarum.  
 \*Datura Stramonium.  
 Verbascum speciosum.  
     Blattaria.  
 Scrophularia vernalis.  
 Elsholtzia cristata.  
 Amaranthus Blitum,  
     retroflexus.  
 Blitum virgatum,  
 Atriplex hortense.  
 Daphne Mezereum.  
 \*Aristolochia Clematidis.  
 \*Parietaria officinalis.  
 Cannabis sativa.  
 \*Humulus Lupulus.  
 \*Acorus Calamus.  
 Narcissus Pseudo-Narcissus.  
 Leucojum vernum.  
     aestivum.  
 Tulipa sylvestris.  
 \*Ornithogalum nutans.  
     umbellatum.

<i>Allium Schoenoprasum</i> .	* <i>Panicum sanguinale</i> .
<i>carinatum</i> .	<i>Phalaris canariensis</i> .
* <i>Muscari botryoides</i> .	<i>Avena flavescens</i> .
<i>Colchicum autumnale</i> .	<i>Lolium italicum</i> .

3. Für verirrete, d. h. nur zufällig mit anderen Sämereien verstreute, aus den Gärten entflohene, oder durch den Schiffsverkehr mit der Ballasterde fremder Länder an unsere Küste verschleppte Pflanzen, welche nur zeitweise in unserer Flora auftauchen und immer bald wieder verschwinden, halte ich folgende:

<i>Adonis aestivalis</i> .	<i>Carduus pycnocephalus</i> .
<i>Papaver hybridum</i> .	<i>Centaurea calcitrapa</i> .
<i>Fumaria densiflora</i> .	<i>solstitialis</i> .
<i>Arabis pauciflora</i> .	<i>Helminthia echioides</i> .
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> .	<i>Specularia Speculum</i> .
<i>Lepidium latifolium</i> .	<i>Nonnea pulla</i> .
<i>Bunias orientalis</i> .	<i>Linaria arvensis</i> .
<i>Viola uliginosa?</i>	<i>Echinopsilon hirsutus</i> .
<i>Reseda lutea</i> .	<i>Obione portulacoides</i> .
<i>Saponaria Vaccaria</i> .	<i>Chenopodium Botrys</i> .
<i>Silene noctiflora</i> .	<i>Polygonum tataricum</i> .
<i>Dianthus barbatus</i> .	<i>Calamagrostis litorea</i> .
<i>Lathyrus tuberosus</i> .	<i>Avena brevis</i> .
<i>Ononis arvensis</i> .	<i>Polypogon monspeliensis</i> .
<i>Medicago maculata</i> .	<i>Poa procumbens</i> .
<i>Rosa lucida</i> .	<i>Hordeum maritimum</i> .
<i>Scandix Pecten</i> .	<i>Lunularia vulgaris</i> .
<i>Asperula tinctoria</i> .	

4. Endlich kommen auch noch einige für unsere Flora zweifelhafte Pflanzen in Betracht. Es sind dies theils Pflanzen, deren ganzes Vorkommen zweifelhaft ist, da dasselbe niemals durch einen bestimmt nachweisbaren



Fund dargethan worden ist, theils diejenigen, bei denen die Richtigkeit der specifischen Bestimmung Zweifel erweckt. Es gehören in diese Kategorien:

<i>Glaucium luteum.</i>	<i>Pulmonaria angustifolia.</i>
<i>Viola persicifolia.</i>	<i>Veronica praecox.</i>
<i>Dianthus arenarius.</i>	<i>Teucrium Scorodonia.</i>
<i>Cerastium brachypetalum.</i>	<i>Utricularia spectabilis.</i>
<i>Trapa natans.</i>	<i>macroptera.</i>
<i>Bryonia dioica.</i>	<i>Asarum europaeum.</i>
<i>Galium parisiense.</i>	<i>Nartheceum ossifragum.</i>
<i>Convolvulus Soldanella.</i>	<i>Stipa pennata.</i>

Welche Ursache des Zweifels in Betreff jeder einzelnen der hier aufgezählten Pflanzen obwaltet, wird in der systematischen Uebersicht der Flora genauer erörtert werden, da diese ohne Ausnahme alles enthalten wird, was bis jetzt (mit Recht oder Unrecht) zur mecklenburgischen Flora gerechnet worden ist. Wie sehr man daher auch von den Principien abweichen möge, welche ich bei dem später folgenden Floren-Verzeichnisse befolgt habe, so wird es doch bei dem practischen Gebrauche, wie ich hoffe, Niemand im Stiche lassen; denn wenn man nur wissen will, was bis jetzt gefunden worden ist und wo es vorkommt, so bleibt es gleichgültig, ob eine Pflanze als Species, Varietät oder Bastard, aufgeführt, und ob ihr das Bürgerrecht ertheilt oder vorenthalten worden ist.

Standorte habe ich nur bei den Phanerogamen, Farnen und Algen angeführt, und zwar auch nur bei den feltneren, nicht allgemein durch das Land verbreiteten Pflanzen. Auch hier that eine Revision sehr Noth, und ich habe stillschweigend manchen verdächtigen Fundort, der

von meinen Vorgängern angegeben war, ausgeschlossen. — Den einzelnen Arten Beschreibungen hinzuzufügen, würde eine überflüssige Raumverschwendung sein, da es ja schon so viele allgemeine deutsche Floren mit Gattungs- und Speciesdiagnosen giebt (z. B. von Garcke für die Phanerogamen und von Rabenhorst für die Kryptogamen), aus denen der Botaniker sich Rath's erhalten kann.

#### IV. Geographische Verbreitung der Pflanzen.<sup>1</sup>

Wenn auch das gesammte Gebiet unserer Flora nur klein ist, indem es nur einen Flächenraum von etwa 292 □M. umfaßt, so treten darin dennoch, wenn man die geographische Verbreitung der einzelnen Pflanzen ins Auge faßt, einige der näheren Berücksichtigung werthe Erscheinungen hervor. Da unserem Lande Gebirge gänzlich fehlen,

1. Bei der Ausarbeitung dieses Abschnittes ist mir das botanische Tagebuch sehr zu Statten gekommen, welches ich auf den Rath meines Oheims G. Brückner seit dem Jahre 1834 über alle meine Excursionen geführt, und worin ich Namen und Standort jeder Pflanze aufgezeichnet habe, die mir von einigem Interesse zu sein schien. Jetzt thut es mir Leid, daß diese Notizen nicht noch umfangreicher ausgefallen sind, denn vieles, was mir damals der Aufzeichnung nicht werth schien, hat bei der vorliegenden Arbeit große Bedeutung für mich erlangt. — Durch eigene Erfahrung belehrt, kann ich daher nicht unterlassen allen denen, welche die Natur zu ihrem Studium machen, noch einmal (vergl. Archiv IV. 178 ff.) dringend ans Herz zu legen, alle ihre Beobachtungen sogleich an Ort und Stelle niederzuschreiben, und die eingesammelten Objecte sogleich sorgfältig zu etikettiren. Ich berufe mich für diesen Rath auf eine Autorität, die kein Naturforscher unbeachtet lassen darf, — auf Saussüre. Derselbe sagt: „Eine sehr häufige Quelle von Irthümern ist es, wenn man der Treue seines Gedächtnisses oder der Richtigkeit seiner ersten Wahrnehmung ein allzu großes Vertrauen schenkt. Zu diesen beiden Arten von Vertrauen ist man sehr leicht geneigt, und man kann sich gegen die häufig aus denselben entspringenden Irthümer nur dadurch sichern, daß man sogleich an

— denn die höchsten Erhebungen des Bodens erreichen kaum die Höhe von 600 Fuß, — so können auf diesem kleinen Areal klimatische Ursachen, die sonst einen so bedeutenden Einfluß auf die Vertheilung der Pflanzen ausüben, hier zur Erklärung der angedeuteten Erscheinung nicht herbeigezogen werden. Es verbleibt uns dazu nur die verschiedenartige geognostische Beschaffenheit des Bodens in einzelnen Landestheilen, so wie der Einfluß, den eine gewisse chemische Beschaffenheit des Wassers, durch welches die Wurzeln der Pflanzen getränkt werden, an einigen Localitäten auf dieselben ausübt.

Auch hinsichtlich der geographischen Vertheilung der einzelnen Pflanzenspecies läßt sich unsere Flora in mehrere Elemente zerlegen. Nämlich während gewisse Species in größerer Anzahl durch das ganze Gebiet ziemlich gleich-

Ort und Stelle alle Beobachtungen, welche von einiger Wichtigkeit zu sein scheinen, vorzüglich wenn sie etwas verwickelt sind, aufschreibt, und sorgfältig etikettirte Proben der Gegenstände mitnimmt, welche das Object der Beobachtung bilden: denn es sind nicht allein die seltenen und außergewöhnlichen Gegenstände, von welchen man Proben einsammeln muß. Der Zweck des Naturforschers ist nicht der, eine Sammlung von Curiositäten zusammen zu bringen, sondern er muß Proben von den scheinbar gemeinsten Dingen einsammeln, weil die genaue Untersuchung ihrer Beschaffenheit für die Wissenschaft von Interesse sein kann. Er sichert sich dadurch die Mittel seine ersten Wahrnehmungen zu bestätigen oder zu berichtigen, und tiefere Untersuchungen und Vergleichen anzustellen, welche sogleich an dem Fundorte selbst vorzunehmen ihm unmöglich war.“ — An einer anderen Stelle sagt Saussüre noch über denselben Gegenstand: „Zuweilen habe ich aus kleinen Umständen Licht gezogen, die ich, ohne ihren Werth zu kennen, aus bloßer Liebe zur Genauigkeit an Ort und Stelle selbst zu Papier gebracht hatte. Allein wie oft habe ich nicht herzlich bedauert, daß ich die Aufzeichnung von irgend einem Detail vernachlässigte, dessen Werth ich erst einsah, wenn es mein Gedächtniß nicht mehr zurückrufen konnte.“

mäßig verbreitet sind, andere Arten aber nur vereinzelt und so sporadisch vorkommen, daß sich daraus bei uns wenigstens keine gesetzmäßige Beziehung zu den geognostischen Eigenthümlichkeiten des Bodens erkennen läßt, bleibt endlich noch eine beträchtliche Anzahl von Pflanzen übrig, bei denen eine solche Beziehung mehr oder weniger deutlich zu Tage tritt, indem sie entweder ausschließlich, oder vorzugsweise in Gegenden von einer bestimmten geognostischen Bodenbeschaffenheit zum Vorschein kommen. Doch ist die Abhängigkeit der Pflanzen von der mineralischen Beschaffenheit des Bodens hier lange nicht so groß und in die Augen fallend, als man dies in anderen Ländern mit schärfer ausgeprägten geognostischen Eigenthümlichkeiten gefunden haben will. „Beobachtung der einheimischen Flora, (so habe ich mich über diesen Gegenstand schon an einer anderen Stelle ausgesprochen<sup>1.</sup>), würde unsere Botaniker nimmer auf die Lehre von den bodensteten, bodenholden und bodenvagen Pflanzen geführt haben, da erstere (mit Ausnahme der ausschließlich auf Salzboden wachsenden,) hier fast gar nicht vorkommen, die bodenholden aber, je nachdem sie den Kalk, Thon oder Sand lieben, meistens mit so geringen Quantitäten dieser Stoffe sich begnügen, daß sie die zu ihrer Existenz nöthige Menge derselben in unseren buntgemischten diluvialen Lagern häufig auch da antreffen, wo keins dieser Mineralien vorzugsweise den Character des Bodens bestimmt, — ja mitunter dem bloßen Auge gar nicht einmal vorhanden zu sein scheint.“ Dennoch können wir, je nachdem auf der Oberfläche un-

---

1. Die Insel Rügen. Reise = Erinnerungen von E. Boll. Schwerin 1858 S. 170.



feres diluvialen Bodens in größerer Erstreckung Haide, Sand oder Lehm vorwaltet, auch drei diesen Bodenarten entsprechende Florengebiete unterscheiden, deren charakteristische Eigenthümlichkeit aber weniger in dem ausschließlichen Vorkommen gewisser Pflanzenarten innerhalb der einzelnen Gebiete, als in dem häufigeren Vorkommen, der üppigeren Entwicklung und in der bestimmten Zusammengruppirung gewisser Pflanzen besteht, von denen wir aber die meisten vereinzelter, und mit anderen Arten vergesellschaftet, auch noch in anderen Florengebieten wieder antreffen. Es scheint also weniger der mineralische Stoff des Bodens, als (wenn ich mich so ausdrücken darf,) die ganze physische Constitution desselben zu sein, welche die Wahl der Pflanzen auf bestimmte Standorte hinlenkt.

1. Das Hauptgebiet unserer **Haideflora** ist die 40 bis 50 □M. große Haideebene, welche von der Stör und Elbe im N., der Elbe im S. W., Lauenburg im W. und durch eine vom Nordende des Schalsees bis zur Südspitze des Schweriner Sees gezogene Linie im N. begrenzt, den südwestlichen Theil Mecklenburgs bildet. Sie bildet einen Theil der großen Haidesteppe, die in Jütland beginnend, durch Schleswig, Holstein, Hannover und Holland bis zur Mündung der Schelde sich hinzieht, und ist eine an Seen und Teichen sehr arme, aber von vielen Nebenflüssen der Elbe durchzogene, von N. D. (Spiegel des Schweriner Sees c. 118' Par.) nach S. W. (Elbspiegel bei Dömitz 32' Par.) allmählig sich senkende Fläche, aus der nur sporadisch und inselartig einige unbeträchtliche Bodenschwellungen hervortreten. In malerischer Hinsicht eine

trauerige Einöde, ist sie für den Geognosten von großem Interesse. Denn außer dem mächtigen Gypsstock, der hier bei Lüthten und Probst Jesar aufsteht, so wie der unsern Carenz entspringenden Salzquelle, nebst den bei eben diesem Orte entdeckten, der Kreideformation angehörigen Lagern, entwickelt sich in dieser Haideebene die Tertiärformation am mannigfaltigsten und ausgedehntesten. Man kennt hier ein ansehnliches Braunkohlenlager, Maunerde und Septarienthon, — kurz, tertiäre Schichten scheinen hier vorzugsweise die nächste anstehende Unterlage für die diluviale Bodendecke zu bilden. Letztere zeigt hier eine ganz eigenthümliche Beschaffenheit, welche es mir sehr wahrscheinlich macht, daß hier die Diluvialmassen ihren Ursprung hauptsächlich zerstörten tertiären Lagern verdanken. Denn das nordische Diluvialmaterial tritt hier auffallend gegen die tertiären Stoffe zurück, namentlich sind Gerölle sehr selten. Die tieferen diluvialen Bodenschichten bestehen aus mannigfach wechselnden Lagern eines Sandes, welcher viel feiner ist, als der gewöhnliche Diluvialsand, und unverkennbar aus tertiären Lagern stammt; aber er ist nicht mehr in seiner ursprünglichen Reinheit vorhanden, sondern mit den diluvialen Feldspathcrystallen gemengt. Darüber pflegt die verrufene Fuchserde zu lagern, ein braungelber, stark eisenchüssiger und bisweilen steinartig verhärteter Sand, welcher diesen Eisengehalt ohne Zweifel gleichfalls zerstörten tertiären Lagern (in denen er z. B. in Mecklenburg durch den Sternberger Kuchen und den Limonit sandstein vertreten war,) verdankt, und welcher wahrscheinlich wieder das Material zur Bildung des Raseisensteines abgiebt, der in so großer Menge in der

Haideebene vorkommt. Die oberste Decke des Bodens, wo der flüchtige Sand nicht unmittelbar zu Tage tritt, bildet ein saurerer, kohligharziger Humusboden, zu dessen Bildung wahrscheinlich zerstörte tertiäre Torfmoore, vielleicht auch Braunkohlenlager, das hauptsächlichste Material hergegeben haben.

Stellenweise tritt auch auf größeren Strecken der feine und daher auch sehr flüchtige Sand unmittelbar zu Tage. Wer ihn genauer kennen lernen will, darf nur einmal die beweglichen Felder von Bokup, Wendisch-Wehningen oder Belsch (südwestlich von Schwerin) im trockenen Sturme gesehen haben. Auf halbe Meilen weit trüben gelbe Sandwolken die Luft bis zu einer Höhe von mehr als 100', und der Landmann ist in solchen Gegenden genöthigt, seine Felder durch Anpflanzung von Tannen vor der Versandung zu schützen, aber auch diese vermögen nur unter dem Schutze von Tannenreisern, mit denen die ganze junge Pflanzung überdeckt werden muß, Wurzel zu fassen und empor zu wachsen. Ein kleines Loch in der schwachen Narbe solcher Sandfelder erweitert der Sturm oft binnen wenigen Jahren zu einem wahren Sandsee, aus dem noch einzeln stehende Bänke, wie Inseln von 4 bis 6' Höhe, hervorragen, als Merkzeichen, wie groß die Masse des weggeführten Sandes sei. An diesen Bänken sieht man denn auch deutlich, wie dünne Schichten von Dammerde wohl 3 bis 4 Mal und öfter mit mehr als fußdicken Sandschichten wechseln, und wie also dieselbe Stelle schon mehrere Male das Schicksal der Versandung erlitten hat. In dem großen Bauerdorfe Jabel, 2 M. südwestlich von Ludwigslust, ist der Sand so flüchtig, daß ich dort die

Särge auf dem Kirchhofe theilweise entblößt sah, weil der Wind die sie bergende Decke hinweggewehet hatte.

Lehm Boden kommt nur in den vorhin erwähnten isolirten hügelartigen Bodenschwellungen zum Vorschein: es sind dies gleichsam kleine fruchtbare Dasen in der großen mecklenburgischen Haidesteppe.<sup>1</sup>

Der flüchtige Sand, die Fuchserde und jener saure Humusboden gehören alle zu denjenigen Stoffen, welche einer gedeihlichen Pflanzenentwicklung am wenigsten günstig sind, und daher zeigt denn auch die Flora überall wo sie zu Tage tritt im Allgemeinen einen sterilen, kränklichen Character. Doch giebt es auch manche Pflanzenarten, denen ein solcher Boden besonders zusagt, und die daher in Mecklenburg nur hier, entweder ausschließlich, oder doch in größerer Anzahl und Ueppigkeit, angetroffen werden, so daß also auch dies Gebiet dem Botaniker manches Eigenthümliche und Interessante darbietet. G. Brückner hat schon im Jahre 1841 im Anhang zu Langmanns Flora von Mecklenburg eine so treffliche Schilderung der Haideflora gegeben, daß ich nicht umhin kann, dieselbe der nachfolgenden Darstellung zu Grunde zu legen.

Die Nadelholz-Waldungen der Haideebene werden durch *Pinus sylvestris* gebildet, die aber sich hier lange nicht so kräftig entwickelt, als dies in dem Gebiete der später zu erwähnenden Sandflora der Fall ist. In diesen

---

1. Weitere Auskunft über die geognostische Beschaffenheit der verschiedenen mecklenburgischen Landestheile geben meine Geognosie der deutschen Ostseeländer (Neubrandenburg 1846), und meine geognostischen Wanderungen durch Mecklenburg (im Archiv f. meckl. Landeskunde, Schwerin 1855 S. 335 ff. und 525 ff.).



Wäldern herrschen von den Laubmoosen *Hypnum cupressiforme* und *uncinatum* vor, — merkwürdiger Weise aber fehlen alle Usneen; unter den Pilzen sind häufig *Agaricus muscarius* und *emeticus*, *Cantharellus cibarius*, *Boletus luteus* und *edulis*. Eine mehr vereinzelte Erscheinung in den Tannenwäldern der Haide bleibt *Anthericum Liliago*, *Hypericum pulchrum*, und ganz wieder ausgerottet soll *Lycopodium Chamaecyparissus* bei Quaast sein. Auf den großen offenen Haideflächen bildet *Calluna vulgaris* die vorwaltende Bedeckung des Bodens, und dazwischen treten, wo derselbe sandiger wird, *Hypnum albicans*, *Racomitrium canescens* und *ericoides*, so wie auch Cladonien sehr häufig auf; auch *Trematodon ambiguus* ward bei Ludwigslust an einer solchen Stelle gefunden. Wo der Boden etwas feuchter wird, mischt sich die zierliche *Erica Tetralix* in großen Rasen darunter, und wird stellenweise sogar überwiegend. Zwischen diesen beiden Haidekräutern finden sich häufig *Genista anglica* und *pilosa*, *Potentilla Tormentilla*, *Anthericum ramosum*, *Rhynchospora alba* und *fusca*, *Triodia decumbens*, *Nardus stricta*, *Molinia coerulea*, *Juncus squarrosus*, *Succisa pratensis* und (wenngleich einzeln, doch gar nicht selten,) die prachtvolle *Gentiana Pneumonanthe*, *Cicendia filiformis*, *Arnica montana*, *Pedicularis sylvatica*, *Thesium ebracteatum*, *Sanguisorba officinalis*, und, obwohl nicht häufig, und in neuerer Zeit immer mehr verschwindend, gruppenweise *Scorzonera humilis*. Nimmt die Masse des Bodens zu, so zeigen sich einzelne Polster von *Sphagnum cym-bifolium* und *Dicranum glaucum* auf denen *Drosera rotundifolia* und *intermedia* häufig sind, während zwischen ihnen

*Litorella lacustris*, *Sagina procumbens*, *Peplis Portula* und *Ranunculus Flammula* var. *reptans* in Menge vorkommen; feuchten sandigen Boden liebt *Galium saxatile*. Die Wiesen charakterisiren sich durch das häufige Vorkommen von *Senecio paludosus*, *Euphorbia palustris*, *Thalictrum flavum*, *Cnidium venosum*, (seltener *Seseli annuum*), *Helosciadium inundatum*, *Gratiola officinalis*, *Veronica longifolia* und *Teucrium Scordium*; unter den Laubmoosen finden sich *Hypnum cuspidatum* und *filicinum* nebst *Climacium dendroides* sehr häufig. Wird der Boden torfiger, so gewinnen *Vaccinium uliginosum* und *Oxycoccus*, *Ledum palustre* und *Andromeda polifolia* die Oberhand. — Bei zunehmender Trockenheit des Bodens treten nächst den Heidekräutern (*Calluna* und *Erica*) die beiden *Scleranthus*, *Alchemilla Aphanes*, *Spergula arvensis* und *Spergularia rubra* häufig auf, zwischen denen *Corrigiola litoralis*, *Illecebrum verticillatum* und *Anemone pratensis* gedeihen. Noch größere Dürre bezeichnen *Anemone Pulsatilla* und *A. vernalis* (welche aber in diesem Gebiete nur ein einziges Mal gefunden wurde, ebenso wie *Jurinea cyanoides*), *Genista anglica* und *pilosa*, *Viola canina* und *tricolor*, *Corynephorus canescens*, *Nardus stricta*, *Carex arenaria*, — seltener *Ammophila arenaria* und *Elymus arenarius*. Es finden sich in den Sandschollen und Tannenwäldern dieses Gebietes fast alle gewöhnlichen Sandpflanzen (auch die meisten *Pyrola*-Arten), aber weit seltener und kümmerlicher, wie in der eigentlichen Sand-Flora. Eine eigenthümliche Erscheinung (auf welche mich G. Brückner aufmerksam machte,) ist es aber, daß lange anhaltende Dürre den

tiefwurzelnden Culturpflanzen der Haideebene weniger nachtheilig wird, als denen des Sandgebietes. Es muß dies in den geognostischen Verschiedenheiten beider Gebiete seinen Grund haben.

Den Uebergang der Haide in trockenen Laubwaldboden bezeichnet vorzugsweise *Vaccinium Myrtillus*, seltener *V. Vitis Idaea*, *Genista tinctoria* und *germanica*, *Trientalis europaea*, *Galium saxatile* und *Ilex Aquifolium*, welcher, obgleich nicht häufig und in neuerer Zeit in seinem Vorkommen immer mehr beschränkt, doch mit *Salix aurita*, *Prunus Padus*, *Rhamnus catharticus*, Birken, Erlen und Brombeergesträuchen, das sparsame Unterholz dieser Waldungen bildet, die selbst aus Birken, Eichen (seltener aus Buchen), und wo es feuchter wird, aus Erlen bestehen, — in der Lewig sogar stellenweise aus *Acer Pseudo-Platanus*. Die Hauptbedeckung des feuchten Waldbodens ist *Pteris aquilina*, dem sich an Farnen auch noch *Polystichum spinulosum* und *Asplenium Filix femina*, *Osmunda regalis*, an Laubmoosen *Hypnum squarrosum* häufig zugesellen; auf offeneren Stellen sind häufig: *Mercurialis perennis*, *Melandrium rubrum*, *Lamium maculatum*, *Galebodolon luteum*, *Paris quadrifolia*, *Oxalis Acetosella*, *Viola palustris* (und stellenweise auch *canina* var. *lactea*), *Circaea lutetiana* und *alpina*, *Cardamine pratensis*, *amara*, *hirsuta*, *Melampyrum cristatum*, und in Sümpfen *Calla palustris*, *Utricularia vulgaris*, *intermedia* und *minor*. — Diese Laubwälder entbehren mit dem Unterbüsch der Waldungen in dem Gebiete der Lehmsflora, welches aus Haseln, Linden, *Cornus sanguinea*, *Lonicera Xylosteum* u. a. besteht, auch viele der häufigsten und

schönsten Schützlinge desselben, die hier entweder gänzlich fehlen, oder doch nur so selten und vereinzelt vorkommen, daß sie auf den Character dieser Flora keinen Einfluß haben können, wie z. B. *Anemone Hepatica* und *ranunculoides*, *Pulmonaria officinalis*, *Dentaria bulbifera*, *Corydalis cava*, *Asperula odorata*, *Melica nutans*, *Campanula persicifolia*, *Orobus vernus* und *niger*, *Polystichum Filix mas*. — Den Ackerfeldern, auf denen nur Roggen, Hafer und Buchweizen cultivirt wird, fehlt fast gänzlich die Zierde des *Papaver Rhoeas*, *Delphinium Consolida*, der Chamille und die Plage des *Bromus secalinus*: sie besitzen dafür strichweise häufig *Muscari botryoides*, *Galeopsis ochroleuca*, und leider zu häufig *Chrysanthemum segetum*. Den Hügeln und Weideplätzen fehlen *Viola hirta*, *Trifolium montanum*, *Salvia pratensis*, *Barbarea vulgaris*, *Malva Alcea* und *Plantago media*; an Sumpfpflanzen fehlt *Helosciadium repens*; an Ruderalpflanzen fehlen oder sind sehr selten *Hyoscyamus niger*, *Marrubium vulgare*, *Xanthium strumarium* und *Anthemis tinctoria*, statt deren aber stellenweise *Atriplex rosea* und *Atropa Belladonna*, doch letztere nur auf Bauerhöfen verwildert. An alten hölzernen Zäunen findet sich *Weisia cirrhata* sehr häufig; den Granitgeröllen fehlt *Lecidea geographica* gänzlich. — Als eine charakteristische, wenn auch nicht häufige Pflanze unseres Haidegebietes nenne ich endlich noch *Gnaphalium luteo-album*, welches an Kirchhofsmauern (z. B. bei Ronow!) u. a. D. vorkommt. Auch zwei Pflanzen, welche keineswegs gerade Haidepflanzen sind, wurden bis jetzt nur erst in diesem Gebiete gefunden, nämlich *Chrysosplenium oppositifolium* und *Potamogeton*



densus. Häufiger, als in anderen Gegenden des Landes kommt *Callitriche autumnalis* hier vor.

Das Aussehen der Haldeebene hat sich übrigens im Laufe der Zeit sehr verändert. Sie war nicht allein früher viel walddreicher, indem auf einer Charte vom Jahre 1552 unter dem Namen der Jabelhaide ein großer Wald dargestellt ist, der den ganzen Raum zwischen Walsmühlen, der Ende, Redefin, Picher und Kraak ausfüllte, sondern auch noch im Anfange des zweiten Decenniums unseres Jahrhunderts waren ihre flachen breiten Thäler, durch welche die oben erwähnten inselartigen Höhen getrennt werden, namentlich die Thäler Elde, Rognitz und Ende, regelmäßig im Frühling und Herbst größtentheils von dem sich dort ansammelnden und bei der geringen Neigung des Bodens keinen Abfluß findenden Regenwasser bedeckt, und in sehr nassen Jahren verlief sich das Wasser das ganze Jahr hindurch nicht. Jetzt ist aber durch zweckmäßige Abzugsgräben fast das ganze Terrain trocken gelegt, und bedeutende Ortschaften (z. B. Langenhaide, Neu-Bresgard, Menckendorf, Neu-Karstädt, Neu-Fresenbrügge u. a.) sind dort im Laufe der letzten Jahrzehnte entstanden, deren Obstpflanzungen und Getreidfelder den Beweis liefern, daß auch dieser Boden dem fleißigen Arbeiter den Ertrag nicht versagt. — Bei Langenhaide sind jedoch noch einige Wasserlachen übrig geblieben, die eine bemerkenswerthe Erscheinung zeigen. Sie sind von nur geringer Ausdehnung, sehr flach, und entstehen ebenfalls durch Ansammlung von Regenwasser, welches in der wärmeren Jahreszeit austrocknet, so daß der Boden der Lachen dann zum Vorschein kommt. Dieser besteht aus einer ganz schwarzen,

oft nur wenige Zoll dicken Erdschicht, welche unmittelbar auf Sand lagert; es zeigt sich dann aber auf ihm auch nicht die geringste Spur einer Vegetation, sondern ganz nackt bleibt er den Sommer über liegen. Auf diesem schwarzen, pflanzenleeren Boden erheben sich aber inselartig in großen Zwischenräumen einzelne schroff aufsteigende Bänke, deren Oberflächen-Ausdehnung durchschnittlich 9 bis 12 Quadratfuß, und deren Höhe 2 bis 4 Fuß betragen mag; ihre Seiten fallen senkrecht zum Boden der Lache ab. Nach G. Brückner's Ermittlung<sup>1</sup> bestehen diese Bänke aus den abgestorbenen Wurzeln verschiedener Sumpfpflanzen, die an diesen vereinzelt Stellen einen ihnen zusagenden Boden fanden. Da sich aber diese Pflanzen nicht über die ihnen von der Natur gesteckten Gränzen hinaus in horizontaler Richtung verbreiten konnten, mußten sie sich nach oben hin auszudehnen suchen, und so siedelte sich denn die eine immer wieder auf den abgestorbenen Nesten der anderen an. *Carices* legten das Fundament, auf welchem später *Vaccinium Myrtillus* und *uliginosum*, so wie *Calluna vulgaris* fortbaueten; zuletzt erschienen sogar einige *Salices*. Diese Bänke, mit so scharf begränzten Umrissen auf dem pflanzenlosen Boden ruhend, sind so auffallend, daß sie gewiß von jedem bemerkt werden, den sein Weg durch diese Gegend hinführt. — Erst in neuester Zeit hat eine ganz ähnliche Erscheinung, welche die Moore Ungarns in der Gegend von Pesth zeigen, die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen. Auch dort erblickt man auf nacktem künstlich trocken gelegten Moorboden derartige aus Wurzelgeflecht bestehende

1. S. m. Geognosie der deutschen Ostseeländer 1846 S. 18 f.

isolierte Säulen von 2 bis 4' Höhe, — daselbst Zsombék genannt, — deren Hauptmasse, nach Dr. A. Kerner's Untersuchung, aus den Stolonen und Wurzeln der *Phragmites communis* besteht, auf denen sich dann oben Rasen von *Carex stricta* angesiedelt haben; ja bei einzelnen der von ihm untersuchten Zsombék-Säulen, waren die verflochtenen Rhizome der *Phragmites* noch gar nicht abgestorben, sondern vegetirten noch fort, indem sie rings um die Säule herum Rohrhalme trieben.<sup>1</sup>

Auch der eigentliche trockene Haideboden wird in Mecklenburg durch die Cultur von Jahr zu Jahr mehr beschränkt. Seine waldfreien, uncultivirten Flächen werden meistens zur Viehweide benutzt, aber auch durch das sogenannte Abplaggen (d. h. Abschälen der bewachsenen Boden = Narbe durch eine eiserne, sehr breite Hacke,) sehr ruinirt. Der so gewonnene dünne und sehr trockene Rasen (Plaggen genannt,) wird mit wenigem Dunge gemischt in viereckigen Bänken aufgeschichtet, um später als sehr mittelmäßiger Dung für den Acker zu dienen. Die abgeplaggenen Stellen aber tragen viele Jahre hindurch nichts als *Ceratodon purpureus* und einige andere kümmerliche Kryptogamen, wie z. B. *Polytrichum piliferum*, *aloides* und *nanum*, mehrere *Cladonien*, so wie *Stereocaulon tomentosum*. — Mit besserem Erfolge wird dort jetzt seit etwa 10 Jahren die Gründüngung mit *Lupinus luteus* betrieben; ich sah sie daselbst auf einer Reise, die

1. Kerner in den Verhandlungen der zool. botan. Gesellschaft in Wien Bd. VIII. Sitz.-Ber. S. 33 und Abhandlungen S. 315 wozu auch auf Taf. 7 ein anschauliches Bild dieser Zsombék-Moore gegeben ist.

mich im Jahre 1852 durch diese Gegend führte, zum ersten Male, und vernahm, daß sie erst seit kurzer Zeit dort zur Anwendung käme.

Eine besondere Zierde erhält dies Haidegebiet an seiner südwestlichen Gränze, so weit die Elbe dasselbe bespült, noch dadurch, daß diesem Strome mehrere Pflanzen, ohne grade Haidepflanzen zu sein, hierher aus dem südlichen Gränzgebiete gefolgt sind, und nun einen Bestandtheil seiner Uferflora bilden. Dahin rechne ich *Erysimum strictum*, *Oenothera muricata*, *Eryngium campestre*, *Petasites tomentosus*, *Senecio nemorensis*, *Villarsia nymphaeoides*, *Mentha Pulegium*, *Scutellaria hastifolia*, *Salsola Kali*, *Plantago arenaria*, *Euphorbia Esula*, *Allium acutangulum* und *Scirpus maritimus*; auch *Cucubalus baccifer* und *Cuscuta monogyna* mögen auf diesem Wege nach Mecklenburg verschleppt sein. Eine ganz vereinzelte Erscheinung an unserem Elbstrande aber ist *Ononis arvensis*.<sup>1</sup>

Ein anderer gleichfalls zum Gebiete der Haideebene gehöriger höchst eigenthümlicher Landstrich ist leider in botanischer Hinsicht fast noch eine terra incognita. Es ist dies die gegen 2 □ M. große ungefähr 120 Par. Fuß über dem Ostspiegel liegende Bruch- und Wiesenniederung, die den alten slavischen Namen Lewitz (d. h. Wald, Holz) führt, und sich vom südlichen Ende des Schweriner

---

1. *Malva rotundifolia* gehört gleichfalls zu den Zierden der Elbflora, ist aber dieser nicht ausschließlich eigen, da sie noch zahlreicher in der Seestrandflora vorkommt. *Anemone pratensis* wächst in einer merkwürdigen grünblühenden Varietät auf den Elbweiden bei Boizenburg.



Sees bis zur Mündung der Stör in die Elde, nördlich von Neustadt, herabzieht. Sie wird in der Richtung von N. nach S. von der Stör durchflossen, und ihr Boden liegt so horizontal, daß die Geographen früher in Zweifel darüber waren, ob jenes Gewässer als ein Abfluß, oder als ein Zufluß des Schweriner Sees zu betrachten sei. Nach einer Notiz aus dem 16. Jahrhundert wurde sie damals als fürstlicher Thiergarten benutzt, und noch zu Anfang des 17. Jahrhunderts gab es dort „wilde“ (d. h. verwilderte) Pferde. Wie Siemssen berichtet, wurde auch früher die herzogliche Küche aus der Lewitz mit Wasser-*nüssen* (*Trapa natans*) versehen, — einem Gewächs, welches seit die Botanik in Mecklenburg wissenschaftlich betrieben wird, hier im Lande nicht mehr gesehen worden ist. Ob es jetzt auch dort (wie in manchen anderen Gegenden Deutschlands und im ganzen Schweden,) ausgestorben sei, bleibt noch sorgfältig zu ermitteln, da jenes negative Zeugniß, daß keiner unserer Botaniker diese Pflanze gesehen hat, nichts entscheidet. Denn nur selten betritt der Fuß eines solchen jenes schlangen-<sup>1</sup> und wasserreiche, von einem Labyrinth von Flüssen, Canälen und Gräben durchschnittene Gebiet, und er beschränkt sich dann auch wohl nur auf den etwas zugänglicheren Rand desselben; ein Versuch das Innere genauer wissenschaftlich zu durchforschen, ist wenigstens noch niemals zur öffentlichen Kunde gelangt, und auch wahrscheinlich noch niemals — gemacht worden.

---

1. Die giftige, sonst nur sporadisch in Mecklenburg vorkommende schwarze Otter (*Vipera Berus*) soll in der ganzen Haideebene, — vorzüglich aber in der Lewitz, — noch sehr häufig sein. Vergl. Archiv 5, 199.

Zur Zeit des 7jährigen Krieges<sup>1</sup> war die Lewitz noch in ununterbrochenem Zusammenhange mit der Neustädter Bürgerhorst, dem Wöbbelin=Warlow=Ludwigslust=Cunnerschen Holz und die Zuflucht für Männer, Pferde und Rind vor den aufgreifenden Preußen. Noch vor wenigen Decennien sah man durchreisend auf den freien Wiesenflächen Heerden von 20—30 Hirschen ruhig weiden oder im Grase liegen und die Zahl der Hirsche in der Lewitz wurde damals auf 3000 geschätzt.

Ein zweites kleineres Haidegebiet liegt im nordöstlichen Mecklenburg zwischen Rostock, Marlow, Ribnitz und der Ostsee, und erstreckt sich von da in das angrenzende Neu-Vorpommern hinein, über den Dars, den Zingst bis nach Barth und Stralsund. Seine Flora ist der jenes größeren sehr ähnlich, und an besonderen Eigenthümlichkeiten wüßte ich nur das häufigere Vorkommen der *Anemone vernalis*, so wie das Auftreten der in jenem Gebiete fehlenden *Myrica Gale* zu nennen. Das isolirte Erscheinen von *Allium ursinum* muß in besonderen Verhältnissen (des Standortes?) seinen Grund haben, da diese Species auch anderweitig als eigentliche Haidepflanze nicht vorkommt.

2. **Die Sandflora.** — Ihr Gebiet ist ein sandiger Landstrich, welcher den südlichen Theil von Mecklenburg=Strelitz, in der Breite von Weisdin ( $\frac{1}{2}$  M. nördlich von Neustrelitz) bis Fürstenberg einnimmt und sich dann in nordwestlicher Richtung bis auf das südliche Ende des Schweriner Sees hin fortzieht, bevor er dasselbe aber erreicht, sich nordwärts wendet, und in allmählig abnehmender Breite endlich bei Kirch=Mulsow ausläuft. Grünow,

Weissdin, Waren, Serrahn, Zehna und Sternberg bezeichnen ungefähr die nördliche Gränzlinie dieses Gebietes, während die südliche durch Fürstenberg, die Müritz, den Kölpin, den Flesen-See, Malchow, das nördliche Ende des Plauer Sees, Goldberg und Krivitz angedeutet wird. Diese im ganzen sehr flache und einförmige Gegend gehört dennoch zu den am höchsten gelegenen Theilen Mecklenburgs, indem sie den Rücken einer durch Seen-Reichthum ausgezeichneten, etwa 250–300' hohen Bodenschwellung einnimmt, welche in der Richtung von S.=D. nach N.=W. unser Land durchzieht, und hier die Wasserscheide zwischen Ost- und Nordsee bildet. Ihre Oberfläche besteht aus nordischem Geschiebesande, welcher viel reicher an Feldspath ist, wie der im vorigen Abschnitte erwähnte Haidesand. Unter demselben kennt man an einigen Punkten Kalklager, welche der Kreideformation angehören (bei Babbe, Roggentin, Rossentin, Sparow, Malchow), und bei Grünow in Mecklenburg-Strelitz bildet tertiärer Septarienthon die Unterlage des Bodens.

Der Reichthum dieses Sandes an Feldspath, der sich unter atmosphärischen Einflüssen leicht zersetzt, erklärt es, warum seine Flora lange nicht so kümmerlich ist, wie die der Sandschollen der Haideebene, obgleich sie mit diesen, wie schon oben bemerkt wurde, viele gemeinschaftliche Pflanzen besitzt. Auch hier ist die Tanne der vorherrschende Waldbaum, aber sie ist von schlankem, kräftigen Wuchs, und der Boden des Waldes ist mit reichen Laubmoospolstern bedeckt, in denen alle Arten von *Pyrola*, zumal die schöne *P. umbellata*, ferner *Lycopodium complanatum*, *annotinum* und *Selago*, *Goodyera repens*, *Monotropa hypo-*

pithys, *Empetrum nigrum*, *Linnaea borealis*, *Epilobium angustifolium*, *Senecio viscosus* und *sylvaticus*, hin und wieder auch *Genista pilosa* und *germanica* üppig vegetiren. In Waldlichtungen erblickte ich stellenweise häufig ein großes *Verbascum*, — wahrscheinlich thapsiforme, an den Waldrändern den prachtvollen, goldgelben Hasenbräm. Die ziemlich trockenen begrasteten Hügel schmücken sich zeitig mit *Anemone Pulsatilla* und *pratensis*, *Potentilla opaca* und *verna* (nebst deren Varietät *cinerea*), *Viola canina*, *Carex praecox*, *ericetorum* und *montana*, seltener mit *Berteroa incana* und *Plantago arenaria*. Naekte Stellen werden hin und wieder mit *Teesdalea nudicaulis*, *Cerastium semidecandrum*, *Spergula arvensis* und *Illecebrum verticillatum* bekleidet. Westlich von der Müritz ist im südlichen Theile von Mecklenburg-Strelitz, etwa von Neustrelitz an, *Euphorbia Cyparissias* sehr häufig, und sie läßt sich von da in fast ununterbrochenem Zuge bis 2 M. südwärts von Berlin verfolgen; vereinzelte Erscheinungen in eben diesem Mecklenburg-Strelitzschen Landestheile sind *Arabis arenosa* und *Astragalus arenarius*, — das Vorkommen von *Dianthus arenarius* ist aber noch sehr zweifelhaft. — In manchen Gegenden dieses Gebiets, z. B. bei Neustrelitz, Mirow, Wesenberg, Fürstenberg u. s. w. haben die Tannenwälder eine eigenthümliche Physiognomie und ihr Boden ist mit Ausnahme einer dünnen Narbe von Laubmoosen und Gräsern fast völlig kahl! Dies rührt daher, daß die Bewohner dieser Gegenden aus Mangel an Stroh gezwungen sind Fichtennadeln als Streue zu gebrauchen, und sie diese in den Wäldern zusammenharken, wodurch alle au-



deren aufkeimenden Pflanzen zerstört werden. Dieser Industriezweig ist dort so wichtig, daß im Jahre 1848 unter den vielen an die Landesherrschaft gestellten Forderungen auch mehrere Petitionen um freies Fichtennadeln-Sammeln vorkamen.

Audere durch häufiges Vorkommen charakteristische Pflanzen unseres Sandgebietes sind außer den schon genannten *Sagina procumbens*, *Spergularia rubra*, *Potentilla argentea*, *Galium verum*, *Erigeron acris*, *Helichrysum arenarium*, *Carlina vulgaris*, *Arnoseris minima*, *Hieracium pilosella*, *Calluna vulgaris*, *Arctostaphylos Uva ursi* (selten), *Vaccinium Vitis idaea*, *Thymus angustifolius*, *Trientalis europaea*, *Salix repens*, *Betula alba*, *Carex hirta*, *arenaria*, *Agrostis vulgaris*, *Aira flexuosa*, *Corynephorus canescens*, *Nardus stricta*, *Blechnum Spicant*, *Bryum argenteum*, *Hypnum albicans purum*, *strigosum* und *Crista castrensis*, *Polytrichum piliferum*, *Racomitrium canescens* und *ericoides*, *Ceratodon purpureus*, *Jungermannia albicans* u. s. w. — Besonders interessant durch eine reiche Sandflora ist der große Tannenwald zwischen Tadel, Kössentin und Carow, der es verdiente, einmal in botanischer Hinsicht gründlich ausgebeutet zu werden.

Auch hier sind Roggen, Hafer und Buchweizen die wichtigsten Culturpflanzen auf den Aeckern; die Brachfelder haben Ueberfluß an *Filago arvensis* und *minima*, so wie an *Rumex Acetosella*; alle diese aber werden an Menge noch weit übertroffen durch den Mäuseflec, dessen Blüthenköpfe oft die Felder wie mit einem dichten, grauen Schleier überdecken.

Auffallend ist der Reichthum der Seen dieses Gebietes an Charen, welche mit einem Kalküberzuge bedeckt, fuderweise aus dem Wasser herausgefischt und unter dem Namen „Post“ zur Düngung der Sandfelder verwendet werden.<sup>1</sup> Ihr reichliches Vorkommen ist aber nicht dem Sande, sondern ohne Zweifel dem unter diesem lagernden Kalk zuzuschreiben, der ihnen das Material zur Bildung ihrer Incrustationen liefert. Welche Chara-Arten dort gefunden werden, ist aber leider eine noch nicht zu beantwortende Frage, weil ihnen unsere Botaniker bis jetzt noch gar keine Aufmerksamkeit geschenkt haben, wie überhaupt das ganze Sandgebiet in botanischer Hinsicht noch sehr vernachlässigt geblieben ist.

**3. Die Lehmflora.** — Den größten Theil der mecklenburgischen Bodenoberfläche, nämlich fast das ganze Ostseegebiet hindurch, — mit Ausnahme des kleinen, oben erwähnten Haidedistricts und einiger vereinzelter Sandschollen, — bildet glücklicher Weise der diluviale Lehm Boden, welcher nach seinem geringeren oder größeren Kalkgehalt von zähem, strengen Thonboden in den mannigfachen Abstufungen in lockeren Mergelboden übergeht; auch an der südlichen Landesgränze, zwischen der Müritz und der Elde-Mündung, ist der Boden von ähnlicher Beschaffenheit. Seine Unterlage bilden theils Schichten, welche der Kreideformation angehören, theils Thonlager, die wahrscheinlich tertiären Ursprungs sind. Diese, dem Anbau des Weizens, Roggens, der Gerste, des Hafers, Rapses, Tabacks, Leins, der Kunkelrübe, des Kleeß und

1. Vergl. darüber C. Boll im Archiv für mecklenburgische Landeskunde 1855 S. 567.

der Luzerne so günstigen Gegenden sind es, auf denen der gepriesene Bodenreichtum Mecklenburgs beruht, und in diesem Gebiete ist es denn auch, wo unsere Flora ihre üppigste Fülle und die Natur überhaupt ihre größten Reize entwickelt.

Die vorherrschenden Waldbäume sind hier entschieden die Roth-Buche und die Eiche, die erstere besonders da, wo der Boden einen stärkeren Kalkgehalt besitzt. Beide entwickeln sich mitunter in majestätischer Pracht, wie z. B. die Eichen bei Ivenack, deren stärkste unten am Stamme (4 Fuß über dem Boden gemessen,) einen Umfang von 31' 6" Par. besitzt; Buchen kamen noch vor etwa hundert Jahren 160 Fuß hohe, mit einem unteren Durchmesser von 8' vor, und auch noch jetzt giebt es sehr schöne z. B. bei Doberan und auf dem Sonnenberge bei Parchim.<sup>1</sup> Auch Birken und Tannen sind nicht selten, und vereinzelter kommen in den Laubholzwaldungen vor: die Weißbuche, die kleinblättrige Linde, Ahorne (*Acer Pseudo-Platanus* und *platanoides*), Ulmen (*Ulmus campestris* und *effusa*), Eschen, Holzapfel- und Holzbirnbäume, Faulbaum, Vogelkirsche und stellenweise auch *Sorbus torminalis*. Ein mannigfaches und schönes Unterholz von Linden, Ulmen, Haseln, Weiden (*S. caprea*, *pentandra*, *aurita*), *Cornus sanguinea*, *Viburnum Opu-*

1. Archiv XI. 135 ff. — Diesen riesenhaften Eichen und Buchen reihen sich noch einige colossal Lin den an, über die ich im Archiv XI, 138 schon berichtet habe. Schon den früheren slavischen Bewohnern Mecklenburgs war die Linde ein wichtiger Baum, wie die vielen von seinem Namen Lipa abgeleiteten Ortsnamen „Lipen, Leps u. a.“ zeigen. Was für Verlickheiten aber mögen unter dem Namen „die Liep“ eigentlich bezeichnet werden? Es giebt deren z. B. bei Ludwigslust, bei Sildemow unweit Rostock und bei Königsberg in Ostpreußen.

lus, *Lonicera Xylosteum*, *Rosa canina* und auf kalkreicherem Boden *rubiginosa*, *Prunus spinosa*, *Acer campestre*, *Craetaegus*, *Rhamnus catharticus*, *Evonymus*, *Sorbus Aucuparia*, *Populus tremula* und *alba*, so wie *Juniperus* zeichnet diese Laubwälder aus; stellenweise tritt darin auch die schöne duftende *Lonicera Periclymenum* in üppiger Entwicklung als Schlingpflanze auf.

Doch es möchte am besten sein, die Schilderung dieses Florengebietes nicht in der begonnenen allgemeinen Weise fortzusetzen, sondern dieselbe an einen bestimmten concreten Fall anzuknüpfen. Ich wähle dazu die reiche Flora der Umgegend meines eigenen Wohnortes Neubrandenburg, welche seit etwa 1780 von A. F. L. Brückner und dessen Söhnen A. und G. Brückner,<sup>1</sup> so wie von Blandow, F. Schultz und mir selbst durchforschet worden ist. Schon innerhalb der Stadt selbst trifft man auf einige interessante Pflanzen, indem in den Gärten *Oxalis corniculata*, *Esholtzia cristata* und *Linaria minor* als Unkräuter vorkommen, und an der aus Feldsteinen erbaueten Stadtmauer *Asplenium ruta muraria*, *Hypnum exiguum* und *murale* wachsen, während in den Spalten und Fugen derselben eine *Conchylie* lebt, die bisher in ganz Norddeutschland nur an dieser einzigen Stelle entdeckt worden ist, — nämlich *Balea perversa*. Die westliche Seite des Stargarder Thores überkleidet prachtvoller, blühender Ephen bis zur Höhe von etwa 40 Fuß. Sehr lohnend aber sind für den Botaniker die Wanderungen in die Umgegend, nach

1. A. Brückner schrieb im J. 1804 als Diss. inaug. einen *Prodrömus Florae Neobrandenburgensis*, in welchem 679 Pflanzenerogamen und 198 Kryptogamen aufgezählt werden.



welcher Seite hin man sich auch wenden mag. So trifft man z. B. auf dem Wege nach dem Brodaer Holze, einem schönen Buchenwald am westlichen Ufer des Tolensees schon vor dem Treptower Thore in den Pappeln und Obstbäumen die schmarotzende Mistel, in den Gräben an der Bleiche (neben Bergißmeinnicht und der weißen Brunnenkresse,) *Stratiotes aloides*, *Hydrocharis M. ranae* und *Potamogeton pusillus*; im Tolensefluß *Ranunculus divaricatus* und *Lingua*, *Butomus umbellatus*, *Sagittaria*, *Menyanthes*, *Potamogeton compressus* und *mucronatus*, *Sium latifolium*, während am Ufer desselben *Melilotus macrorrhiza* sehr häufig, sehr selten aber *Potentilla supina* vorkommt. Die aus Dornen geflochtenen Gartenzäune bei Broda sind durchrannt von *Convolvulus sepium*, *Bryonia alba*, *Galium Aparine*, und auf dem Hahnenberge daselbst trifft man außer einigen stolzen Königsferzen (*V. thapsiforme*) auch *Campanula bononiensis* und *Stachys germanica*, zwei schöne, gleichfalls hochstrebende Pflanzen, die überhaupt in den Umgebungen der Tolense viel häufiger vorzukommen scheinen, als in anderen Gegenden Mecklenburgs; ferner *Gentiana campestris* und *Polycnemum arvense*, welches letztere im ganzen Strelitzschen Lande bisher nur an dieser einzigen Stelle gefunden worden ist.<sup>1</sup> Geht man weiter, so trifft man auf Belvedere *Bromus tectorum*, *Phleum Boehmeri*, *Orobus tuberosus*, *Vicia tenuifolia*, *Salvia pratensis*, *Stachys recta*, *Veronica latifolia*, *Saxifraga granulata*, *Cynanchum Vincetoxicum*,

1. Neben dem Hahnenberge, rechts von dem Fahrwege, der nach Belvedere hinaufführt, fand Schulz seine *Sagina ciliata*; ich habe sie dort später vergebens gesucht.

Dianthus prolifer und Armeria, Poterium Sanguisorba, so wie mehrere Arten der schwer zu enträthselnden Gattungen Rubus und Verbascum. Im Brodaer Holz endlich selbst wachsen Viola hirta, Ulmus campestris var. suberosa, Astragalus Cicer, Vicia angustifolia, Pyrola minor, Neottia Nidus avis, Hypericum humifusum, Polypodium Phegopteris und Dryopteris, am Seeufer Mentha sylvestris und am Rande eines kleinen Fennbruches unter den Raumen-Eichen Myosotis versicolor, so wie in dem Bruche selbst Scheuchzeria palustris, Lysimachia thyr-siflora, Utricularia minor, Droserae, Spargania, Hypnum stramineum, Aulacomnion palustre, Meesia tristicha u. dgl.; außerdem kommen an neunenswerthen Moosen im Walde noch vor: Trichostomum pallidum, Dicranum majus, Leptohymerium filiforme, Hypnum loreum, longirostrum, brevirostrum, piliferum, Diphyscium foliosum, Jungermannia trichophylla, Liochlaena lanceolata, Scapania nemorosa und undulata, Sarcoscyphus Ehrharti und Chiloscypus pallescens; ferner Polyporus giganteus und viele andere Pilze. Aus diesem Walde holen die Kinder im Frühlinge vorzugsweise den schön duftenden Waldmeister, hier „Möhsch“ genannt, um ihn zu Kränzen gewunden in der Stadt zu verkaufen.

Das auf dem jenseitigen Seeufer gelegene Nemero wer Holz ist ein schöner, mit Buchen gemischter Eichenwald, der außerdem auch noch alle oben als für dies Floren-gebiet charakteristisch bezeichnete Baum- und Straucharten enthält, und aus welchem Neubrandenburg im Frühlinge besonders mit „Riljenconsalgen“ versorgt wird, die für die ärmeren Kinder einen Handelsartikel bilden. Auf meinen

Spaziergängen habe ich mehr als 150 Arten phanerogamischer Pflanzen angezeichnet, welche den bunten Teppich des Waldbodens bilden. Ich nenne darunter nur folgende in diesem Gebiete weit verbreitete:

Anemone Hepatica, nemorosa, ranunculoides und pratensis, Ranunculus polyanthemos, Philonotis, lanuginosus, Turritis glabra, Corydalis intermedia, Viola sylvestris, Orobus vernus, niger und tuberosus, Lathyrus pratensis, Genista tinctoria und germanica, Astragalus glycyphyllos, Vicia cassubica, Trifolium alpestre, montanum und agrarium, Lychnis Viscaria, Silene nutans, Dianthus Carthusianorum, Stellaria Alsine, Holostea, palustris und graminea, Rubus Idaeus, saxatilis u. a., Fragaria vesca, Geum urbanum und rivale, Potentilla reptans und Tormentilla, Hypericum montanum, quadrangulare und perforatum, Lysimachia Nummularia, Asperula odorata, Galium sylvaticum, Sedum reflexum und Telephium, Saxifraga granulata, Cynanchum Vincetoxicum, Hedera Helix, Epilobium montanum, Sanicula europaea, Pimpinella Saxifraga und magna, Laserpitium pruthenicum, Solidago Virga aurea, Gnaphalium sylvaticum, Hieracium murorum, vulgatum und umbellatum, Campanula Trachelium, patula und persicifolia, Phyteuma spicatum, Myosotis intermedia, Pulmonaria officinalis, Vaccinium Myrtillus, Pyrola rotundifolia, minor und secunda, an feuchten Orten Impatiens Noli tangere, Melampyrum pratense und nemorosum, Scrophularia nodosa, Veronica Chamædrys, officinalis und latifolia, Ajuga genevensis, Stachys sylvatica, Thymus Serpyllum, Calamintha Acinos, Galeopsis versicolor, Clinopodium vulgare, Origanum vulgare, Primula officinalis, Plantago media, Mercurialis perennis, Humulus Lupulus, Orchis maculata und latifolia, Neottia Nidus avis, Convallaria majalis und multiflora, Gagea lutea, Carex digitata, vesicaria, Drymeja, remota und flava (Oederi), Agrostis arundinacea, Melica nutans, uniflora, Briza media, Festuca duriuscula, Poa decumbens, Phleum Boehmeri, Calamagrostis Epigeios, Bromus asper, tectorum und pin-natus, Polypodium vulgare und Dryopteris, Botrychium Lunaria,

*Polystichum spinulosum* und *Filix mas*, *Asplenium Filix femina*,  
*Equisetum sylvaticum*.

Von besonderem Interesse in diesem Walde ist für den Botaniker das sogenannte „hohe Ufer“, eine bewaldete Anhöhe, die sich mehr als 100' über den See-  
spiegel erhebt. Er findet dort den in Mecklenburg so seltenen *Sorbus torminalis*, *Lonicera Xylosteum*, *Dentaria bulbifera*, *Corydalis cava*, *Viola mirabilis*, *Veronica spicata*, *Cardamine Impatiens*, mehrere seltenere *Carices*, *Botrychium Lunaria*, *Encalypta streptocarpa*, *Phascum nitidum*, *Didymodon capillaceus* und nicht weit von demselben *Vinca minor*, *Betonica officinalis*, *Dianthus Armeria*, *Campanula glomerata*, *Fragaria elatior*, die schön duftende bei uns seltene und von mir nun auch hier schon seit Jahren vergebens gesuchte *Convallaria Polygonatum*, und am Seeufer *Arabis hirsuta* und *Equisetum hiemale*. Hier ist auch die einzige Stelle, und zwar an dem steilen Uferabsturze zwischen dem Wege und der Tolense, wo ich in Mecklenburg den Epheu in freiem, wilden Zustande blühend angetroffen habe (zuerst im J. 1835), was mir um so auffallender ist, da er angepflanzt in unserem Lande eben gar nicht selten zur Blüthe gelangt; jetzt ist aber leider auch dies blühende Exemplar am hohen Ufer nicht mehr vorhanden, entweder durch Frost getödtet, oder durch muthwillige Knaben vernichtet.

Tiefer hinein im Walde trifft man in einer Schlucht, durch welche ein Fahrweg aus der Nähe des Tannenkruges zum See hinabführt, gleichfalls eine sehr schöne Flora. Die Bergabhänge sind vor einigen Jahren durch Holzschlag sehr gelichtet worden, und daher haben sich dort



nun manche Waldpflanzen, welche lichtere Standorte lieben, in großer Ueppigkeit entwickelt. Niemals habe ich die zierliche, weißblühende *Vicia sylvatica* und den schönen, rothen *Lathyrus sylvestris* in solchen Massen gesehen, wie dort; stellenweise waren die Gebüsche, und selbst der Erdboden, von ihnen wie mit einem dichten, bunten Teppiche überdeckt, und man hätte dort auf kleinem Raume einen Frachtwagen mit diesen beiden prachtvollen Pflanzen beladen können. Auch die weiße, wohlriechende Orchis (*Platanthera bifolia*), welche in den der Stadt näher gelegenen Theilen der Waldung durch die Kinder, die deren Knollen zum Verpflanzen in die Gärten ausgraben, schon ausgerottet ist, findet sich dort noch häufig, desgleichen die in Mecklenburg seltene *Actaea spicata*. Hier ist endlich auch der Zweifel gelöst worden, den ich selbst und auch andere mecklenburgische Botaniker bisher an dem Indigenat der schönen, auch in den Gärten häufig cultivirten *Aquilegia vulgaris* gehabt haben, völlig beseitiget. Schulz nahm im J. 1806 diese Pflanze in seiner Stargardschen Flora zwar unter die Zahl der einheimischen auf, strich sie aber im J. 1819 in dem Nachtrage zu seinem Prodrömus wieder, weil sie bis dahin nur in einem einzigen Exemplare in diesem Walde gefunden wäre, welches durch Zufall dahin gekommen sein könne. In den J. 1819 bis 55 wurde abermals (1835) nur wieder ein vereinzelttes Exemplar am Rande des Waldes gefunden, aber im J. 1855 entdeckte ich zur Seite der erwähnten Schlucht auf einer der höchsten Bergkluppen mitten in diesem großen Walde, — also an einer Stelle, wo an zufällige Verwilderung gar nicht zu denken ist, — diese Pflanze in größerer Anzahl, und zwar auf dem humus-

reichen Boden so kräftig entwickelt, daß einzelne Ex. die Höhe von 3' 8" erreichten; die Blumen aller Ex. waren schön hellblau. Auch im Jahre 1859 habe ich sie an derselben Stelle in üppigster Blüthe angetroffen.

Noch weiter waldeinwärts, nach Kl. Nemerow zu, wird der Boden sandiger, und es treten Tannen an die Stelle der Eichen und Buchen. Hier erscheinen nun sogleich *Viola canina*, *Monotropa Hypopithys*, *Goodyera repens*, *Senecio sylvaticus*, *Epilobium angustifolium* u. a. derartigen Boden liebende Pflanzen. Bei dem Dorfe Kl. Nemerow tritt aber wieder Lehmboden mit starkem Kalkgehalte auf, und hier findet man nun *Thalictrum minus*, *Allium Scorodoprasum*, *Vicia tenuifolia*, *Campanula bononiensis*, *Malva Alcea*, *Sedum reflexum*, *Veronica spicata* und *latifolia*, *Circaea lutetiana*, *Arabis hirsuta* und *Stachys germanica*, — letztere in solcher Menge auf den Feldern, wie ich sie nie an einem anderen Orte gesehen habe.

Auch die dritte der Stadt benachbarte Waldung, das hauptsächlich mit Eichen bestandene Mühlenholz, liefert manches Interessante. Am Eingange in dasselbe findet man *Campanula latifolia*, *Vicia dumetorum* und auch *sylvatica*; tiefer hinein birgt es *Silene inflata*, *Lonicera Periclymenum*, *Lathraea Squamaria* (in einem kleinen Erlenbruch in großer Menge), *Equisetum hiemale* und *pratense*, *Funaria hygrometrica*, *Dicranum longifolium*, *Leskea attenuata*, *Mnium stellare*, *Bryum roseum*, *Polytrichum angustatum*, *Marchantia conica*, sowie das zarte *Asplenium Trichomanes*; sogar *A. septentrionale* soll nach Schultz bei der hintersten Mühle vorkommen, ich habe es aber

noch nicht finden können, eben so wenig wie den *Dipsacus pilosus*, der dort gleichfalls früher gesehen worden ist. — Dieser Wald ist für Neubrandenburg der Hauptlieferant an „Deschen“, welche als zeitige Frühlingsblumen viel von den Kindern gesammelt und verkauft werden. — Auch mit Himbeeren und Erdbeeren wird die Stadt aus diesen drei benachbarten Waldungen versorgt. Bizbeeren sind nicht in der nöthigen Menge hier vorhanden, und Preiselbeeren fehlen ganz und gar; letztere kommen in M.-Strelitz nur in dem südlichen Sandgebiete vor.

Ungemein buntfarbig und anmuthig ist die Pflanzenbekleidung der begrasteten, sonnigen Hügel um Neubrandenburg, wie des Stargarder Berges, des Gerichtsberges und des Datzberges. — Ich nenne unter den dort vorkommenden zahlreichen Arten nur folgende, nicht durch ganz Mecklenburg verbreitete: *Ranunculus Philonotis*, *Turritis glabra*, *Arabis hirsuta*, *Alyssum calycinum*, *Helianthemum vulgare*, *Polygala comosa*, *Dianthus Carthusianorum*, *Trifolium alpestre*, *montanum*, *agrarium*, *Medicago falcata*, *minima*, *Vicia tenuifolia* (an dem Bierkeller auf dem Gerichtsberge und dem Datzberge sehr häufig), *Anthyllis Vulneraria*, *Fragaria collina*, *Poterium Sanguisorba*, *Saxifraga tridactylites*, *granulata*, *Sabiosa suaveolens*, *Tragopogon pratensis*, *Achyrophorus maculatus*, *Chondrilla juncea*, *Anthemis tinctoria*, *Centaurea maculosa*, *Gentiana cruciata* (nur am Datzberge), *Veronica spicata*, *latifolia*, *Melampyrum arvense*, *Salvia pratensis*, *Plantago media*, *Orchis Morio*, *Asparagus officinalis* (nur am Datzberge), *Phleum Boehmeri*, *Bromus tecto-*

rum, *Brachypodium pinnatum*, *Botrychium Lunaria*. — Diese Hügel sind auch im ganzen norddeutschen Flachlande die einzigen bekannten Fundstätten der *Pupa tridens* Müll., einer kleinen, sehr zierlichen Schnecke, die hier (namentlich auf dem Datzberge häufig) den bunten Pflanzenteppich bewohnt. Auch für den Geognosten und Petrefactologen ist wenigstens einer dieser Hügel von Interesse, nämlich der Gerichtsberg, indem derselbe aus einem durch Aufwühlung mit Diluvialmassen verunreinigten Lager von Septarienthon besteht, welches aber nur arm ist an den diese Tertiärschicht characterisirenden Versteinerungen. — Am Rande des hinter diesem Berge gelegenen kleinen Ihlenpohls trifft der Botaniker *Potentilla supina*, *Myosotis caespitosa*, *Limosella aquatica*, *Phascum patens* var. *megapolitanum*, *Physcomitrium sphaericum*.

Unter den Neubrandenburger Wiesen sind in floristischer Hinsicht die Kuhwiese, nebst den Torf- und Birkbuschwiesen, am Tolensefluß gelegen, die wichtigsten, da sie gleich manchen anderen großen Wiesenniederungen im östlichen Mecklenburg und Pommern (z. B. die Peene-, Trebel- und Recknitzwiesen), den merkwürdigen Anblick einer subalpinen Vegetation darbieten, die hier im Norden Deutschlands fast bis zur Meereshöhe herabgestiegen ist, denn diese Tolenswiesen liegen kaum 40' über dem Spiegel der Ostsee. Man erblickt hier die zierliche *Gentiana Amarella*, die goldgelbe *Saxifraga Hirculus*, vereinzelt auch die schöne rothe Mehlprimel (*Primula farinosa*), welche im nordöstlichen M.-Strelitz, z. B. auf den Wiesen bei Galenbeck (wo auch *Poa sudetica* wächst,) in solcher Menge vorkommt, daß dieselben wie mit einem



röthlichen Schleier bedeckt erscheinen; ferner die schwarzblaue *Sweetia perennis*, die kleine gespornte, ultramarinblaue *Pinguicula vulgaris*, die wohlriechende, rothe *Gymnadenia conopsea*, die so eigenthümlich gestaltete *Ophrys Myodes*, und neben der *Betula pubescens* noch eine andere strauchartige Birke mit kleinen, rundlichen, spitz-gesägten Blättern, die früher unsern Botanikern unter dem Namen *B. fruticosa* bekannt war, jetzt aber *B. humilis* heißt, weil man ermittelt hat, daß die ursprünglich von Pallas mit ersterem Namen belegte Pflanze in der That mit der unserigen nicht identisch ist; auch *Pedicularis sylvatica* kommt dort vor, aber die prachtvolle *P. Scoparium Carolinum*, welche noch zu Anfange dieses Jahrhunderts auf jenen Wiesen gar nicht selten war, scheint durch Torfstich jetzt völlig ausgerottet zu sein. Alle diese Pflanzen, welche zu den Zierden unserer Flora gehören, finden sich im mittleren und südlichen Deutschland nur in den Gebirgsgegenden wieder. Außer ihnen kommen an nennenswerthen Arten hier noch vor: *Lathyrus palustris* und *Veronica longifolia* im Ufergebüsch der Tolense, sowie auf den Wiesen: *Trollius europaeus*, *Cardamine hirsuta*, *Dianthus superbus*, *Stellaria crassifolia*, *Helosciadium repens*, *Peucedanum Oreoselinum*, *Hieracium pratense*, *Crepis paludosa*, *Cineraria palustris*, *Serratula tinctoria*, *Limosella aquatica*, *Utricularia vulgaris* und *minor*, *Salix rosmarinifolia*, *Orchis incarnata*, *Myriophyllum verticillatum*, *Stratiotes aloides*, *Triglochin maritimum*, *palustre*, *Scirpus pauciflorus*, *Schoenus ferrugineus*, *Carex pulicaris* und *dioica*, *Calamagrostis neglecta* und *Ophioglossum vulgatum*. — Von der Ruhweide wird die Stadt

auch mit Champignons (*Agaricus campestris*) versorgt. — In dem an dieselbe stoßenden Brüderbruche wurden *Ribes nigrum*, *Spiranthes autumnalis*, *Galium boreale* und *Mnium stygium* gefunden.

Als Ruderalpflanzen kommen hier z. B. vor: *Asperugo procumbens*, *Hyoscyamus*, *Datura*, *Anthemis tinctoria*, *Marrubium vulgare*, *Hordeum murinum*, — *Xanthium Strumarium* aber scheint in neuerer Zeit verschwunden zu sein. — Auf den Ackerfeldern erblickt man als Unkräuter *Papaver* (alle drei Arten), *Centaurea Cyanus*, *Agrostemma Githago*, *Delphinium Consolida*, *Ranunculus arvensis*, *Ervum tetraspermum*, *Melampyrum arvense*, *Sinapis arvensis*, *Raphanus Raphanistrum*, *Matricaria Chamomilla*, *Anthemis arvensis*, *Bromus secalinus*, *Lolium temulentum*.

An Pflanzen, welche in andern Gegenden des Vehm-Flora-Gebietes (aber zum Theil nur sehr sporadisch) vorkommen, fehlen bei Neubrandenburg z. B.: *Aconitum Napellus*, *Corydalis solida*, *Viola epipsila*, *Rubus horridus*, *rudis*, *Potentilla sterilis*, *Hypericum hirsutum*, *Ribes alpinum*, *Inula salicina*, *Centaurea phrygia*, *Senecio campestris*, *Echinosperrnum Lappula*, *Myosotis sparsiflora*, *Digitalis ambigua*, *Orobanche ramosa*, *coerulea*, *arenaria*, *Prunella grandiflora*, *Polemonium coeruleum*, *Orchis purpurea*, *Herminium Monorchis*, *Anacamptis pyramidalis*, *Gagea minima*, *Anthericum Liliago*, *ramosum*, *Carex Buxbaumii*, *strigosa*, *Poa bulbosa*, *sudetica*, *Festuca Myurus*, *borealis*, *Equisetum Telmateja*, *Timmia megapolitana*. Manche dieser Pflanzen scheinen überhaupt nur dem Westen Mecklen-

burgs anzugehören, wie z. B. *Potentilla sterilis*, *Hypericum hirsutum* und *Carex strigosa*, der Osten hat dafür Ersatz z. B. an *Trollius europaeus*, *Viola epipsila*, *Nuphar pumilum*, *Polygala comosa*, *Fragaria collina*, *Saxifraga Hirculus*, *Campanula bononiensis*, *Gentiana Amarella*, *cruciata*, *Sweetia perennis*, *Primula farinosa*, *Polemonium coeruleum*, *Echinosperrnum Lappula*, *Myosotis sparsiflora*, *Stachys germanica*, *Salvia pratensis*, *Pedicularis Sceptrum*, *Orobanche* (jene 3 Arten), *Betula humilis*, *Alisma parnassifolium*, *Orchis purpurea*, *Ophrys Myodes*, *Carex Buxbaumii*, *Poa bulbosa*, *Festuca borealis*.

Werfen wir nun, bevor wir von dieser Gegend Abschied nehmen, um auch den floristischen Character unserer Landseen kennen zu lernen, noch einen Blick auf die mehrfach schon erwähnte Tolense.<sup>1</sup> Dieser schöne See ist  $1\frac{1}{2}$  M. lang und durchschnittlich etwa  $\frac{1}{6}$  M. breit. Seine Längenausdehnung liegt in der Richtung von S. W. nach N. O., und ein ansehnlicher Theil seines östlichen, so wie seines westlichen Ufers wird durch bewaldete Hügelketten gebildet, indem auf ersterer Seite das Nemerower Holz in einer Längenausdehnung von  $\frac{5}{8}$  M., und auf letzterer das Brodaer Holz sogar fast 1 M. lang den See umsäumt. Die größte gemessene Tiefe des Wassers beträgt 100', der Boden ist Kiesgrund, stellenweise mit vielem Gerölle bedeckt. In seiner Flora spielen Binsen (*Juncus communis*) und Rohr entschieden die Hauptrolle; gleich einem grünen Kranze umschließen sie fast den ganzen schö-

1. Eine ausführliche Beschreibung dieses Sees habe ich 1853 im Archiv für mecklenburgische Landeskunde S. 1 bis 39 gegeben.

nen, klaren Wasserspiegel, und wenn man denselben von einem höher gelegenen Uferpunkte überblickt, sind sie es allein unter allen Seepflanzen, die durch ihre Masse sich bemerklich machen. Durchmustert man aber die Seeflora aus größerer Nähe, — was am besten geschieht, wenn man mit einem Kahne am Ufer entlang fährt, — so bieten sich auch noch manche andere Pflanzen den Blicken dar. Hin und wieder tritt die zierliche *Helocharis palustris* in größerer Menge auf, mehr vereinzelt die hoch emporstrebenden Rohrkolben (*Typha latifolia* und *angustifolia*), *Scirpus lacustris*, der schöne *Butomus umbellatus*, *Alisma Plantago*, *Sagittaria sagittaeifolia*, *Lythrum Salicaria*, *Nasturtium amphibium*, *Lysimachia thyrsiflora*, *Equisetum limosum* und *palustre*. An Pflanzen mit schwimmenden Blättern erscheinen stellenweise die prachtvolle weiße Seerose (*Nymphaea alba*), eine der schönsten Blumen unserer Flora, sowie das gelbe Nümmelchen (*Nuphar luteum*), die goldgelbe *Utricularia vulgaris*, das zierliche, eine rothblühende Aehre über dem Wasserspiegel emporhebende *Polygonum amphibium*. Noch andere Pflanzen bleiben mit Stamm und Blättern unter dem Wasser verborgen, und stecken nur zur Blüthezeit ihre Blumen und Köpfschen etwas daraus hervor, wie die weiße Wasserranunkel (*Ranunculus divaricatus*), *Myriophyllum spicatum* und mehrere Samträuter (*Potamogeton lucens*, *perfoliatus*, *praelongus*, *pectinatus* und *filiformis*). Manche Arten endlich bleiben gänzlich unter dem Wasser verborgen, wie *Najas*, *Hippuris*, *Fontinalis antipyretica* und sehr selten (bei Broda zwischen Steinen) *squamosa* und mehrere Species aus den Gattungen *Chara* (*foetida*, *hispida* und *ceratophylla*) und *Nitella*, so wie aus den Familien der *Nostochinae* und *Conservaceae*.



Manche seltnerere Pflanzen, die in anderen meissenburgischen Seen vorkommen, fehlen leider der Tolense, wie *Nuphar pumilum*, *Lobelia Dortmanna*, *Alisma ranunculoides* und *parnassifolium*, *Ceratophyllum demersum*, *Myriophyllum alterniflorum*, *Elatine* *Hydropiper* und *Alsinastrum*, *Callitriche autumnalis*, *Potamogeton nitens*, *Villarsia nymphaeoides* (falls sie wirklich im Schweriner See vorkommt), *Heleocharis ovata*, *Pilularia globulifera*, *Nostoc pruniforme*, *Aegagropila Froelichiana*. — Vielleicht werden auch noch einmal *Hydrilla verticillata*, *Najas minor* und *flexilis*; so wie *Isoetes lacustris*, die in den Nachbarländern vorkommen, in unseren Seen entdeckt, wenn dieselben genauer durchforscht werden, als dies bis jetzt geschehen ist, was ich hiermit unsern Botanikern dringend ans Herz gelegt haben will.

Für denjenigen Botaniker aber, für welchen nicht bloß die einzelne Pflanzenspecies als solche ein Interesse hat, sondern der sich auch an schönen Vegetationsansichten erfreuet, bieten die Fahrten auf der Tolense dazu eine reiche Gelegenheit dar. Die großen, dicht bis an den Rand des Sees herantretenden Waldungen bestehen an manchen Uferstrecken aus dem mannigfaltigsten und buntesten Gemisch von Baumarten und Gesträuchen, (und zwar nicht bloß Laub-, sondern auch Nadelholz). Ganz besonders zeichnet sich in dieser Beziehung eine Strecke am westlichen Ufer aus, nämlich die letzte Viertelmeile vor Meiershof, wo die am Ufer stehenden Bäume nicht selten ihre unteren, dichtbelaubten Zweige bis zum Wasserspiegel herabsenken, und im Sommer durch die mannigfache Gestalt ihres Laubes und die verschiedenartigen durch einander gemischten grünen Farbentöne ein reizendes Bild hervor-

zaubern, welches aber im Herbst noch viel effectvoller wird, indem sich dann dem Grün noch gelbe, braune und rothe Farbentinten in allen möglichen Abstufungen beismischen.

Eine besondere Berücksichtigung und Beschreibung verdient die Flora des Kreidegebietes um den Malchiner See herum (ausgezeichnet durch Orchideen-Reichthum!), so wie des Malchower (bei Poppentin, Wendhof, Rossentin u. s. w.), Wittenborner, Salower u. s. w. Kreidegebietes. Wenn die Punkte, wo die Kreide zu Tage tritt, auch zu isolirt und die floristischen Erscheinungen, welche sie darbieten, nicht charakteristisch genug sind, um daraus ein eigenes von dem der Lehmlora getrenntes Florengebiet construiren zu können, so trägt doch die Vegetation an den bezeichneten Oertlichkeiten dazu bei, den Reiz und die Mannigfaltigkeit des eben geschilderten Gebietes local noch wesentlich zu erhöhen. Da es aber zu einer botanischen Beschreibung jener Kreidegebiete noch an allen Vorarbeiten fehlt, muß dieselbe der Zukunft vorbehalten bleiben.

4. Die **Seestrands- und Salinenflora** bildet das vierte floristische Gebiet Mecklenburgs.<sup>1</sup> Erstere umsäumt unseren Ostseestrand, und ihre wesentlichsten Pflan-

1. Ich habe dasselbe schon einmal in Archiv 2, 67 ff. beschrieben. Auch in meiner Schilderung der Insel Rügen (1858 S. 183) habe ich ein Verzeichniß der salzsteten Pflanzen gegeben, und deren geographische Verbreitung am südlichen Rande der Ostsee hinzugefügt; letztere Angaben aber bedürfen mancher Berichtigungen, indem ich aus Fr. Schmidts Flora des sibirischen Bodens von Ebstaud, Nord-Pivland und Desel (Dorpat 1855), die mir erst nachträglich zu Gesichte gekommen ist, erfahre, daß manchen jener Pflanzen in nordöstlicher Richtung ein größerer Verbreitungsbezirk zukommt, als ich nach anderen älteren Angaben anzunehmen mich für berechtigt halten durfte.

zen sind, mit Ausschluß der im salzigen Wasser selbst wachsenden, folgende:

*Cochlearia Linnaei* Griew. (officinalis und anglica L.)

Meklenburg, Rügen O, in Pommern und Preußen selten | .

*C. danica* Meklenburg, Rügen, Waigat-Insel östlich von Desel | .

*Cakile maritima* Meklenburg, Pommern, Preußen u. s. w.

*Crambe maritima* Meklenburg, Rügen, Ebstland | .

*Lepidium ruderales*.

*Viola tricolor* var. *syrtica*.

*Sagina maritima* Meklenburg, Rügen, Pommern | .

*Spergularia rubra* var. *media*.

var. *marginata*.

*Honckenya peploides* Meklenburg, Rügen u. s. w.

*Althaea officinalis*.

*Anthyllis Vulneraria* var. *maritima*.

*Melilotus dentata* Meklenburg, Rügen, Pommern, Ebstland | .

*Lotus corniculatus* var. *tenuifolius*.

*Pisum maritimum* Meklenburg bis Preußen, und noch weiter?

*Hippuris vulgaris* var. *maritima*.

*Eryngium maritimum* Meklenburg bis Preußen | .

*Apium graveolens*.

*Bupleurum tenuissimum* Meklenburg, Rügen, Vorpommern | .

*Oenanthe Lachenalii*.

*Aster Tripolium* Meklenburg, Rügen u. s. w.

*Artemisia campestris* var. *sericea*.

*A. maritima* Meklenburg, Vorpommern, Rügen, Insel Desel | .

*Chrysanthemum inodorum* var. *maritimum*.

*Taraxacum officinale* var. *lividum*.

*Sonchus arvensis* var. *maritimus*.

*Jasione montana* var. *litoralis*.

*Erythraea linariaefolia* Meklenburg bis Ebstland. | .

*E. pulchella* var. *inaperta*.

*Odontites rubra* var. *litoralis*.

*Samolus Valerandi* Meklenburg bis Preußen | ; früher auch auf Desel.

- Glaux maritima* Mecklenburg u. s. w.  
*Armeria vulgaris* var. *maritima*.  
*Statice Limonium* Mecklenburg, Vorpommern | .  
*Plantago lanceolata* var. *sericea*.  
*P. maritima* Mecklenburg bis Petersburg.  
*P. Coronopus* Mecklenburg bis Danzig | .  
*Suaeda maritima* bis Ehstland | .  
*Salsola Kali* Pommern u. s. w.  
*Salicornia herbacea* bis Ehstland | .  
*Obione pedunculata* bis Ehstland | ; in Preußen O?  
*Atriplex litoralis* c. var. Pommern u. s. w.  
*A. latifolium* var. *prostatum*.  
     — *Sackii*.  
     — *laciniatum* Schk.  
*Rumex maritimus*.  
*Polygonum amphibium* var. *maritimum*.  
*P. aviculare* var. *litorale*.  
     — *salinum*.  
*Hippophaë rhamnoides*.  
*Salix repens* var. *argentea*.  
*Triglochin maritimum*.  
*Asparagus officinalis*.  
*Juncus balticus* Pommern u. s. w.  
*J. compressus* var. *Gerardi*.  
*Scirpus lacustris* var. *Tabernaemontani*.  
*Blysmus rufus* bis Dranienbaum bei Petersburg.  
*Carex extensa* Vorpommern, Rügen, Ehstland | .  
*C. arenaria*.  
*Phleum arenarium*.  
*Calamagrostis armaria*.  
*C. baltica* (Bastard).  
*Koeleria cristata* var. *glauca*.  
*Glyceria maritima* bis Ehstland | .  
*G. distans* noch weiter als die vorige.  
*Triticum junceum* bis Preußen | .



*T. acutum* (Bastard).

*T. strictum* (Bastard).

*Elymus arenarius*.

*Hordeum secalinum*.

*Lepturus incurvatus* (et var.? *filiformis*?) Mellenburg, Kilgen | .

Betrachten wir dies Verzeichniß etwas genauer, so werden wir sehen, daß die darin aufgezählten Pflanzen sich in folgende drei Gruppen bringen lassen:

a. den Grundbestandtheil, auf welchem der Character dieses Florengbietes vorzugsweise beruht, bilden die (mit gesperrter Schrift gedruckten) salzsteten Pflanzen, d. h. solche, die zu ihrer Existenz nothwendig einen salzhaltigen Standort bedürfen, und daher auf dies Gebiet ausschließlich beschränkt bleiben. Ich habe bei der Aufzählung dieser Pflanzen, welche ohne Ausnahme auch an der deutschen Nordseeküste vorkommen, zugleich ihre Verbreitung am südlichen Ostseestrande durch Pommern, Preußen und die russischen baltischen Provinzen nachzuweisen versucht<sup>1</sup>, wobei das Resultat sich herausstellt, daß ihre Anzahl sich nach dieser Richtung hin bald wesentlich vermindert. Dies könnte lediglich von klimatischen Ursachen herrühren, obgleich es auch möglich wäre, daß auch schon bei dieser Erscheinung, wie es unzweifelhaft bei der Verminderung der baltischen Flora und Fauna der Fall ist, die Abnahme des Salzgehaltes in der Ostsee nach der bezeichneten Richtung hin mit im Spiele wäre. — Diesen salzsteten Pflanzen gesellt sich am sandigen Meeresufer, auf den Dünen und Strandwiesen

---

1. Der senkrechte Strich hinter dem Fundorte bezeichnet, daß die Pflanze dort die Gutschaft ihres Vorkommens erreichen soll.

b. eine Anzahl salzholder Sand- und Wiesenpflanzen, welche, da sie auch auf nicht-salzhaltigen binnenländischen Standorten gefunden werden, diesem Florengebiete zwar nicht eigenthümlich sind, aber durch häufiges Vorkommen doch zu dessen Charakteristik mit beitragen. — Endlich finden wir noch

c. manche binnenländische Pflanzen, welche hier in eigenthümlichen, durch den salzigen Boden bedingten Varietäten auftreten, die zum Theil von ihren Stammpflanzen so stark abweichen, daß die Mehrzahl der Botaniker sie als selbstständige Art anerkennt, eine Auffassung, der ich mich aus den S. 14 f. angedeuteten Gründen nicht anschließen kann.

d. Außer den auf jene drei Gruppen vertheilten Pflanzen giebt es nun noch eine große Anzahl von Binnenpflanzen, die ohne irgend eine erhebliche Abänderung zu erleiden, auch am Seestrande vorkommen. Alle diese gleichfalls namhaft zu machen, würde von keinem Interesse sein, und deshalb übergehe ich sie mit Stillschweigen.<sup>1</sup> Nur das auffallende Vorkommen unserer zwei (oder nach anderen Ansichten gar drei) *Botrychium*-Arten in den Dünenkesseln, darf wohl nicht ganz unerwähnt bleiben.

e. Daß endlich auch noch einige ausländische Pflanzen mit Ballasterde oder auf andere Weise zufällig an unsere Küste verschleppt worden sind, ist früher (S. 46 52) schon erwähnt worden. Dahin gehören: *Fumaria densiflora*, *Diplotaxis tenuifolia*, *Lepidium latifolium*, *Bunias*

1. Manche derselben hat G. Griewank in seinen Kritischen Studien S. 27. ff. aufgezählt.

*orientalis*, *Reseda lutea*, *Medicago maculata*, *Rosa lucida*, *Carduus pycnocephalus*, *Helminthia echioides*, *Polypogon monspeliensis*, *Poa procumbens* und *Hordeum maritimum*. Alle diese Pflanzen sind in ihrem Verbleiben hier sehr unbeständig, und gehören gar nicht zu den Bürgern unserer Flora.

Im Binnenlande treffen wir die Salzflora, wenn auch nicht in der Vollständigkeit, wie am Seestrande, um die Salzquellen herum an. So wachsen z. B. um die Saline zu Sülz, wie Herr Dr. Weidner mir brieflich mittheilt, *Spergularia media* Wahlb., *Apium graveolens* L., *Aster Tripolium* L., *Erythraea pulchella* Fr., *Glaux maritima* L., *Plantago maritima* L., *Chenopodium maritima* L. sp. (sec. Zabel!), *Atriplex latifolium* Wahl. var. *Sackii* und *prostratum*, *Triglochin maritimum* L., *Scirpus Tabernaemontani* Gm., *Scirpus rufus* Schrad. und *Juncus Gerardi* Lois. — Bei Sülzen unweit Brühl fanden C. Griewank und Wüstnei *Salicornia herbacea*, *Aster Tripolium*, *Atriplex latifol.* var. *Sackii*, *Triglochin maritimum*, *Apium graveolens*, *Spergularia media*, *Juncus bottnicus*, *Lepidium ruderales*, *Statice Limonium*, *Samolus Valerandi*, *Glyceria distans* und *Cochlearia officinalis*.<sup>1</sup> — Bei Sülz im Amte Eldena kommen nach G. Brückner vor: *Spergularia marina*, *Atriplex latifol.* var. *Sackii*, *Juncus Gerardi*, *Glyceria distans*, *Triglochin maritimum*. — Bei Soltow und Timkenberg in der Tesdau wachsen *Spergularia marina*, *Aster Tripolium*, *Atriplex*

1. Auch bei Neuenkirchen im Amte Bulow giebt es eine Salzquelle über deren Flora mir aber noch keine Angaben vorliegen.

Sackii, *Triglochin maritimum*, *Scirpus Tabernaemontani* und *Juncus bottnicus*. — Durch das Vorkommen von *Samolus Valerandi* am Rühner See, so wie der *Glaux maritima* zwischen Menkendorf und Bresegard in der Haideebene wird auch an diesen beiden Orten ein schwacher Salzgehalt des Bodens angedeutet.

5. Das letzte floristische Gebiet bildet endlich die **Ostsee** selbst, soweit sie unsere Küsten bespült. Phanerogamische Pflanzen kommen in derselben nur wenige vor, und unter diesen ist die zahlreichste, und nach meinen Erfahrungen auch die einzige, welche an dem offenen Seestrande vorkommt, *Zostera marina*, die große submarine Wiesen bildet. In den Meeresbuchten aber (den Wiesen und Bodden,) gesellen sich zu denselben noch verschiedene Varietäten des *Ranunculus aquatilis*, *Ceratophyllum submersum*, *Potamogeton pectinatus* var. *marinus*, *Potamogeton filiformis* (im fl. Saamunder Bodden), *Ruppia rostellata*, *maritima*, *Zannichellia palustris* var. *pedicellata*, *Najas major*, *Juncus maritimus*, *Scirpus maritimus* und *parvulus* (im Saaler Bodden), *Blysmus rufus* und selbst noch *Phragmites communis*. — Die Algen aber haben hier entschieden das Uebergewicht. Aus dieser Klasse liefert die Familie der Diatomaceen zahlreiche, noch wenig erforschte mikroskopische Arten, desgleichen die Familie der Confervaceen manche Arten, wie z. B. *Conferva sericea*, *laetevirens* und *rupestris*, *Aegagropila Linnaei*, *Ectocarpus ochraceus*; ferner die Familie der Ulvaceen, wie z. B. *Enteromorpha intestinalis* und *compressa*, *Ulva latissima*, *Phycoseris Linza*; die Familie der Ceramieaceen, wie *Callithamnion repens*, *Ceramium diaphanum*



und *rubrum*, *Nemalion multifidum*, *Furcellaria lumbricalis* und *fastigiata*, *Ahnfeltia plicata*, *Phyllophora rubens*, *membranifolia* und *Brodiaei*, *Chondrus crispus*, *Polysiphonia violacea*, *allochroa* und *nigrescens*, *Rhodomela subfusca*, *Sphaerococcus confervoides*, *Delesseria sanguinea*, *Hypoglossum alatum*, *Phycodrys sinuosa*; die Familie der *Phyceen*: *Mesogloia vermicularis*, *Chorda Filum*, *Stilephora rhizoides*, *Laminaria saccharina* und *digitata*, *Fucus vesiculosus* und *serratus*, *Himanthalia lorea*, *Halidrys siliquosa*; die Familie der *Characeen* endlich: *Chara ceratophylla*, *hispida*, *crinita*, *baltica* und *aspera*.

Von der geographischen Verbreitung dieser Pflanzen (besonders der Algen) in der Ostsee gilt, was ich im J. 1847 schon von ihnen, wie auch von der Fauna dieses Meeres nachgewiesen habe,<sup>1</sup> daß sie nämlich um so mehr verschwinden, je mehr man sich von den drei Canälen, welche die Ost- und Nordsee verbinden, nach O. und N. hin entfernt. Der Grund hierfür ist der nach eben diesen Richtungen hin abnehmende Salzgehalt des Wassers. — Dies letzte Florengebiet ist übrigens dasjenige, welches noch am wenigsten von den meklenburgischen Botanikern durchforscht worden ist, und zahlreiche neue Entdeckungen bleiben hier noch zu machen übrig.<sup>2</sup>

1. In meiner Schilderung der Ostsee im Archiv I. S. 80 ff.

2. G. Brückner, dem ich diesen Abschnitt im Manuscript mittheilte, schrieb mir: „Bei der Schilderung der einzelnen Florengebiete würde ich die Pflanzen nach den Standorten (Wasser, Wiese, Bruch, Wald, hohes Ufer, Berge, Tristen, Wege, Aecker und Gärten) gruppiren, und alle Arten fortlassen, die in allen drei ersten Hauptgebieten häufig sind, es sei denn, daß sie durch massenhafte Vorkommen, Ausbildung u. s. w.

## V. Die Blüthezeit.

Der pflanzen=geographischen Darstellung schließe ich noch einen chronologischen Abschnitt an, in welchem ich die Pflanzen unserer Landesflora nach der Zeitfolge ihres Blühens zusammenstelle. Dies giebt einerseits eine recht anschauliche Uebersicht über die verschiedenen Phasen, in welchen der bunte Teppich unserer Flora sich vom Frühling bis zum Herbst zeigt, andererseits aber gewährt dies beim Auffuchen der Pflanzen eine wesentliche Erleichterung, wenn man ungefähr weiß, um welche Jahreszeit man nach ihnen herumzuspähen hat, und was man zu einer bestimmten Zeit alles bei einander findet. — Hier nun wünschte ich aber ganz besonders, daß mein S. 54 erwähntes botanisches Tagebuch ausführlicher sein möchte, da es die Elemente zu dieser Arbeit liefern muß, mich aber oft dabei im Stiche läßt, da ich nicht immer bei den darin aufgezeichneten Pflanzen notirt habe, ob sie blühend gefunden wurden, oder nicht, — denn auch letzteres war häufig der Fall, wo ich seltnerer Pflanzen nur des Stand=

ein Gebiet charakterisirten, z. B. *Calluna vulgaris*, *Molinia coerulea*, *Pteris aquilina* in dem Haidegebiete, die *Pyroten* und *Lycopodien* im Sandgebiet. Dagegen würde ich die Species, welche den anderen Floren ganz fehlen, oder darin selten sind, durch gesperrte Schrift bezeichnen, und am Schluß jeder Flora allenfalls die Arten angeben, welche derselben noch ganz fehlen, während sie in den beiden anderen häufig sind. Das Bild der Flora wird durch diese doppelte (positive und negative) Behandlung viel deutlicher.“ — Der von meinem Oheim hier vorgezeichnete Weg ist jedenfalls der beste, dennoch habe ich ihn nicht einschlagen können, weil der ganze Verbreitungsbezirk aller einzelnen Pflanzenarten durch das Land noch zu wenig beachtet ist. Es müssen in dieser Hinsicht noch neue specielle Studien in der mecklenburgischen Flora gemacht werden, die ich hiermit unseren Botanikern bestens empfohlen haben will, damit künftig einmal nach dem von Brückner vorgezeichneten Plane verfahren werden könne.

ortes wegen anmerkte. — Doch auch ein sorgfältig geführtes Tagebuch, wenn es zu dem vorliegenden Zwecke ausgebeutet wird, kann Irrthümer verursachen; denn wenn man die Angaben über die Blüthezeit aus verschiedenen Jahrgängen zusammenträgt, kann es wegen der schnelleren oder langsameren Entwicklung der Vegetation in den einzelnen benutzten Jahren geschehen, daß man, auf den gleichen Datum fußend, dennoch Ungleichzeitiges zusammenstellt. Das beste und zuverlässigste Resultat würde man jedenfalls erhalten, wenn man alle, oder doch möglichst viele Data aus einem und demselben Jahre entlehnte, und das wäre so schwer nicht auszuführen, wenn nur ein Botaniker sich entschloße, diesem Zwecke vorzugsweise seine Thätigkeit einen Frühling, Sommer und Herbst hindurch zu widmen. — Bis dies geschehen, bitte ich den folgenden Abschnitt seiner Unvollständigkeit wegen nur als einen vorläufigen Versuch anzusehen, durch welchen ich nur andeuten wollte, wie auch in dieser Richtung hin, meiner Meinung nach, zweckmäßig weiter gegangen werden könnte.

Eine strenge durchgeführte Kalenderform schien mir bei dieser Aufzählung nicht anwendbar. Denn jeder Botaniker weiß, daß die Pflanzen sich mit ihrem Blühen nicht an einen bestimmten Kalendertag binden, sondern dasselbe, je nach der Witterung, bald früher, bald später, eintritt.

Betrachtet man aber den bunten Pflanzenteppich, der jährlich zu unseren Füßen aufgerollt wird, aus einem etwas allgemeineren Gesichtspuncte, so entdeckt man bald, daß derselbe aus einer ganzen Reihenfolge verschieden-gestaltiger und verschiedenfarbiger Muster besteht, die an

ihren Rändern freilich in einander fließen, und sich daher nicht ganz scharf von einander abgränzen, in ihren Mittel-  
feldern aber dennoch wesentliche Unterschiede zeigen. Dies  
heißt mit anderen Worten: es giebt in der Landesflora  
eine Anzahl nach und nach sich ablösender Gruppen, deren  
Pflanzen gemeinschaftlich blühen, und dadurch temporär  
dem Teppich ein bestimmtes Gepräge verleihen.

In welcher Weise mir diese Gruppen gebildet zu sein  
scheinen, und wie sie der Zeit nach auf einander folgen, wird  
aus der folgenden Aufzählung deutlich werden. Die Dauer  
einer jeden umfaßt die Zeit von etwa einem halben  
Monat, und fällt auch so ziemlich mit einer bestimmten  
Kalenderzeit zusammen, die ich in Klammern dabei bemerkt  
habe. Letztere habe ich absichtlich nicht zur Grundlage  
der Eintheilung gewählt, weil die ganzen Gruppen durch  
die Witterung mitunter ansehnlich entweder weiter vor, —  
oder zurückgeschoben werden, und sie dann mit der Kalender-  
zeit nicht zusammenstimmen. Den Vorläufer der ersten  
Gruppe bildet *Galanthus nivalis*, welcher schon zu Ende  
Februar und Anfang März erscheint.

## I.

(März, zweite Hälfte.)

<i>Alnus glutinosa.</i>	<i>Gagea pratensis.</i>
<i>Anemone Hepatica.</i>	<i>Holosteum umbellatum.</i>
<i>Bellis perennis.</i>	<i>Populus tremula.</i>
<i>Corydalis intermedia.</i>	<i>Salix Caprea.</i>
<i>Corylus Avellana.</i>	<i>Tussilago Farfara.</i>
<i>Gagea lutea.</i>	<i>Viola odorata.</i>

## II.

(April, erste Hälfte.)

<i>Adoxa Moschatellina.</i>	<i>Corydalis cava.</i>
<i>Caltha palustris.</i>	<i>Equisetum arvense.</i>



Gagea arvensis.	Populus pyramidalis.
Hippophaë rhamnoides.	tremula.
Lathraea Squamaria.	Ulmus effusa.
Petasites officinalis.	Viscum album.
tomentosus.	

## III.

(April, zweite Hälfte.)

Acer platanoides.	Prunus insititia.
Anemone nemorosa.	spinosa.
pratensis.	Pulmonaria officinalis.
Pulsatilla.	Ranunculus Ficaria.
vernalis.	Salix aurita.
Barbarea praecox.	cinerea.
Betula alba.	repens.
Carex praecox.	viminalis.
Chrysosplenium alternifolium.	Veronica agrestis.
Draba verna.	arvensis.
Equisetum Telmateja.	Buxbaumii.
Erodium Cicutarium.	hederaefolia.
Fagus sylvatica.	opaca.
Glechoma hederacea.	polita.
Juniperus communis.	triphyllus.
Oxalis Acetosella.	verna.
Potentilla opaca.	Viola hirta.
Primula officinalis.	mirabilis.
elatior.	sylvestris.
Prunus avium.	

## IV.

(Mai, erste Hälfte.)

Alchemilla vulgaris.	Cerastium arvense.
Anemone ranunculoides.	semidecandrum.
Barbarea arcuata.	Dentaria bulbifera.
Cardamine amara.	Empetrum nigrum.
hirsuta.	Euphorbia Cyparissiaë.
Carpinus Betulus.	Fragaria collina.

<i>Fragaria vesca.</i>	<i>Ribes nigrum.</i>
<i>Luzula campestris.</i>	<i>rubrum.</i>
<i>    pilosa.</i>	<i>Salix alba.</i>
<i>Lychnis flos cuculi.</i>	<i>fragilis.</i>
<i>Myrica Gale.</i>	<i>purpurea.</i>
<i>Orobus vernus.</i>	<i>triandra.</i>
<i>Potentilla sterilis.</i>	<i>Stellaria Holostea.</i>
<i>Prunus Padus.</i>	<i>    uliginosa.</i>
<i>Pyrus communis.</i>	<i>Taraxacum officinale.</i>
<i>    Malus.</i>	<i>Valerianella olitoria.</i>
<i>Quercus Robur.</i>	<i>Vicia lathyroides.</i>
<i>Ribes Grossularia.</i>	<i>Vinca minor.</i>

## V.

(Mai, zweite Hälfte.)

<i>Alyssum calycinum.</i>	<i>Lamium maculatum.</i>
<i>Andromeda polifolia.</i>	<i>    purpureum.</i>
<i>Anthriscus Cerefolium.</i>	<i>Lonicera Xylosteum.</i>
<i>    sylvestris.</i>	<i>Majanthemum bifolium.</i>
<i>    vulgaris.</i>	<i>Melica nutans.</i>
<i>Arabis hirsuta.</i>	<i>    uniflora.</i>
<i>Arctostaphylos Uva ursi.</i>	<i>Menyanthes trifoliata.</i>
<i>Asperugo procumbens.</i>	<i>Mercurialis perennis.</i>
<i>Asperula odorata.</i>	<i>Myosotis hispida.</i>
<i>Barbarea vulgaris.</i>	<i>    intermedia.</i>
<i>Chaerophyllum temulum.</i>	<i>    stricta.</i>
<i>Convallaria majalis.</i>	<i>Odontites verna.</i>
<i>Cornus sanguinea.</i>	<i>Orchis latifolia.</i>
<i>Evonymus europaeus.</i>	<i>    Morio.</i>
<i>Galeobdolon luteum.</i>	<i>Orobus niger.</i>
<i>Geranium pusillum.</i>	<i>    tuberosus.</i>
<i>Geum rivale.</i>	<i>Paris quadrifolia.</i>
<i>Gnaphalium dioicum.</i>	<i>Quercus sessiliflora.</i>
<i>Hieracium Pilosella.</i>	<i>Ranunculus acris.</i>
<i>Lamium album.</i>	<i>    auricomus.</i>
<i>    amplexicaule.</i>	<i>    lanuginosus.</i>

Ranunculus Philonotis.	Stellaria nemorum.
Rhamnus cathartica.	Vaccinium Myrtillus.
Frangula.	uliginosum.
Rhinanthus major.	Vitis Idaea.
minor.	Valeriana dioica.
Salix cuspidata.	officinalis.
pentandra.	Veronica latifolia.
Salvia pratensis.	Viburnum Opulus.
Sanicula europaea.	Vicia tenuifolia.
Saxifraga granulata.	Viola canina.
tridactylites.	epipsila.
Sisymbrium Alliaria.	palustris.
Sorbus Acuparia.	

## VI.

(Juni, erste Hälfte.)

Actaea spicata.	Iris Pseud-Acorus.
Aegopodium Podagraria.	Ledum palustre.
Ajuga genevensis.	Leontodon hastilis.
Aquilegia vulgaris.	Lychnis Viscaria.
Barbarea stricta.	Myosotis palustris.
Cardamine Impatiens.	versicolor.
Cerastium glomeratum.	Neottia Nidus avis.
triviale.	Ophioglossum vulgatum.
Convallaria multiflora.	Orchis maculata.
Polygonatum.	purpurea.
Crataegus Oxyacantha.	Pinguicula vulgaris.
Cynoglossum officinale.	Pinus sylvestris.
Equisetum pratense.	Platanthera bifolia.
sylvaticum.	Polygalá vulgaris.
Fragaria elatior.	Polygonum Bistorta.
Genista anglica.	Potentilla anserina.
germanica.	Primula farinosa.
Geum urbanum.	Pyrola uniflora.
Hieracium pratense.	Rosa canina.
Hottonia palustris.	tomentosa.

Rubus <i>Idaeus</i> .	<i>Vorilis Anthriseus</i> .
<i>saxatilis</i> .	<i>Trifolium montanum</i> .
<i>Sambucus nigra</i> .	<i>Trollius europaeus</i> .
<i>Sarothamnus Scoparius</i> .	<i>Turritis glabra</i> .
<i>Scorzonera humilis</i> .	<i>Ulex europaeus</i> .
<i>Silene nutans</i> .	<i>Veronica Anagallis</i> .
<i>Otites</i> .	<i>Beccabunga</i> .
<i>Sorbus torminalis</i> .	<i>officinalis</i> .
<i>Spergula arvensis</i> .	<i>serpyllifolia</i> .

## VII.

(Juni, zweite Hälfte.)

<i>Arnica montana</i> .	<i>Melampyrum arvense</i> .
<i>Botrychium Lunaria</i> .	<i>Nasturtium amphibium</i> .
<i>Briza media</i> .	<i>Ophrys Myodes</i> .
<i>Calla palustris</i> .	<i>Orchis incarnata</i> .
<i>Campanula persicifolia</i> .	<i>Papaver Argemone</i> .
<i>Caucalis daucoides</i> .	<i>Phyteuma spicatum</i> .
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> .	<i>Polygala comosa</i> .
<i>Cochlearia officinalis</i> .	<i>Potentilla argentea</i> .
<i>Comarum palustre</i> .	<i>supina</i> .
<i>Epilobium montanum</i> .	<i>Poterium Sanguisorba</i> .
<i>Euphorbia palustris</i> .	<i>Ranunculus arvensis</i> .
<i>Genista pilosa</i> .	<i>polyanthemos</i> .
<i>Geranium dissectum</i> .	<i>Rosa rubiginosa</i> .
<i>Robertianum</i> .	<i>Rubus corylifolius</i> .
<i>Helosciadium inundatum</i> .	<i>dumetorum</i> .
<i>Hordeum murinum</i> .	<i>fruticosus</i> .
<i>Linnaea borealis</i> .	<i>suberectus</i> .
<i>Lithospermum officinale</i> .	<i>Wahlbergii</i> .
<i>Lysimachia Nummularia</i> .	<i>Scrophularia nodosa</i> .
<i>thyrsiflora</i> .	<i>Spergula arvensis</i> .
<i>Malachium aquaticum</i> .	<i>Spiraea Filipendula</i> .
<i>Medicago lupulina</i> .	<i>Stellaria glauca</i> .
<i>minima</i> .	<i>graminea</i> .



<i>Thalictrum minus.</i>	<i>Vicia dumetorum.</i>
<i>Thlaspi arvense.</i>	<i>sylvatica.</i>
<i>Tilia platyphyllos.</i>	

## VIII.

(Zuli, erste Hälfte.)

<i>Aethusa Cynapium.</i>	<i>Galium sylvaticum.</i>
<i>Agrostemma Githago.</i>	<i>Genista tinctoria.</i>
<i>Alisma Plantago.</i>	<i>Helianthemum vulgare.</i>
<i>Allium Scorodoprasum.</i>	<i>Honckenya peploides.</i>
<i>Anchusa officinalis.</i>	<i>Hyoscyamus niger.</i>
<i>Anthyllis Vulneraria.</i>	<i>Hypochoeris glabra.</i>
<i>Arabis arenosa.</i>	<i>radicata.</i>
<i>Astragalus glycyphyllos.</i>	<i>Juncus communis.</i>
<i>Ballota nigra.</i>	<i>Lathyrus palustris.</i>
<i>Bryonia alba.</i>	<i>pratensis.</i>
<i>Calamintha Acinos.</i>	<i>sylvestris.</i>
<i>Camelina sativa.</i>	<i>Lysimachia vulgaris.</i>
<i>Campanula latifolia.</i>	<i>Marrubium vulgare.</i>
<i>patula.</i>	<i>Matricaria Chamomilla.</i>
<i>rapunculoides.</i>	<i>Nepeta Cataria.</i>
<i>Centaurea Cyanus.</i>	<i>Neslea paniculata.</i>
<i>Cineraria palustris.</i>	<i>Ononis repens.</i>
<i>Clinopodium vulgare.</i>	<i>spinosa.</i>
<i>Convolvulus arvensis.</i>	<i>Orobanche ramosa.</i>
<i>sepium.</i>	<i>Oxalis corniculata.</i>
<i>Delphinium Consolida.</i>	<i>stricta.</i>
<i>Dianthus Armeria.</i>	<i>Papaver dubium.</i>
<i>Carthusianorum.</i>	<i>Rhoeas.</i>
<i>deltoides.</i>	<i>Pedicularis sylvatica.</i>
<i>prolifer.</i>	<i>Pimpinella magna.</i>
<i>Echium vulgare.</i>	<i>Pisum maritimum.</i>
<i>Ervum hirsutum.</i>	<i>Polygonum amphibium.</i>
<i>tetraspermum.</i>	<i>Potamogeton filiformis.</i>
<i>Euphorbia Esula.</i>	<i>mucronatus.</i>
<i>Galium Aparine.</i>	<i>pectinatus.</i>

Potamogeton perfoliatus.	Sagittaria sagittaeifolia.
Pyrola secunda.	Sedum acre.
umbellata.	Silene inflata.
Ranunculus aquatilis.	Thalictrum flavum.
divaricatus.	Tilia ulmifolia.
Lingua.	Tragopogon pratense.
Rubus affinis.	Thymus Serpyllum.
glandulosus.	Vaccinium Oxycoccos.
rudis.	Verbascum thapsiforme.
thyrsiflorus.	Vicia Cracca.

## IX.

(Zufi, zweite Hälfte.)

Achillea Millefolium.	Cichorium Intybus.
Ptarmica.	Circaea alpina.
Achyrophorus maculatus.	lutetiana.
Allium oleraceum.	Cirsium arvense.
vineale.	lanceolatum.
Anthemis Cotula.	Crepis biennis.
tinctoria.	paludosa.
Arenaria serpyllifolia.	pinnatifida.
Armeria vulgaris.	tectorum.
Berteroa incana.	Cuscuta Epilinum.
Betonica officinalis.	Epithymum.
Cakile maritima.	europaea.
Campanula glomerata.	monogyna.
rotundifolia.	Cynanchum Vincetoxicum.
Trachelium.	Digitalis ambigua.
Carlina vulgaris.	Echinospermum Lappula.
Centaurea maculosa.	Elatine Alsinastrum.
Scabiosa.	Hydropiper.
Chondrilla juncea.	Epilobium angustifolium.
Chrysanthemum segetum.	hirsutum.
Leucanthemum.	parviflorum.
Parthenium.	palustre.
Cicendia filiformis.	roseum.

- Epipactis Helleborine.*  
*palustris.*  
*Erigeron acris.*  
*canadensis.*  
*Erysimum cheiranthoides.*  
*Eupatorium cannabinum.*  
*Euphorbia Peplus.*  
*Euphrasia officinalis.*  
*Galium Mollugo.*  
*palustre.*  
*saxatile.*  
*verum.*  
*Gentiana cruciata.*  
*Geranium columbinum.*  
*palustre.*  
*pusillum.*  
*sanguineum.*  
*Gnaphalium sylvaticum.*  
*Goodyera repens.*  
*Gymnadenia conopsea.*  
*Gypsophila muralis.*  
*Helichrysum arenarium.*  
*Helosciadium repens.*  
*Hydrocharis Morsus ranac.*  
*Hypericum perforatum.*  
*quadrangulum.*  
*tetrapterum.*  
*Impatiens Noli tangere.*  
*Inula britannica.*  
*salicina.*  
*Knautia arvensis.*  
*Lappa tomentosa.*  
*Leonurus Cardiaca.*  
*Lepidium ruderales.*  
*Linaria vulgaris.*  
*Linum catharticum.*  
*Lotus corniculatus.*  
*Lycopodium clavatum.*  
*inundatum.*  
*Lycopus europaeus.*  
*Lythrum Salicaria.*  
*Malva Alcea.*  
*neglecta.*  
*sylvestris.*  
*Medicago falcata.*  
*Melampyrum cristatum.*  
*nemorosum.*  
*pratense.*  
*Melandrium album.*  
*rubrum.*  
*Mentha aquatica.*  
*Monotropa Hypopitys.*  
*Nuphar luteum.*  
*pumilum.*  
*Nymphaea alba.*  
*Odontites rubra.*  
*Oenanthe fistulosa.*  
*Lachenalii.*  
*Phellandrium.*  
*Oenothera biennis.*  
*Origanum vulgare.*  
*Ornithopus perpusillus.*  
*Orobanche coerulea.*  
*Potamogeton natans.*  
*praelongus.*  
*Potentilla procumbens.*  
*reptans.*  
*Tormentilla.*  
*Prunella grandiflora.*  
*vulgaris.*

<i>Pulicaria dysenterica.</i>	<i>Sonchus arvensis.</i>
<i>vulgaris.</i>	<i>Spiraea Ulmaria.</i>
<i>Radiola linoides.</i>	<i>Stachys germanica.</i>
<i>Ranunculus sceleratus.</i>	<i>palustris.</i>
<i>Rubus caesius.</i>	<i>Stellaria crassifolia.</i>
<i>discolor.</i>	<i>Succisa pratensis.</i>
<i>Radula.</i>	<i>Tanacetum vulgare.</i>
<i>Sprengelii.</i>	<i>Torilis Anthriscus.</i>
<i>thyrsoides.</i>	<i>Trifolium alpestre.</i>
<i>villicaulis.</i>	<i>arvense.</i>
<i>Sanguisorba officinalis.</i>	<i>pratense.</i>
<i>Scabiosa Columbaria.</i>	<i>repens.</i>
<i>Scirpus maritimus.</i>	<i>Utricularia vulgaris.</i>
<i>Scutellaria galericulata.</i>	<i>Verbascum Lychnitis.</i>
<i>Sedum boloniense.</i>	<i>nigrum.</i>
<i>reflexum.</i>	<i>Thapsus.</i>
<i>Senecio Jacobaea.</i>	<i>Verbena officinalis.</i>
<i>Sium latifolium.</i>	<i>Veronica longifolia.</i>
<i>Sherardia arvensis.</i>	<i>scutellata.</i>
<i>Solanum Dulcamara.</i>	<i>Vicia cassubica.</i>
<i>nigrum.</i>	

## X.

(August, erste Hälfte.)

<i>Agrimonia Eupatoria.</i>	<i>Asplenium Trichomanes.</i>
<i>odorata.</i>	<i>Aster Tripolium.</i>
<i>Althaea officinalis.</i>	<i>Astragalus Cicer.</i>
<i>Angelica sylvestris.</i>	<i>Berula angustifolia.</i>
<i>Apium graveolens.</i>	<i>Blechnum Spicant.</i>
<i>Archangelica officinalis.</i>	<i>Bupleurum tenuissimum.</i>
<i>Arnoseris minima.</i>	<i>Callitriche autumnalis.</i>
<i>Artemisia Absinthium.</i>	<i>Campanula bononiensis.</i>
<i>campestris.</i>	<i>Carduus crispus.</i>
<i>vulgaris.</i>	<i>nutans.</i>
<i>Asplenium Filix femina.</i>	<i>Ceratophyllum demersum.</i>
<i>Ruta muraria.</i>	<i>submersum.</i>



- Cicuta virosa.*  
*Cirsium acaule.*  
     *oleraceum.*  
     *palustre.*  
*Cnidium venosum.*  
*Conium maculatum.*  
*Corrigiola littoralis.*  
*Cystopteris fragilis.*  
*Datura Stramonium.*  
*Daucus Carota.*  
*Dipsacus sylvestris.*  
*Drosera anglica.*  
     *intermedia.*  
     *rotundifolia.*  
*Equisetum hiemale.*  
*Eryngium campestre.*  
     *maritimum.*  
*Erythraea Centaurium.*  
*Falcaria Rivini.*  
*Filago arvensis.*  
     *germanica.*  
     *minima.*  
*Galeopsis Ladanum.*  
     *ochroleuca.*  
     *Tetrahit.*  
     *versicolor.*  
*Gnaphalium luteo-album.*  
     *uliginosum.*  
*Herniaria glabra.*  
*Hieracium umbellatum.*  
*Hippuris vulgaris.*  
*Hydrocotyle vulgaris.*  
*Hypericum humifusum.*  
     *montanum.*  
*Jasione montana.*
- Illecebrum verticillatum.*  
*Jurinea cyanoides.*  
*Lactuca muralis.*  
     *Scariola.*  
*Laserpitium pruthenicum.*  
*Leontodon autumnalis.*  
*Libanotis montana.*  
*Linaria minor.*  
*Lonicera Periclymenum.*  
*Marrubium vulgare.*  
*Melilotus alba.*  
     *macrorrhiza.*  
     *officinalis.*  
*Mentha arvensis.*  
     *Pulegium.*  
     *sylvestris.*  
*Myriophyllum spicatum.*  
     *verticillatum.*  
*Onopordon Acanthium.*  
*Osmunda regalis.*  
*Parnassia palustris.*  
*Pastinaca sativa.*  
*Peplis Portula.*  
*Peucedanum Oreoselinum.*  
*Picris hieracioides.*  
*Pimpinella Saxifraga.*  
*Polynemum arvense.*  
*Polypodium Dryopteris.*  
     *Phegopteris.*  
*Polystichum cristatum.*  
     *Filix mas.*  
     *Oreopteris.*  
     *spinulosum.*  
     *Thelypteris.*  
*Pteris aquilina.*

Reseda Luteola.	Sonchus asper.
Salsola Kali.	oleraceus.
Scleranthus annuus.	palustris.
perennis.	Stachys arvensis.
Senecio aquaticus.	sylvatica.
barbaraeifolius.	Stratiotes aloides.
erucaefolius.	Solidago Virga aurea.
paludosus.	Thrinicia hirta.
sylvaticus.	Thyselinum palustre.
viscosus.	Xanthium Strumarium.

## XI.

(August, zweite Hälfte.)

Bidens cernua.	Hedera Helix.
tripartita.	Heracleum Sphondylium.
Calluna vulgaris.	Lycopodium Selago.
Campanula Rapunculus.	Rubus horridus.
Dianthus superbus.	Salicornia herbacea.
Erica Tetralix.	Saxifraga Hirculus.
Erythraea linariaefolia.	Sedum Telephium.
pulchella.	Senecio nemorensis.
Gentiana campestris.	Sweertia perennis.
Pneumonanthe.	

## XII.

(September.)

Artemisia maritima.	Lycopodium annotinum.
Gentiana Amarella.	Pilularia globulifera.
Hieracium boreale.	Scabiosa suaveolens.
Limosella aquatica.	Senecio vulgaris.

## VI. Die Nutzpflanzen und Giftpflanzen.

Zu dem vollständigen Bilde einer Specialflora gehört ohne Zweifel auch die Schilderung der practischen Beziehungen, in welchen die Pflanzen des Landes zu den Bewohnern desselben stehen. Wenn ich nun auch hierüber in dem Nachfolgenden einige Andeutungen gebe, so ist es

nicht etwa meine Absicht auch alle diejenigen einheimischen Pflanzen aufzuzählen, die vielleicht mit der Zeit noch einmal nutzbar gemacht werden könnten, sondern ich werde nur ein Blatt aus der Culturgeschichte der Gegenwart hier einreihen, indem ich nur über diejenigen Pflanzenarten einige Andeutungen geben werde, welche jetzt thatsächlich benutzt werden, wobei freilich einige Rückblicke auf die Vergangenheit sich nicht ganz werden vermeiden lassen. In welcher Weise ich den hier zu behandelnden Stoff ordnen sollte, darüber bin ich lange unschlüssig gewesen. Es standen mir dazu zwei Wege offen, nämlich entweder die betreffenden Pflanzen nach der Ordnung des natürlichen botanischen Systems abzuhandeln, oder sie je nach der Art des Nutzens, den man von ihnen zieht, in gewisse Gruppen zusammen zu ordnen. Letzterem habe ich der größeren Uebersichtlichkeit wegen den Vorzug gegeben.

1. Auffallend geringe ist der Nutzen, welchen unsere einheimischen wildwachsenden Pflanzen für Küche und Keller gewähren. Eigentliche Nahrungspflanzen sind gar nicht darunter, sondern was benutzt wird, dient dort nur zu untergeordneten Zwecken. Aus der Abtheilung der Phanerogamen verwendet man schon seit langen Zeiten die Erdbeeren, Himbeeren, Bizbeeren, Hagebutten, Haselnüsse, Wachholderbeeren und Schwadengrüße; Wassernüsse sollen, wie S. 69 gesagt, früher vorhanden und gleichfalls benutzt worden sein, — eine andere, jetzt sehr beliebte und in manchen Gegenden des Landes sehr häufige Frucht blieb aber bis auf neuere Zeit ganz unbeachtet. Dies ist die Kröns- oder Preußelbeere, die freilich schon gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in unseren Seestädten theils

aus Norwegen (S. 35), theils für Rostock aus dem pommerschen Darß eingeführt wurden. Erst um das Jahr 1815 machte der auf letzterer Halbinsel in Born wohnende Oberförster Niemann die Rostocker darauf aufmerksam, daß sie selbst in ihrer großen Haide einen reichen Vorrath dieser Beeren besäßen, worauf denn auch dort die Benutzung derselben ihren Anfang nahm;<sup>1</sup> in den von der Küste entlegeneren Orten blieben sie aber noch längere Zeit unbekannt. Ich selbst lernte sie zuerst etwa um das Jahr 1830 zu Ludwigslust kennen, wohin ganze Wagenladungen, wenn ich nicht irre, aus dem Hannöverschen kamen, und in großen Mengen für die großherzogliche Küche eingemacht wurden. Zur Herstellung des magenstärkenden „Bitteren“ wird der Wermuth, zum Wachholderbranntwein werden die Kuirkbeeren und zum Maitränk der Möhsch benutzt, — letzteres Getränk wird hier aber auch nur erst seit etwa zwanzig Jahren bereitet. Das früher sehr beliebte Birchwasser wird jetzt, in Folge der bessern Forstcontrolle, nur noch ins Geheim von den Kindern gezapft. — Aus der Klasse der Kryptogamen benutzt man nur Champignons und Morcheln. Erstere werden seit neuester Zeit auch schon hin und wieder auf Mistbeeten in Kellern cultivirt, und für letztere gab es schon früher in der benachbarten Mark Brandenburg, und wahrscheinlich auch bei uns, eine zwar sehr einfache, aber etwas kostspielige Culturmethode. Da man nämlich bemerkt hatte, daß dieser Pilz an den Orten, wo Kohlenmeiler gestanden hatten, besonders häufig und üppig emporspresse, bemüheten

1. A. v. Wehrs der Darß und Zingst. Hannover 1819. S. 112 Anm.



sich die Einsammelrinnen der Morcheln die Brandstätten möglichst zu vervielfältigen und richteten dabei so viele Waldbrände an, daß endlich die Gesetzgebung mit schweren Strafen gegen diesen Industriezweig einschreiten mußte.<sup>1</sup>

Ebenso wenig zahlreich, wie die im wilden Zustande benutzten Pflanzen, sind diejenigen eingeborenen Arten, welche jetzt zu culinaren u. a. verwandten Zwecken cultivirt werden. Dies zeigt ein Blick auf unsere Gärten und Ackerfelder, wo wir nur die wenigen vereinzelt, mit gesperrter Schrift gedruckten eingeborenen Pflanzenarten (deren Indigenat überdies bei manchen noch in Frage steht,) zwischen zahlreichen ausländischen Nutzpflanzen antreffen, welche letztere die eigentliche Grundlage unserer Pflanzenkost bilden.

Es werden nämlich in den Gärten als Gemüsepflanzen, Gewürze, Obst u. s. w. cultivirt: verschiedene Kohlarthen, weiße Rüben, Kohlrabi, Märrettich, Rettich und Radies, der Weinstock, letzterer aber nur an warmen, geschützten Wänden und im Winter zugedeckt; die Saubohne, Erbse, Kriech- und Stangenbohne, der Pfirsichbaum und die Aprikose, — welche aber eine sehr geschützte Stelle haben und im Winter zugedeckt werden müssen; die Pflaume, und nur noch in Bauergärten die Krefe (*Prunus insititia*) und die Vogelfirsche (*Pr. avium*); die Kirsche, die Himbeere (*Rubus Idaeus*), die Erdbeere (*Fragaria elatior, grandiflora, virginiana*); selten die Mispel, desto häufiger aber Apfel und Birnen (*Pyrus malus, communis*); der Kürbiß, die Gurke, der Portulak, Stachel-

1. Dietrichs Pflanzenreich 1770 S. 1308.

und Johannisbeeren (*Ribes Grossularia, rubrum, feltener nigrum*); Sellerie (*Apium graveolens*), Peterzilie, Rümmele, Pastinak, Kerbelrüben (*Chaerophyllum bulbosum*), Dill, Mohrrübe (*Daucus Carota*); Cichorie (*Cichorium Intybus*), Schwarzwurz (*Scorzonera hispanica*), Salat; der Erdapfel (*Helianthus annuus*) nur noch selten in einigen Gegenden, überall aber die Kartoffel; Majoran, Pfefferkaut, Thymian; Runkelrübe (*Beta vulgaris*), Spinat, Sauerampfer; Hopfen, Wallnußbaum, Haselnußstaude (*Corylus avellana, tubulosa*); Knoblauch, Porree, Schnittlauch, Zwiebel; Spargel (*Asparagus officinalis*); Mais, Hirse.

Lenken wir endlich unsere Schritte auf die Ackerfelder und überblicken wir die sämmtlichen dort im Großen zu verschiedenen Zwecken cultivirten Pflanzenarten, so treffen wir dort nur eine einzige Species an, die wir mit Sicherheit als eingeborene beanspruchen können. Es sind nämlich folgende: Erbsen, Linsen, die polnische Wicke (*Ervum monanthos*) als Mengfutter gebauet, die gemeine Wicke (*Vicia sativa* — einheimisch?), Klee (*Trifolium repens* und *pratense*, beide Arten wahrscheinlich nur eingebürgert, nicht eingeboren!) Luzerne, gelbe Lupinen (*Lupinus luteus*) in den Sand- und Haidegegenden; Rübsen, Raps (*Brassica Rapa, Napus*), Runkelrüben, Kartoffeln, Buchweizen, Taback (*Nicotiana Tabacum, rustica*) besonders in Mählenburg-Strelitz; Spörk (*Spergula arvensis*), Flachshanf; Hafer (*Avena sativa, feltener orientalis* und *flavescens*), Roggen, Weizen (*Triticum vulgare, feltener turgidum, durum, polonicum, Spelta, monococcum, dicoccum*), Gerste (*Hordeum vulgare, hexastichon, disti-*

chon, Zeocriton), Mais, letzterer nur zum Grünfütter gebauet.

Wann diese ausländischen Culturpflanzen in Mecklenburg eingeführt worden sind, darüber fehlen uns leider fast alle sicheren Angaben, da man diesem interessanten Zweige unserer Culturgeschichte früher keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Das Wenige, was sich darüber noch ermitteln läßt, beschränkt sich hauptsächlich auf Folgendes:

Der Anbau mancher wichtigen Pflanze reicht hier schon ziemlich weit zurück, nämlich in die Zeit, als dies Land noch slavische Bevölkerung hatte. Denn als der Bischof Otto von Bamberg im J. 1124 zu unsern Nachbarn, den slavischen Pommern, kam, wurden dort schon Obstbäume gezogen, so wie *triticum*, *papaver*, *cannabus* et *cuncti generis legumina* gebauet. Flachs und Roggen werden im J. 1158 urkundlich unter den slavischen Abgabe-Artikeln genannt, Weizen wird urkundlich 1191, Hafer 1193, Erbsen und ein Birnbaum werden 1228, ein Weinberg<sup>1</sup> 1229, Gerste wird 1255 namhaft gemacht. Auch der Anbau des Buchweizens schreibt sich vielleicht schon von den Slaven her, doch können wir ihn nur erst in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in Mecklenburg bestimmt nachweisen. Um das J. 1500 wurden auf den Feldern der Johanniter-Comthurei Mirow gebauet: Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Buchweizen, Hanf und Wein; nehmen wir noch die Erbsen dazu, so haben wir damit wohl alles zusammengefaßt, was um jene Zeit Gegenstand

1. Der Weinbau war den Slaven unbekannt; derselbe wurde erst durch die Geistlichkeit (um Abendmahlswein zu haben,) hier eingeführt.

des Unbaues im Großen auf den Ackerfeldern bildete. In den Gärten zog man im 16. Jahrhundert schon Weinstöcke, Pfirsichbäume, Maulbeerbäume, Wallnußbäume und Johannisbeeren; veredelte Sorten von Kirschen wurden wahrscheinlich erst im J. 1506 in Mecklenburg eingeführt; über das Gemüse erfahren wir leider gar nichts, doch hat wohl damals schon der Kohl eine Hauptrolle darunter gespielt. Einen sehr bedeutsamen Zweig der städtischen Gartenkultur bildete aber der Hopfenbau, welcher gegenwärtig fast ganz darnieder liegt. — Die wichtigste neue Kulturpflanze, deren Anbau im Laufe des 17. Jahrhunderts, und zwar in der zweiten Hälfte desselben, eingeführt wurde, war der Taback. Eine andere, noch viel nützlichere amerikanische Pflanze, die Kartoffel, fand erst im folgenden Jahrhunderte Eingang in Mecklenburg. Die ersten hier gebaueten Knollen sah ein glaubwürdiger Berichterstatter im J. 1736, und in einer Zeitschrift<sup>1</sup> vom J. 1749 handelt ein Artikel „von den in Mecklenburg etwas bekannter werdenden Kartoffeln“; im Großen auf den Feldern angebauet wurden sie jedoch erst seit etwa 1766. Ziemlich gleichen Schritt mit dem Anbau der Kartoffel hielt der Kleebau. Geringe Quantitäten von weißem und rothen Klee wurden zwar schon lange vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts gebauet, aber erst gegen das J. 1775 fing man an die ganzen Schläge mit Klee zu durchsäen. Auch mit dem Anbau von Raps wurden schon im J. 1721, von Luzerne um 1750 und Runkelrüben um 1790 Versuche gemacht, — allgemeiner um sich gegriffen hat hier aber die

1. Schweriner Anzeigen 1749 St. 29.



Cultur dieser Pflanzen erst in viel späterer Zeit, nämlich seit etwa dem J. 1825.<sup>4</sup> Zu diesen sind in neuerer Zeit noch verschiedene Arten des Weizens, Hafers und der Gerste hinzugekommen und sodann im Laufe der beiden letzten Jahrzehnte noch der Mais, die gelbe Lupine und die polnische Wicke. Auch die Anlage größerer Maulbeerplantagen für den Seidenbau gehört der neuesten Zeit an, wenn auch vereinzelt Maulbeerbäume in den Gärten erweislich schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts vorhanden waren. Eine ganz isolirte und auch schon wieder verschwundene Erscheinung war der Anbau von Krapp- und Weberkarden, der vor etwa 30 Jahren längere Zeit hindurch von dem Vater unseres beliebten humoristischen Dichters Fritz Reuter bei Stavenhagen im Großen betrieben wurde.

Manche Pflanze, welche früher zu culinarischen Zwecken angebauet wurde, ist zwar längst durch andere, wohl-schmeckendere Arten aus den Gärten verdrängt worden, hat sich aber doch verwildert in unserer Flora behauptet und eingebürgert, wie dies z. B. mit *Oenothera biennis*, *Borago officinalis* und vielleicht noch manchen anderen der Fall gewesen sein mag. Welche unserer Pflanzen alle in diese Kategorie gehören, würde sich nur dann mit Sicherheit nachweisen lassen, wenn man diese Seite der vaterländischen Culturgeschichte früher mehr beachtet hätte, als es in der That geschehen ist.

2. Ansehnlicher ist die Zahl der officinellen Pflanzen, welche unsere Flora liefert. Ueber diese hat

---

1. Eine ausführlichere Geschichte unserer Culturpflanzen haben mein Bruder und ich gegeben in meiner Geschichte Mecklenburgs I, 362 ff. 396 u. II, 518 ff. 523 ff.

mir mein Freund und Verwandter, Herr Apotheker F. Timm in Malchin, Auskunft gegeben, indem er mir nachfolgende nach dem natürlichen Systeme geordnete und von mir hin und wieder ergänzte Uebersicht der einheimischen Arzneistoffe, welche in seiner Apotheke vorräthig gehalten werden, mitgetheilt hat. Dieselbe wird auch wohl so ziemlich auf alle mecklenburgische Apotheken Anwendung finden.

*Anemone pratensis*. Von dieser waren früher Kraut und Extract gebräuchlich, in jüngster Zeit wird sie hauptsächlich nur homöopathisch verwendet.

*Papaver Rhoëas*. Die Blumenblätter dienen zum Brustthee und zur Saftbereitung.

*Chelidonium majus* wird zur Extractbereitung und zur Tinctur verwendet, auch von Homöopathen, und in der Volksheilmittellehre braucht man die Blätter in Eierfuchen gebacken wider die Gelsucht, nach dem Grundsatz *similia similibus curantur*; nach einer gleichen Ideenverbindung gebrauchte man früher die steinharten Samenkörner des *Lithospermum officinale* gegen Stein- und Griesbeschwerden.

*Fumaria officinalis* zur Extractbereitung, ist ziemlich veraltet.

*Nasturtium officinale* zu Kräutersäften.

*Cochlearia officinalis*, deren Kraut officinell ist, wächst zwar an unserem Seestrand und um Salzquellen wild, wird aber dort wohl kaum eingesammelt. Timm cultivirt seinen Bedarf im Garten.

Von \**Viola odorata* werden die Blumen zur Saftbereitung gebraucht, und von *V. tricolor* das Kraut als Pulver und zum Aufguß (*herba Jaceae*). Erstere ist wohl nur eingebürgert.

*Malva sylvestris*; die Blumen sind officinell.

*Althaea officinalis*; von dieser Pflanze, deren Wurzel officinell ist, gibt das von *Cochlearia* off. Gesagte.

*Tilia platyphyllos* und *ulmifolia*, haben officinelle Blüten; auch als Volksmittel gebraucht.

*Hypericum perforatum*. Die Spitzen des blühenden Krautes sind unter dem Namen „Johanniskraut oder — blut“ besonders als

sympathetisches Volksmittel gebräuchlich; in der homöopathischen Thierheilkunde wird es als blutstillendes Mittel gebraucht.

(*Geranium Robertianum* gilt in manchen Gegenden Deutschlands für ein die Sehkraft stärkendes Volksmittel, — ob auch in Mecklenburg, kann ich nicht sagen. In den Apotheken wird es nicht geführt.)

*Rhamnus cathartica*: die Beeren werden zur Bereitung eines abführenden Saftes gebraucht, und von *R. Frangula* dient die innere Rinde als abführendes Mittel zum Ersatz des Rhubarbers, — ein altes Volksmittel, dem die Aerzte erst in neuester Zeit Aufmerksamkeit schenken.

*Genista tinctoria* ein Harn und Schweiß treibendes Volksmittel.

*Ononis spinosa* und *repens*: die Wurzel noch wenig gebräuchlich gegen Steinbeschwerden u. s. w.

*Melilotus macrorrhiza*; die blühenden Trauben oder Zweigspitzen wurden früher innerlich gebraucht, jetzt nur noch als äußerlich erweichendes Mittel.

*Trifolium arvense*; das Kraut unter dem Namen Mäuselke ist als Volksmittel zum Thee nur noch wenig gebräuchlich.

*Prunus spinosa*. Die Blumen werden unter der Bezeichnung *flores Acaciae nostrat.* als auflösender, gelinde abführender Thee verwendet (Volksmittel.)

*Prunus Padus*. Die junge Rinde als schweißtreibendes Mittel ist ziemlich veraltet.

*Geum urbanum*, die Wurzel als Nelken- oder Benedictwurz (Radix caryophyllata) von den Aerzten verordnet, ist ziemlich veraltet.

*Rubus Idaeus*. Die Früchte dienen zur Bereitung des Himbeersyrups und -wassers.

*Potentilla Tormentilla*. Die Wurzel als abstringirendes Mittel, besonders in der Thierheilkunde, gebräuchlich.

*Agrimonia Eupatoria*, das blühende Kraut ist ein wenig gebräuchliches Volksmittel.

*Bryonia alba*. Die Wurzel wurde früher von den Allopathen gegen Wicht, Manie und Epilepsie gebraucht; jetzt wird sie nur von den Homöopathen verwendet.

*Sanicula europaea*; das Kraut dient als Volksmittel innerlich und äußerlich gegen Wunden, Quetschungen und Geschwüre; jetzt noch selten angewendet.

*Pimpinella Saxifraga*; die Wurzel unter dem Namen *Radix Pimpinellae albae* bei Beschwerden des Halses und der Athmungsorgane auch als Volksmittel gebräuchlich.

*Oenanthe Phellandrium*; die Früchte als *Sem. Phellandrii seu Foeniculi aquatici* officinell.

*Archangelica officinalis*; die Wurzel ist officinell, und auch in der Thierheilkunde gebräuchlich; seltener das daraus gewonnene ätherische Del. — Obgleich diese und die vorhergehende Pflanze in der Umgegend von Malchin ziemlich häufig sind, werden sie dort doch nicht für die Apotheke eingesammelt.

*Conium maculatum*. Das Kraut ist als erweichendes, schmerzstillendes äußeres Mittel gebräuchlich, ebenso das aus dem frischen Kraut bereite Extract und auch ein Pflaster; in jüngster Zeit auch das daraus gewonnene sehr giftige Alkaloid „Coniin oder Cicutin.“

*Viscum album*; die jungen Zweige und Blätter sind officinell, werden aber nur selten angewandt, z. B. in Pulverform gegen Epilepsie u. s. w.

*Sambucus nigra*; die blühenden Trugdolden sind ein bekanntes schweißtreibendes Mittel.

*Valeriana officinalis*: die Wurzel und ein daraus gewonnenes ätherisches Del sind officinell. Da die auf Bergwiesen gewachsenen Wurzeln kräftiger sein sollen, werden sie in Mecklenburg (obgleich die Pflanze sehr häufig ist,) nicht eingesammelt.

*Succisa pratensis*, Kraut und Wurzel früher ein sehr beliebtes Volksmittel (*herba et radix Succisae seu Morsus diaboli*.)

*Tussilago Farfara*, die jungen Blätter als einhüllendes, die Schleimabsonderung beförderndes, auch zur Herstellung des Brustthees dienendes Mittel.

*Solidago Virga aurea*, die blühenden Spitzen als Mittel gegen Steinbeschwerden gebräuchlich.

*Helichrysum arenarium*; das blühende Kraut wird ebenfalls gegen Stein- und Harnbeschwerden verwendet, Volksmittel; wenn ich



nicht sehr irre, werden die Blüthenköpfe auch hin und wieder als Mittel wider Zahnschmerzen aus Pfeifen geraucht.

*Artemisia Absinthium*; das Kraut mit den blühenden Zweigspitzen, so wie ein daraus gewonnenes Extract, flüchtiges und fettes Del sind officinell.

*Artemisia vulgaris*; das Kraut mit den blühenden Zweigspitzen, besonders aber die Wurzel in Pulverform gegen Epilepsie gebräuchlich.

*Tanacetum vulgare*; die blühenden Trugdolben und das daraus gewonnene ätherische Del dienen gegen Würmer, auch als Volksmittel und in der Thierheilkunde seltener gebräuchlich.

*Achillea Millefolium*; die Blätter sammt den blühenden Trugdolben, werden als Thee benutzt (ein bekanntes Volksmittel); auch der Extract wird verwendet, weniger das ätherische Del.

*Matricaria Chamomilla*; die Blüthenköpfe geben einen allgemein bekannten, krampfstillenden Thee; auch das sehr theuere ätherische Del wird benutzt. — Die Pflanze ist hier sehr gemein, und wird auch von armen Kindern gesammelt und für den Hausgebrauch in den Städten zum Verkaufe herumgetragen; die Apotheken sind aber meistens gezwungen ihren großen Bedarf von auswärts (namentlich aus Thüringen) zu beziehen, weil sie nur die Blüthenköpfe gebrauchen und die Einsammler zu faul dazu sind, diese allein zu pflücken. So müssen jährlich mehrere Hundert Thaler, welche hiesige Arme sich mit Leichtigkeit verdienen könnten, ins Ausland gehen.

*Arnica montana*; die Wurzel, noch mehr aber die blühenden Köpfe und die daraus bereitete Tinctur, besonders in jüngster Zeit auch als Volksmittel sehr bekannt, weniger das aus den Wurzeln gewonnene ätherische Del. — Vor etwa 60 Jahren war diese Pflanze bei Kummerow noch so häufig, daß sie dort noch für die Malchiner Apotheke eingesammelt wurde, jetzt kommt sie dort nur noch vereinzelt vor. Jetzt, glaube ich, beziehen alle unsere Apotheken ihren Bedarf von auswärts.

*Lappa communis*; die Wurzel ist officinell und wird zu dem bekannten Holzthee, so wie zu einer den Haarwuchs befördernden Salbe verwendet.

*Centaurea Cyanus*; die Randblüthen dienen als Harn treibendes

Volksmittel, und werden außerdem auch zum Räucherpulver verwendet.

*Taraxacum officinale*; die Wurzel und besonders das aus dem frischen Kraute bereite Extract werden verwendet, — letzteres bildet einen Hauptbestandtheil der als sogenannte Frühlingscuren gebräuchlichen Pflanzendecocte.

*Vaccinium Myrtillus*; die Beeren sind adstringirend und officinell.

*Ledum palustre* wurde früher gegen Reuchhusten, Fieber und Hautkrankheiten gebraucht, jetzt nur noch selten als Mittel wider die Motten.

*Menyanthes trifoliata*; die Blätter, das daraus gewonnene sehr bittere Extract und eine Tinctur wurden früher häufiger gegen Wechselstieber gebraucht (*herba Trifolii fibrini*).

*Gentiana campestris* wird jetzt nur noch selten als Volksmittel unter dem Namen „Stah up un geh weg“ (vergl. S. 40) in den Apotheken gefordert. Im Handel bezieht man statt dessen oft *G. Pneumonanthe* und auch *G. Amarella*. Der officinelle Name ist *herba Gentianellae*.

*Erythraea Centaurium*; das ganze blühende Kraut, so wie das daraus gewonnene Extract sind officinell, und werden unter dem Namen Tausendgülbenkraut oft begehrt.

*Cynoglossum officinale*; die Wurzel war früher officinell, wird aber jetzt nur noch selten gebraucht und vorrätzig gehalten, obgleich sie in neuester Zeit, namentlich in Rußland, gegen den Biß toller Hunde angewendet wird.

*Symphytum officinale*; die Wurzel (*Radix Consolidae*) officinell, als Volksmittel in der Thierheilkunde und neuerdings auch in der Homöopathie verwendet.

*Pulmonaria officinalis* als Volksmittel gegen Schwindsucht u. s. w. gebraucht.

*Solanum Dulcamara*, die jungen Stengel und Aeste officinell; bei Malchin seit Ausrottung der Bräucher weniger häufig, und daher dort nicht mehr gesammelt.

\* *Hyoseyamus niger*; die Blätter, das aus den frischen Blät-

tern gewonnene Extract, sowie die Samen sind officinell; letzterer wird unter dem Namen „Dull Dill“ als Volksmittel gegen Zahnschmerz gefordert.

\* *Datura Stramonium*; Stengel, Blätter und Same, jedes für sich officinell; Stengel und Blätter auch als Volksmittel gegen das Asthma gebraucht, erstere aus einer Pfeife geraucht, letztere mit Taback zu Cigarren verarbeitet. In manchen Gegenden dienen auch die Samen unter dem Namen Stätkführn als Volksmittel gegen die Pleuresie. — Unter demselben Namen und zu gleichem Zwecke werden auch die Samen des *Silybum Marianum* hin und wieder gebraucht, einer Pflanze, die in N. nur selten verwildert gefunden wird. — Diese und die vorausgehende Art sind wohl nur eingebürgerte Pflanzen.

*Verbascum Thapsus*; die Blumen sind officinell und werden namentlich zu dem bekannten Brustthee verwendet.

*Linaria vulgaris*; das frische Kraut wird zur Bereitung einer nur selten gebrauchten Salbe verwendet.

*Veronica Beccabunga*; das frische Kraut wird sowohl von den Aerzten, als auch vom Volke als harntreibendes Mittel in der Wassersucht verwendet und in neuester Zeit sehr gerühmt.

*Veronica officinalis* als Volksmittel gegen Lungen sucht, Rheumatismus und Sicht gebräuchlich.

*Origanum vulgare* als Volksmittel (brauner Duft) gegen Krämpfe, Rheumatismus und unterdrückte Menstruation gebräuchlich.

*Thymus Serpyllum*; das blühende Kraut für äußerliche Zwecke officinell.

*Glechoma hederacea*; das Kraut unter dem Namen *Hedera terrestris* officinell, bildet einen Bestandtheil des bekannten Brustthees, und wird auch vom Volke zu ähnlichen Zwecken gesammelt und verwendet.

*Marrubium vulgare*; das Kraut und das daraus bereitete Extract ist officinell, wird aber nur noch selten gebraucht.

(*Primula officinalis* liefert den Schlüsselblumenthee, ein beliebtes Volksmittel, — wird aber in den Apotheken nicht vorrätzig gehalten.)

*Rumex conglomeratus*, *crispus* und *obtusifolius* werden als Mutterpflanzen der Grindwurzel (*radix Lapathi*) angegeben, welche aber veraltet und wenig gebräuchlich ist.

*Urtica urens*; das Kraut (Hibbennettel) ein Volksmittel gegen veralteten Husten, neuerdings auch von den Aerzten zu gleichem Zwecke verwendet.

*Urtica dioica* ist unter dem Namen *herba Urticae majoris* ein altes Mittel gegen Würmer und auch wohl gegen Schwindjucht.

*Humulus Lupulus*. Gebräuchlich sind die weiblichen Zapfenblüthen (*Strobuli Lupuli*), so wie die den jüngeren Blättern und Schößlingen aufsitzenden gelblichen Drüsen. — Mit den weiblichen Blüthen gestopfte Kopfstissen sind ein bekanntes gegen Schlaflosigkeit verwendetes Volksmittel. — Die Pflanze ist in den Erdenbrüchern so häufig, daß sie gesammelt werden kann.

*Ulmus campestris*; die innere Rinde der mehrjährigen Aeste wird zwar noch vorrätzig gehalten, aber kaum noch verwendet.

*Quercus pedunculata*; die Rinde und die Früchte, letztere besonders im gerösteten Zustande, sind officinell. Eichelkaffee wird strophulösen Kindern häufig verordnet.

*Salix pentandra*, *fragilis*, *alba*, *amygdalina* und *purpurea*, — von allen diesen wird die Rinde zum äußerlichen Gebrauch gesammelt. In *S. pentandra* und *purpurea* soll das Weidenbitter (*Salicin*) in großer Menge enthalten sein.

*Populus pyramidalis* und *nigra* liefern die im Frühling gesammelten harzigen Knospen, welche früher auch zu Aufgüssen als harntreibendes Mittel gebraucht wurden, jetzt aber nur noch zur Bereitung der als Volksmittel dienenden Pappelsalbe Anwendung finden.

*Juniperus communis*; die Beeren und das daraus bereitete Extract und flüchtige Del sind officinell; auch in der Volks- und Thierheilkunde als Schweiß und Harn treibendes Mittel sehr gebräuchlich. Das Holz wird nur noch selten gebraucht, häufiger noch das aus demselben gewonnene flüchtige Del. Früher wurde auch das dem Strauche ansitzende Harz gesammelt.

*Pinus sylvestris*; die jungen Sprossen (*Turiones* seu *Gemmae Pini*) werden im ersten Frühjahr gesammelt und innerlich, wie äußer-



lich, aber nur noch selten, gebraucht. Auch sollen sie beim Bierbrauen statt des Hopfens Anwendung finden.

\* *Acorus Calamus*; die Wurzel, das aus derselben gewonnene Extract und flüchtige Del sind officinell, — auch in der Volks- und Thierheilkunde.

*Orchis purpurea*, *Morio*, *mascula* und *laxiflora*, deren Wurzeln den Salep liefern, werden in Mecklenburg nicht zur Gewinnung desselben benutzt, obgleich manche der genannten Arten in einzelnen Gegenden unseres Landes ziemlich häufig sind. Unsere Apotheken beziehen dies Medicament von auswärts.

*Convallaria majalis*; die blühenden Trauben sind als Bestandtheil des Huselandschen Niesepulvers officinell, und werden auch vom Volke zuweilen als Herz und Nerven stärkendes Mittel angewendet.

*Carex arenaria*; die Wurzel (*radix Caricis arenariae* seu *Sarsaparillae Germanicae* seu *Graminis rubri*) ist officinell. Sie ist im mecklenburgischen Sand- und Haidegebiete häufig genug um für die Apotheken gesammelt werden zu können, ich weiß aber nicht, ob es irgendwo geschieht; bei Neubrandenburg und Malchin fehlt die Pflanze. — Substituirt für dieselbe werden mitunter die Wurzeln von *C. hirta* und *intermedia*, ja selbst von *Scirpus maritimus*. — In neuerer Zeit wird dies Medicament weniger benutzt.

*Triticum repens*, die Quecke. Der unterirdische Stock ist als *radix Graminis* officinell und wird zu Abkochungen und zur Bereitung des Queckextractes gebraucht. Die Pflanze wuchert am stärksten auf humosem Sandboden, und wird dort vorzugsweise für den Apothekenbedarf gesammelt.

*Polypodium vulgare*; der Wurzelstock wird hin und wieder in unseren Apotheken noch vorrätzig gehalten, und in der Volksheilkunde selten noch als Engelsüßwurz, Korallenwurz, gegen Gelb- und Wassersucht gefordert.

*Polystichum Filix mas*; der Wurzelstock und das daraus bereitete ätherische Extract waren bis vor Kurzem als Bandwurmmittel noch sehr gebräuchlich, scheinen jedoch jetzt durch das Kouso verdrängt zu werden.

*Lycopodium clavatum*. Das Kraut ist ein veraltetes harn-

treibendes Mittel; gebräuchlicher sind die Sporen als Streupulver (Hexenmehl); letztere werden aber auch von andern Lycop. Arten gebraucht. — In Mecklenburg wird dieser Stoff wohl kaum irgendwo eingesammelt, weil die Pflanze nur stellenweise so häufig ist, daß sich dies verlohnen würde. Man bezieht den Bedarf von auswärts.

*Equisetum arvense* und *hiemale*; die unfruchtbaren Stengel beider sind schon alte Volksmittel wider Steinbeschwerden; das letztere wird neuerdings auch von Aerzten als solches empfohlen und angewendet.

*Polytrichum commune*; die Pflanze wird als „Goldenes Wiederthou, Gold- oder Venushaar“ (*herba Adiantli aurei*) jetzt nur noch selten als Volksmittel gegen die verschiedensten Krankheiten gebraucht.

*Lobaria pulmonaria* als Volksmittel (Lungengraff genannt,) gegen Lungen- und Brustleiden noch gebräuchlich.

*Imbricaria parietina* wurde wohl wegen seines bitteren, zusammenziehenden Geschmacks als Fiebermittel versucht, ist jetzt aber fast vergessen.

*Polyporus fomentarius*, zubereitet officinell unter dem Namen *Agaricus chirurgorum* (Blutschwamm), — wird, wenn er auch zu den einheimischen Pflanzen gehört, doch wohl kaum irgendwo für die Apotheken eingesammelt, sondern von auswärts bezogen.

*Polyporus suaveolens*, officinell unter dem Namen *Boletus Salicis* (Weidenschwamm), wurde früher gegen Lungenjucht gesammelt und gebraucht.

Außer diesen einheimischen officinellen Pflanzen werden auch noch manche ausländische von unseren Apothekern in ihren Gärten für den Bedarf gezogen. So cultivirt z. B. *Tinum Papaver somniferum*, *Althaea rosea*, *Calendula officinalis*, *Carduus benedictus*, *Mentha crispa*, *Melissa officinalis*, *Salvia officinalis*, *Lavendula Spica*, *Thymus vulgaris*, *Origanum Majorana* und *Chenopodium ambrosioides*. — In Bauergärten wird hin und wieder auch noch *Helleborus viridis* zum Curiren des

kranken Viehes cultivirt. Früher ist wahrscheinlich die Anzahl der cultivirten Arzneipflanzen noch weit beträchtlicher gewesen, hat sich aber vermindert, weil man theils die Stoffe jetzt mit geringerer Mühe und Kosten von auswärts beziehen kann, theils aber auch, weil so viele Pflanzen, welche die Aerzte früher anwendeten, schon gänzlich (selbst als Hausmittel!) entweder durch Vereinfachung des Heilverfahrens überflüssig geworden, oder nur aus Unachtsamkeit in Vergessenheit gerathen sind. — Manche derselben aber haben sich, wenn ihnen auch die fürsorgende Hand des Menschen entzogen worden ist, als verwilderte oder eingebürgerte Pflanzen in unserer Flora eingenistet, so daß auch sie (wie die oben erwähnten Küchengewächse,) jetzt einen secundären Bestandtheil derselben bilden. Dahin rechne ich z. B. *Eranthis hiemalis*, *Helleborus officinalis*, *Berberis vulgaris*, *Viola odorata*, *Saponaria officinalis*, *Levisticum officinale*, *Anthriscus Cerefolium*, *Inula Helenium*, *Artemisia pontica*, *Chrysanthemum Parthenium*, *Silybum Marianum*, *Lactuca virosa*, *Atropa Belladonna*, *Datura Stramonium*, *Hyoscyamus niger*, *Aristolochia Clematitis*, *Parietaria officinalis*, *Acorus Calamus*. Von diesen verwilderten Pflanzen liefern nur die vier mit gesperrter Schrift gedruckten Arten den nöthigen Bedarf für die Apotheken.

3. Aber auch noch manches anderweitig nutzbare Product liefert unsere einheimische Flora. Dahin gehört das Nutzholz, sowohl hartes für die Tischler, Stellmacher, Drechsler u. s. w., als auch weiches zu allerlei Schnitzarbeiten. Ersteres geben die Eichen, Buchen, Birken, Eschen und Tannen unserer Waldungen, die gegen-

wärtig noch einen Flächenraum von etwa 32 □M. bedecken, letzteres die Linden, Weiden und Pappeln. Die biegsamen Zweige der *Salix viminalis* werden von den Korbmachern und zu Einfriedigungen benutzt, während die alten undurchdringlichen und unübersteiglichen Haselwerke (Bäume, deren obere Hälfte aus großen Massen aufgeschichteter Dornzweige bestand,) in neuerer Zeit immer feltener werden. Brennholz liefern hauptsächlich die Eichen, Buchen, Tannen, Erlen und Birken, und an diese reiht sich noch ein anderes, zwar der lebenden Flora angehöriges, aber doch subfossiles Product, nämlich der Torf, von welchem Mecklenburg fast unerschöpfliche Schätze besitzt. Gräser und andere zum Viehfutter dienende Kräuter sind in größter Menge vorhanden, da die Wiesen (incl. der Brücher) ein Areal von mindestens 25 □M. besitzen; sodann Buchmast und Eichen für die Schweine, welchen unsere Flora auch noch in der *Stratiotes aloides* ein sehr beliebtes Nahrungsmittel darbietet. — Die Tanne liefert Theer, die Eiche Borke für die Lohgärber, die Birke Reißer für die Besenbinder, die Linde Bast für Gärtner. Das Rohr wird zum Dachdecken und zur Bekleidung der Wände benutzt, die Binsen (*Juncus communis*) zur Anfertigung von Matten und anderem Flechtwerk, das See gras (*Zostera*) zum Stopfen von Matratzen und Polstern, während in den nördlichen Strandgegenden der Seetang (*Fucus*), ebenso wie im südlichen Mecklenburg die Post-*Arten* (S. 74) zur Ackerdüngung verwendet werden. Als Färbemittel gebrauchte man namentlich in den ländlichen Haushaltungen, vor einigen Decennien auch die Gleißen und Birbeeren, beide sind aber jetzt wohl so ziemlich außer Gebrauch



gekommen, da sich auch in dieser Beziehung die Ansprüche unseres Landvolkes sehr gesteigert haben.

4. Außer den mehr oder weniger wirklich nutzbaren Pflanzen schrieb man früher, und schreibt auch noch jetzt, vielen Gewächsen einen nur eingebildeten Nutzen zu, indem man ihnen außergewöhnliche, übernatürliche Kräfte beilegte. Diese benutzte man in den Zeiten, in welchen noch krasser Aberglaube gleich einer geistigen ägyptischen Finsterniß alle Classen der Bevölkerung umhüllte, als Zaubermittel, und manche derselben (namentlich *Datura Stramonium*, — nach den Erfahrungen die Kämpfer darüber im vorigen Jahrhundert in Persien gemacht hat,) mögen wirklich bei den merkwürdigen Phantasmagorien der Hexen durch ihre narкотischen Eigenschaften eine einflußreiche Rolle gespielt haben. Welche Pflanzen damals alle als Zaubermittel hier in Gebrauch waren, darüber ruhet (Dank der Unwissenheit jener Zeiten!) leider ein Schleier, der niemals mehr gelüftet werden wird. Das Einzige, was ich aus älteren norddeutschen Quellen über diesen Gegenstand erfahren habe, ist Folgendes. Franz Wessel, welcher in der Reformationszeit Bürgermeister zu Stralsund war, erzählt von dem katholischen Feste der Marien-Krautweihe (15. Aug.), wie es zu seinen Jugendzeiten in den norddeutschen Städten gefeiert wurde: „Dann kamen gemeinlich aus allen Häusern eine Magd oder eine Frau, die hatten ein Bund Kraut im Arme, fast so groß als eine Garbe. Da war hineingebunden: Fenchel, Baldrian, Hanf, Draudt, Aepfel, Birnen, Wolwerlei, Mankanen (?), Liebstückerl, Wermuth, Hopfen, Haideblumen, Mandt, allerlei Getreidearten, Butterblumen, Flachs, Knoblauch, Zwiebeln,

Kohl, Senf, Sevenbaum; dies alles, um damit (wenn das Kraut geweiht war,) besondere Zauberei an Vieh und Menschen zu verrichten. Das ganze Bund war mit einem Bindelbände umwickelt. Hiermit ging es nach der Kirche, und dort weihte es ein Priester wohl eine Stunde lang, und schlug mit dem Weihwedel eine Menge Wasser in das Kraut. Dann gingen sie hinaus auf den Kirchhof und trugen das Kraut umher, in welches so viel Wasser hineingeschlagen worden war, daß die Mägde wohl in zwei bis drei Tagen den Mantel nicht wieder trocken kriegen konnten.“ — Bei der Gleichheit der damaligen pommerschen und mecklenburgischen Zustände dürfen wir wohl annehmen, daß bei dem bezeichneten katholischen Feste in Mecklenburg die Krautbündel auf gleiche Weise zusammengesetzt waren, wie in Stralsund.

Eine interessante Arbeit über die Pflanzen als Zauber- mittel hat kürzlich Prof. Unger in Wien geliefert.<sup>1</sup> Aus derselben erhellt, daß fast alle in Deutschland gebrauchten vegetabilischen Zauber- mittel zu den gemeinsten Pflanzen- arten der deutschen Flora gehörten, wie z. B. *Stachys recta*, *Artemisia vulgaris*, *Scabiosa Succisa*, *Glechoma hederacea*, *Origanum vulgare*, *Ononis spinosa*, *Juni- perus communis*, *Spartium scoparium* u. s. w. Man gab diesen wohl deshalb den Vorzug vor den stattlicheren Aindern fremder Länder, weil sie trotz ihrer unscheinbaren Gestalt dem Volke, welches sie von Jugend auf kannte, gleichsam befreundeter und daher wichtiger waren, als die

1. Sitz.-Ber. der mathem. naturwiss. Classe der K. K. Akademie in Wien Bd. 33 S. 303 ff. — Vergl. auch Ungers botanische Streif- güte auf dem Gebiete der Culturgeschichte a. a. D. Bd. 23 und 24.

Fremdlinge. Wie viele von den Pflanzen unserer Flora, an denen wir jetzt achtlos vorübergehen, möchten uns, falls sie sprechen könnten, lehrreiche Geschichten von der Verirrung des menschlichen Geistes, und der Rolle, welche sie dabei gespielt, berichten können!

Aber auch noch gegenwärtig ist diese Rolle keineswegs gänzlich ausgespielt. Zwar hat sich im Laufe der Zeiten der Kreis des Aberglaubens sowohl hinsichtlich der Sachen, auf die er sich erstreckt, als auch in Betreff der Personen, in deren Köpfen er herrscht, wesentlich zusammengezogen, einen ansehnlichen Rest des früheren Zauber-glaubens trifft man aber noch immer in den sympathetischen Curen an, die noch so häufig von Leuten aus allen Ständen (selbst von solchen, die doch auf geistige Bildung Anspruch machen wollen!) betrieben werden. Welche Pflanzen dabei in Anwendung kommen, kann ich aber als Uneingeweihter nicht berichten. Gelegentlich will ich nur zum Schlusse noch erwähnen, daß eine unserer meklenburgischen Flora ursprünglich nicht angehörige Zauberpflanze auch hier noch immer sorgfältig cultivirt wird, obgleich man den Zweck, weshalb dies ursprünglich geschah, längst vergessen zu haben scheint. Es ist dies *Sempervivum tectorum*, welches auf das Dach gepflanzt vor dem Einschlagen des Blitzes schützen sollte: auf den Stalldächern in unseren Städten, auf den Dächern der Tagelöhnerhäuser und besonders der Schweineställe in den Dörfern wird diese Pflanze, ohne daß man jenen Nutzen noch dabei beabsichtigt, jetzt vielfältig gezogen.

5. Richten wir nun unseren Blick noch auf diejenigen einheimischen Pflanzen, die ohne grade Nutzen zu gewähren,

doch den Bewohnern des Landes so lieb und werth sind, daß sie entweder in ihrem wilden Zustande häufig gesammelt werden, oder sogar in den Gärten als Zierpflanzen Aufnahme gefunden haben. Ersteres ist der Fall mit den Dohschen (Leberblumen), Bergfameinnicht, Immortellen (*Helichrysum arenarium*), Möhsch und selbst den Sprickzilgen, die von ärmeren Kindern als Kränze gewunden zum Verkaufe herumgetragen werden; desgleichen bilden Sträuße von Lilienconsalgen und auch von den weißen wohlriechenden Orchis (*Platanthera*) einen Handelsartikel. In den Ziergärten trifft man z. B. Hecken von Weißdorn und Hainbuchen, ferner Ulmen, Linden, Taxis, Eschen, Seedorn, rothen Dorn (eine Spielart der *Crataegus monogyna*), Spiräen (*Sp. Ulmaria* und *Filipendula*, beide mit gefüllten Blüthen), Epheu, Immergrün (*Vinca*), Leberblumen (mit rothen, gefüllten und auch blauen, einfachen Blumen), Goldknöpschen (*Ranunculus repens fl. pleno*), Eisenhut (*Aconitum Napellus*), Trollius, Akelei (*Aquilegia vulgaris*), Fechnelken (*Lychnis Viscaria fl. pl.*), *Sedum reflexum*, Tausendschönchen (*Bellis perennis fl. pl.*), *Achillea millefolium* (mit rothen Blumen), *Campanula persicifolia* und *latifolia*, Grasnelken (*Statice Armeria var. maritima*), Primeln (*Pr. officinalis*, *elatior* und auch wohl *farinosa*), Ehrenpreis (*Veronica longifolia* und *latifolia*), *Polemonium coeruleum*, weiße Orchis, Schneeglöckchen, *Convallaria majalis* und *multiflora*, — und wahrscheinlich auch noch manche andere, die mir augenblicklich nicht beifallen.

Diese bescheidenen Pflanzen stehen aber an Artenzahl gar sehr gegen die stattlichen Ausländer zurück, welche



sich nach und nach in unseren Gärten und Parks ange-  
siedelt haben. Zu den am weitesten durch Meßlenburg  
verbreiteten ausländischen Bäumen gehören: *Populus*  
*pyramidalis* (seltener *balsamifera*), *Aesculus Hippoca-*  
*stanum* (seltener *Pavia*), *Robinia Pseud. Acacia* (seltner  
*hispida* und *viscosa*, so, wie *Gleditschia triacanthos*),  
*Pinus Abies*, *Larix*, *Picea*, *Strobus*, *Thuja occidentalis*;  
hin und wieder kommen auch die Plantane, der Tulpen-  
baum, die ächte Kastanie und die Trauerweide vor, welcher  
letzterer aber das hiesige Winter-Klima wenig zusagt. An  
Kletter- und Schlingpflanzen werden häufig gezogen:  
*Lonicera Caprifolium*, *Ampelopsis hederacea*, *Clematis*  
*azurea*, *Aristolochia Siphon*. Sehr allgemein gezogene  
Gesträuche sind: *Cornus mascula*, *Berberis vulgaris*,  
*Ligustrum vulgare*, *Lycium barbarum*, *Lonicera tata-*  
*rica*, *Symphoricarpos racemosa*, *Diervillia canadensis*,  
*Philadelphus coronarius*, *Syringa vulgaris* und *chinensis*  
(seltner *persica*), *Cytisus Laburnum*, *Colutea arborescens*,  
*Viburnum Opulus*, *Calycanthus floridus*, *Ptelea trifoliata*,  
*Ribes sanguineum* und *aureum*, *Spiraea salicifolia*, *hy-*  
*pericifolia* und *ulmifolia*, *Rosa centifolia*, *cinnamomea*,  
*turbinata*, *pimpinellifolia*, *lutea*, *Crataegus py-*  
*racantha*, *Amygdalus nana*, *Staphylea pinnata*, *Buxus*  
*sempervirens*, *Kerria japonica*, *Deutzia scabra*, *Weigelia*  
*rosea*, *Cydonia japonica* (welche aber im Winter geschützt  
werden muß), und noch manche andere, deren Aufzählung  
uns zu weit führen würde. Mehrere dieser Pflanzen, zu  
denen besonders das südliche Europa, Asien und Amerika  
Beiträge geliefert haben, sind erst in neuerer Zeit allgemeiner  
in unseren Gärten cultivirt worden, wie z. B. die drei

zuletzt genannten, sämmtlich aus Japan stammenden Ge-  
sträucher; auch *Kerria japonica*, *Ribes sanguineum*, *Sy-  
ringa chinensis*, *Ampelopsis hederacea* und *Symphori-  
carpos racemosa* sind erst seit etwa 30 Jahren bekannter  
geworden, *Aristolochia Siphon* wird hier bei Neubranden-  
burg seit etwa 60 Jahren (zuerst durch meinen Groß-  
vater,) gezogen.<sup>1</sup>

Von dem endlich, was an ausländischen krautarti-  
gen Zierpflanzen in den Gärten Mecklenburgs alles culti-  
viret wird, ein auch nur annähernd genügendes Bild zu  
geben, ist mir ganz unmöglich, weil es dazu umfangreicher  
auf diesen Gegenstand gerichteter Studien bedürfte, die ich  
noch nicht habe anstellen können. Eine Aufzählung der-  
selben möchte sonst nicht ohne Interesse sein, da diese  
Pflanzen, wie auch die vorhin erwähnten Zier-Bäume und  
Sträucher, ein Contingent stellen, welches durch Verwilde-  
rung oder vollständige Einbürgerung sich nach und nach  
in die einheimische Flora eindringt. Dies ist z. B. der Fall mit  
*Populus pyramidalis*, *Berberis vulgaris*, *Ligustrum vul-  
gare*, *Hesperis matronalis*, *Silene Armeria*, *Elsholtzia  
cristata*, *Calendula officinalis*, *Galinsogea parviflora*,  
*Rudbeckia laciniata*, *Collomia grandiflora*, *Ornithoga-  
lum nutans* u. m. a. Ähnliche Fälle mögen auch schon  
früher vorgekommen sein, und es wäre nicht unmöglich,  
daß sogar manche der Pflanzen, deren Vorkommen der Art  
ist, daß sie jetzt als eingeborene erscheinen, nur ältere ein-

1. Das schönste Exemplar, welches ich bis jetzt gesehen, befindet  
sich in der benachbarten Uckermark auf dem gräflich Arnimschen Gute  
Boizenburg; es stand dort in der amerikanischen Plantage, wand sich  
bis in den Wipfel einer Tanne hinauf und sein Stamm hatte reichlich  
die Dicke eines starken Armes. Ich sah diese Pflanze im J. 1837.

gebürgerte Zierpflanzen sind, wie z. B. *Aconitum Napellus*, *Polemonium coeruleum* und *Galanthus nivalis*.

6. Stellen wir endlich unseren Nutzpflanzen noch diejenigen einheimischen Gewächse gegenüber, welche dem Menschen direct schädlich sind, — nämlich die Giftpflanzen, — so ist deren Rolle hier glücklicher Weise ganz unbedeutend. Daß durch unachtsame Verwechslung phanerogamischer Giftpflanzen mit ähnlichen nutzbaren Gewächsen Krankheiten oder gar Todesfälle herbeigeführt worden seien, davon ist mir aus Mecklenburg kein einziges Beispiel bekannt. Die Anzahl der benutzten einheimischen Pflanzen ist zu klein, und die einzelnen Arten sind zu kenntlich, als daß hier Irrthümer vorkommen sollten. Nur durch absichtlichen Gebrauch giftiger Pflanzen als Hausmittel, und durch Kinder, die aus Raschhaftigkeit unter den Pflanzen herumkosten, ob sie nicht etwas Eßbares herausfinden können, wird hin und wieder Unheil angerichtet, aber auch dies geschieht sehr selten. Herr Geh. Medicinalrath Dr. G. Brückner in Ludwigslust wußte mir aus seinem großen Physikatkreise, welcher die Städte und Aemter Dömitz, Eldena, Grabow und Neustadt, so wie die Kirchensprengel Picher und Leussow umfaßt, während einer mehr als 40jährigen Praxis nur drei Fälle anzuführen. Der erste betraf eine Vergiftung von drei Knaben zu Ludwigslust, die von der Wurzel der *Cicuta virosa* (Schierling) gegessen hatten. Bei dem Knaben, der am meisten genossen, traten schon nach Verlauf einer halben Stunde vollkommen epileptische Anfälle ein, die so schnell auf einander folgten, daß der Moment der Erschlaffung nicht lang genug war, nur einen Theelöffel voll

schwarzen Kaffee zwischen die Zähne hindurch zu bringen. Erst nach mehreren Stunden gelang es, ihm so viel einzulösen, daß er zum Erbrechen kam. Nun wurden die Pausen etwas größer, das Erbrechen wiederholte sich, und die Anfälle nahmen nach und nach die Gestalt des Weitzanzes an, wobei die Pausen wieder verschwanden. Endlich wurden die Bewegungen gelinder, ein bedeutender Schweiß und Schlaf trat ein, und am andern Morgen war bis auf ein leises, allgemeines Zittern und einige gastrische Erscheinungen Alles wieder gut. Die Zufälle bei den anderen beiden Knaben waren ganz dieselben, nur minder heftig, Erbrechen und Schweiß folgten schneller. Sie sagten, die Wurzel (von welcher sie noch Proben in der Tasche hatten,) habe süßlich geschmeckt und es sei ihnen sogleich darnach schlecht zu Muth geworden. — In dem zweiten Falle hatte eine Frau Samen des Wilsenkrautes (*Hyoscyamus niger*) auf einen glühenden Plettbolzen gestreuet, und die Dämpfe durch einen Trichter in einen hohlen Zahn geleitet. Sie bekam gleich darauf Krämpfe in Arm und Bein der einen Seite, die aber bald wieder vergingen, und nur eine Zeit lang noch Schwäche in der Seite zurückließen. — Der letzte Fall bestand in einer Vergiftung durch Rauchen von Stechapfel-Blättern (*Datura Stramonium*), worüber aber die näheren Details fehlen. Daß die Samen unter dem Namen Stechkörner als Volksmittel gegen Seitenstechen (Pleurésie) angewendet werden,<sup>1</sup> ist schon erwähnt worden. „Mehrere

1. Von einem noch tolleren Volksmittel, welches in der Gegend von Neubrandenburg einmal gegen eben diese Krankheit angewendet war, erzählte mir J. Schulz, der Verfasser der Flora Starg., aus



Leute (schreibt G. Brückner,) haben mir gestanden, dies gethan zu haben. Sie hatten die ganzen Körner übergeschluckt, ich erinnere mich aber keines Falles böser Folgen." Einen solchen beobachtete aber sowohl Hr. Dr. Betke zu Rumpshagen, wo eine Frau nach sehr reichlichem Genuß der frischgepflückten Stechkörner schwer erkrankte, als auch Herr Dr. S. Scheven in seinem Malchiner Physikatskreise. Auch zu Goldberg sollen vor mehreren Jahren sich Kinder durch diesen Samen vergiftet haben. — Den traurigsten Ausgang aber hatte eine Vergiftung, über welche mir im J. 1849 E. Huth, damals Rector in Krakow, berichtete. Im April des Jahres 1849 wurde Dr. Lorenz in Krakow (weiland Mitglied unseres Vereins † 1851) nach dem Dorfe Babelin im Ante Goldberg gerufen, wo sich drei Kinder vergiftet hatten. Zwei derselben (von 6 und 4 Jahren) waren bei seiner Ankunft schon todt, ein größeres Mädchen lag mit geschwellenem Gesichte in Krämpfen. Diese Kinder hatten am vorausgehenden Abende von einer im Garten beim Graben herausgeworfenen Wurzel geessen, welche nun auch noch angebissen vorgefunden wurde und sich als die Wurzel von *Cynoglossum officinale* ergeben haben soll. Dieser Fall wäre um so wichtiger, weil die giftigen Eigenschaften dieser Pflanze, wenn auch wohl schon vermuthet, doch bis jetzt noch so wenig erwiesen gewesen sind, daß Hr. Dr. Weidner in seiner Dissertation über die mecklenburgischen phanerogamischen Gifte seiner eigenen Praxis. Nach dem Grundsatz daß Stechen durch Stechen vertrieben werden müßte (*similia similibus!*), war dem Kranken zerstoßenes Glas eingegeben worden! Natürlich war er unter furchtbaren Schmerzen gestorben. Einen ähnlichen Fall erlebte Hr. Dr. Betke.

pflanzen (1856) ihr gar nicht einmal eine Stelle unter denselben eingeräumt hat. Die von ihm als giftige Pflanzen unserer Flora bezeichneten Arten sind nämlich folgende:

*Thalictrum flavum*, alle Arten der Gattungen *Anemone* und *Ranunculus*, *Aquilegia vulgaris*, *Delphinium Consolida*, *Aconitum Napellus*, *Actaea spicata*, *Chelidonium majus*, *Viola odorata*, *canina*, *tricolor*, *Drosera* (alle 3 Arten), *Impatiens Noli tangere*, *Evonymus europaeus*, beide Arten von *Rhamnus*, *Sarothamnus scoparius*, *Bryonia alba*, *Sedum acre*, *Hydrocotyle vulgaris*, *Cicuta virosa*, *Apium graveolens*, *Berula angustifolia*, *Sium latifolium*, *Oenanthe fistulosa* und *Phellandrium*, *Aethusa Cynapium*, *Anthriscus sylvestris*, *Chaerophyllum temulum*, *Conium maculatum*, *Hedera Helix*, beide Arten von *Lonicera*, *Eupatorium cannabinum*, *Senecio vulgaris*, *Lactuca virosa* und *Scariola*, *Ledum palustre*, *Cynanchum Vincetoxicum*, *Solanum* (alle Arten), *Atropa Belladonna*, *Hyoseyamus niger*, *Datura Stramonium*, *Gratiola officinalis*, *Digitalis grandiflora*, *Pedicularis* (alle Arten), *Anagallis arvensis*, (*Daphne Mezereum*), *Aristolochia Clematidis*, *Euphorbia* und *Mercurialis* (alle Arten), *Myrica Gale*, *Alisma* (alle Arten), *Arum maculatum*, *Calla palustris*, (*Leucojum vernum* und *aestivum*), *Paris quadrifolia*, *Convallaria* (alle Arten), *Lolium temulentum*.

Auch noch eine andere, von Dr. W. übergangene Pflanze hätte wohl wenigstens ein Warnungszeichen verdient, nämlich *Asperula odorata*, der Möhsch oder Waldmeister. Obgleich nämlich der Extract dieser Pflanze, der ja bekanntlich dem Maitränk seinen Wohlgeschmack verleiht, ganz unschädlich ist, so soll doch der Duft des Krautes, wo es in etwas größerer Menge in Schlafzimmern aufbewahrt wird, die übelsten Zufälle, ja selbst den Tod herbeiführen können. Hierauf ist in Mecklenburg um so mehr aufmerksam zu machen, da es hier vielfältig Gebrauch ist Möhsch-Kränze oder Sträuße wochenlang in den Zimmern aufzubewahren.

Unverantwortlicher Weise sind diesen einheimischen schädlichen Pflanzen noch zwei sehr gefährliche ausländische, hinzugefügt worden, deren eine schon durch Berührung ihrer Blätter entzündliche Geschwülste hervorruft, nämlich der als Zierstrauch angepflanzte Sumach (*Rhus Toxicodendron*), den man an mehreren Stellen des Ludwigs-Luster Schloßgartens antrifft, und der dort schon mehrfach Kindern, die sich durch seine glänzend grünen Blätter anlocken ließen, Nachtheil gebracht hat. Im dortigen Prinzengarten ist dies Gesträuch wieder ausgerottet, seit ein junges Mädchen, die sich beim Versteckspielen darin verborgen hatte, davon eine allgemeine Gesichtsröthe bekam, die besonders die Augen afficirte und diesen eine Jahre lang anhaltende krankhafte Empfindlichkeit zu Wege brachte. — Die andere, nicht selten in Gärten gezogene Pflanze ist die Tollkirsche (*Atropa Belladonna*), deren Beeren schon mehrfach Unheil in Mecklenburg angerichtet haben.

Aus der Abtheilung der Kryptogamen bietet nur allein die Classe der Pilze giftige Arten dar. Aber während im mittleren und südlichen Deutschland, wo Pilze mit zu den wichtigeren Nahrungsmitteln der ärmeren Volksclassen gehören, durch Verwechslung unschädlicher mit schädlichen Arten, Vergiftungen durch dieselben gar nicht selten vorkommen, ist mir aus Mecklenburg, wo nur Morcheln und Champignons als Delicatsse gegessen werden, nur ein einziger Fall (durch G. Brückner) bekannt, in welchem eine Dame, die vielleicht in anderen Gegenden Deutschlands den Steinpilz (*Boletus edulis*) kennen und essen gelernt hatte, diesen auch hier in Mecklenburg genießen wollte, statt dessen aber eine andere, giftige Art (welche

es gewesen, ist nicht bekannt,) verspeisete, worauf sie ein allgemeines Zittern bekam; schwarzer Kaffee und Citronensaft brachten aber bald ein heilsames Erbrechen zu Wege. — Für sehr giftig gelten die schönen, rothen Fliegenpilze. In Betreff derselben schreibt mir G. Brückner: „Als im Beginne dieses Jahrhunderts der Erbprinzessin Helene Paulowna erste Entbindung erwartet wurde, lag hier in Ludwigslust ein russischer Feldjäger schon mehrere Wochen auf der Lauer, um dem Kaiser Paul die erste Nachricht zu bringen. Eines Tages brachte der Russe seiner Wirthin ein Tuch voller Fliegenpilze, ließ sie nach seiner Vorschrift bereiten, und — trotz aller Protestationen aß er mit gutem Appetit davon. Die Wirkung war eine compleite Cholera, während deren der Kanonendonner die Geburt unseres nachmaligen Großherzogs Paul verkündete. Todtfrank wurde der Russe auf einen Wagen auf Stroh gebettet und kam gesund in Petersburg an. *Relata refero.*“<sup>1</sup>

Kurz, als das Endresultat meiner vielen Nachfragen bei unseren Aerzten stellt es sich heraus, daß Vergiftungs-

---

1. Weiter gegen Osten wird ein noch viel sonderbarer Gebrauch von diesem Pilze gemacht. Denn von den Koriäken erzählt Langsdorf: „*Coriaecorum gens, in ora Asiae septentrioni opposita, potum sibi excogitavit ex succo inebriante Agarici muscarii. Qui succus (aeque ut Asparagorum,) vel per humanum corpus transfusus, temulentiam nihilominus facit. Quare gens misera et inops, quo rarius mentis sit suae, propriam urinam bibit identidem: continuoque mingens rursusque hauriens eundem succum, pauculis Agaricis producere in diem quintum temulentiam potest.*“ — Sollte der Fliegenpilz in einem kälteren Klima vielleicht weniger giftig werden, wie man ähnliche Wahrnehmungen hinsichtlich der Umänderung von Pflanzenäften durch klimatische Einwirkung schon mehrfach gemacht hat?



fälle durch einheimische Pflanzen hier zu Lande so selten sind, daß der durch sie herbeigeführte Schaden wohl kaum den zehnten Theil von dem erreicht, den der Blitz hier am Menschenleben durchschnittlich anrichtet!

## VII. Die Geschichte unserer Flora.

Ich beginne diesen Abschnitt mit einer chronologisch geordneten kurzen Uebersicht der gesammten mir bekamten auf die mecklenburgische Flora bezüglichen Literatur, welche, wie ich glaube, auf Vollständigkeit Anspruch machen darf. Ausführlicher sind die Titel der einzelnen Schriften und Abhandlungen nachher bei der alphabetisch geordneten Zusammenstellung der Autoren angegeben worden. Die nicht selbstständigen, sondern in Zeit- oder Gesellschaftsschriften u. s. w. erschienenen Abhandlungen sind durch einen \* bezeichnet.

1777 Schulz L. enumeratio etc.

\* 1780—94 verschiedene mycolog. Abhandlungen von Tode.

1788 Timm J. Prodrumus etc.

1790—91 Tode H. Fungi Meclenb. etc.

1791 Becker H. Beschreibung der Bäume und Sträucher u. s. w.

\* Timm J. erster Nachtrag zum Prodr.

\* 1792 Tode über Phallus caninus.

\* 1793 Tode H. Antwortschreiben an Florke.

\* 1795 Timm J. zweiter Nachtrag.

Link. H. dissert. botan.

\* 1797 Detharding botan. Bemerkungen.

\* Timm, Auszug u. s. w.

1803 Brückner A. F. Prodrumus Florae Neobrandb.

1803—6 Crome Sammlung u. s. w.

1804—8 Blandow D. Sammlung meßb. Laubmoose.

1805 Becker H. Beschreibung u. s. w. 2. Aufl.

1806 Schultz C. Prodrumus Fl. Starg.

- \* v. Rämpf phys. Beschreibung des Amtes Mirow.
- \* Kleinere bot. Mittheil. von Ditmar, Thebe, Siemssen, Link, v. Rämpf, Blandow und Crome in den Verhandl. d. meckb. naturf. Gesell. (in d. Müll. Beitr.)
- \* 1808 desgl. von Detharding, Link, Thebe, Blandow, Ditmar und Siemssen.  
Bredow tabell. Uebersicht u. s. w.
- \* 1809 Kleinere bot. Mit. (Fortsetzung) von Ditmar.  
\* Link observationes etc. I.  
\* Detharding Beitr. 3. meckb. Flora.  
Detharding Verzeichniß einer Sammlung u. s. w.  
Blandow Uebersicht der meckb. Moose.
- \* 1810 Kleinere bot. Mit. (Fortsetzung) von Detharding, Ditmar und Link.  
Link Mscr. der meckb. Flora.
- \* 1811 Kleinere bot. Mit. (Schluß) von Detharding, Ditmar, Link und Siemssen.  
Bredow ökonom. technische Flora u. s. w.
- \* 1813 Link observationes etc. II.
- \* 1817 Ditmar, Sturm's Flora Abth. III. erstes Bändchen (meckb. Pilze.)  
Brückner A. Nachtrag zu Schultz Prodromus (inedit!).
- 1819 Schultz suppl. 1.
- \* 1823 Schultz de Barbula et Syntrichia.
- \* 1824 Schultz in d. Sylloge Ratisbon.  
\* Brückner G. in Ofens Isis.
- 1828 Detharding Conspectus etc.  
Flörke de Cladoniis.  
\* Schultz in der Sylloge Ratisbon.
- 1825 Link de antiquitatibus bot. Rostoch.
- \* 1836 Meyer Pflanzen um Schwerin.
- 1837 Prahl Flora Gustrov.  
Schultz sup. 2 Mscr.
- \* 1839 Griewank C. seltneere Pflanzen Mecklbg.
- 1840 Köper Uebersicht der Gräser Mecklbg.

- 1841 Langmann Flora u. s. w.  
 \* Brückner G. Pflanzengeographie.
- 1843 Röper zur Flora Mecklbg. I. Farne.
- 1844 Röper z. Fl. Mecklbg. II. Gräser.  
 Brinkmann Sammlung meckl. Gräser.  
 Fiedler Synopsis Hypnearum.  
 Fiedler Synopsis der Laubmoose Mecklbg.  
 Fiedler Sammlung von meckl. Laubmoosen.
- \* 1846 Röper Nachträge und Berichtigungen u. s. w.
- \* 1847 Griewank C. seltene Pflanzen des Rügiger Orts (Archiv).  
 Drewes J. Nachtrag zu Prahl's Index.
- \* 1848 Boll E. Seestrands- und Salinenflora (Archiv).  
 1848 ff. Fiedler Sammlung getrockneter Pilze.
- \* 1849 Boll Flora von M.-Strelitz (Archiv).
- \* 1850 Betcke Monographie der meckl. Brombeersträucher (Archiv).  
 \* Langmann Nachtrag zur Flora (Archiv).  
 \* Boll Nachtrag zur Flora I. (Archiv).  
 \* Röper Beitr. z. meckl. Flora.  
 Wülfnei Sammlung getrockneter Lebermoose.
- \* 1851 Griewank C. über *Lepturus incurvatus* (Archiv).  
 \* Boll Nachtrag II. (Archiv).  
 \* Betcke Bemerkungen über einige meckl. Pflanzen (Archiv).
- \* 1852 Willebrand über die Flora der Burgwälle (Archiv).  
 \* Brockmüller Beitr. z. Kenntniß der Haideflora (Archiv).
- \* 1853 Schreiber Flora von Grabow und Ludwigslust (Archiv).  
 \* Brockmüller Nachtrag (Archiv).  
 \* Wülfnei Pflanzen auf den Salzwiesen von Sülden (Archiv).
- \* 1854 Wülfnei meckl. Lebermoose (Archiv).  
 \* Griewank C. Nachtrag z. d. Pfl. des Rügiger Orts (Archiv).  
 \* Griewank C. über *Senecio nemorensis* (Archiv).  
 Wülfnei Flora der Umgegend von Schwerin.
- \* 1855 Fiedler Uebersicht der meckl. Pilze I. (Archiv).  
 † Brockmüller deux Verbascum etc.
- 1856 Langmann Flora von Nord- und Mitteldeutschland.  
 Griewank G. Kritische Studien u. s. w.

## Weidner meßb. Giftpflanzen.

\* 1857 Boll merkwürdige Bäume in M. (Archiv).

\* 1858 Fiedler Uebersicht u. s. w. II. (Archiv).

Von allen diesen Schriften habe ich nur einige in fremden Gesellschaftsschriften verstreute kleinere Abhandlungen von Tode und Link's Schrift aus dem J. 1835 nicht gesehen und folglich auch nicht benutzen können, auf die daher bei einer etwaigen Berichtigung meiner nachfolgenden Ausgaben besonders Rücksicht zu nehmen wäre.

Aus diesen literarischen Quellen habe ich nun zunächst den speciellen Antheil, welcher jedem unserer Botaniker hinsichtlich der Bereicherung unserer Landesflora durch die Entdeckung neuer Arten gebührt, zu ermitteln versucht, und das Resultat kurz unter den in alphabetischer Reihe geordneten Namen der Botaniker zusammengestellt, wobei zugleich einige Notizen über ihre persönlichen Verhältnisse und eine Aufzählung ihrer auf unsere Flora bezüglichen Schriften gegeben sind. — Sodann habe ich das Entdeckungsjahr jeder einzelnen Species festzustellen gesucht, und als solches dasjenige angenommen, in welchem sie zuerst die Aufmerksamkeit der meklenburgischen Botaniker erregt hat, gleich viel, ob man sie sogleich richtig als neue Species erkannt, oder nur als Varietät betrachtet hat. In der nachfolgenden Uebersicht der Flora habe ich hinter dem Namen jeder Art in Klammern das Entdeckungsjahr, so wie den abgekürzten Namen des Entdeckers hinzugefügt; aus der Jahreszahl wird man die von mir benutzte literarische Quelle leicht herausfinden können. Ich glaubte, daß dies nicht ohne Interesse sein würde, weil man dadurch einen sehr klaren Ueberblick über die allmähliche Entfaltung der Kunde von unserer Flora gewinnt.



Gelegentliche Erwähnung einzelner mecklenburgischer Pflanzen bei älteren der vor-linneischen Periode angehörig- gen Botanikern, wie z. B. der *Ruppia rostellata* bei Bur- baum, der *Myrica Gale* bei Backmeister (1623), des *Atri- plex litorale var. marinum* bei Rudbeck, *Teucrium Scor- dium* bei Simon Pauli u. s. w., haben in dieser geschicht- lichen Darlegung unberücksichtigt bleiben müssen. Eine wirklich im inneren Zusammenhange fortlaufende Geschichte der botanischen Bestrebungen in unserm Vaterlande nimmt erst mit dem Jahre 1777 ihren Anfang,<sup>1</sup> und von dieser Jahreszahl bin ich daher auch ausgegangen.

Um nun aber bei den nachfolgenden Erörterungen ein für alle Mal die unerquicklichen Prioritätsstreit- tigkeiten erfolgreich abzuschneiden, bin ich dem bekannten Gesetze, welches in derartigen Fällen über das Eigen- thumsrecht entscheidet, strenge gefolgt, nämlich dem, daß ich die Entdeckung demjenigen zugeschrieben habe, von wel- chem, oder unter dessen Namen dieselbe zuerst durch Druck- schriften veröffentlicht worden ist. Nur zu Gunsten der beiden unter den J. 1810 und 1837 erwähnten Hand- schriften von Link und F. Schultz habe ich eine Ausnahme

---

1. Die älteste Flora der Mark Brandenburg (von Elsholz) wurde schon im J. 1663 veröffentlicht, und eine Flora Berolinensis (von Ludolf) erschien schon 1746. Auch in dem benachbarten Vor- pommern ist man uns darin zuvorgekommen, denn Wille's Flora Gryphica erschien 1764, ein Nachtrag dazu von Köpin und Weigels Flora Pomerano-Rugica 1769, nebst einem Nachtrage 1773. — Wille stammte aus Schweden und war ein Schüler Linnæ's; er starb 1791 als Prediger zu Altenkirchen auf Wittow. — Die erste hols- tein'sche Specialflora (von Weber) stammt aber erst aus dem J. 1780.

machen zu müssen geglaubt, indem ich sie ebenso, wie die Druckschriften, als normirend betrachtet habe, weil jene beiden Arbeiten von vielen unserer Botaniker schon längst gekannt und auch benutzt worden sind. Außerdem habe ich auch noch in einigen wenigen Fällen das Entdeckungsjahr um etwas zurückdatirt, auf Mittheilungen gestützt, welche mir die Entdecker selbst darüber gemacht haben; diese Fälle habe ich durch ein hinter die Jahreszahl gesetztes Ausrufungszeichen kenntlich gemacht, und ebenso auch die ganz neuen Entdeckungen, deren hier zum ersten Male Erwähnung geschieht. — Durch jenen Modus, die gedruckten Quellen als maßgebend zu betrachten, hoffe ich das *suum cuique* soviel als möglich gewahrt zu haben. Sollten dabei aber irgendwie die Rechte eines Entdeckers gekränkt sein, so kann ich mich wenigstens von jeder Absichtlichkeit dabei freisprechen. Der Knoten konnte nur auf die von mir befolgte Weise gelöst werden, denn da manche Pflanzen vor ihrer Veröffentlichung durch den Druck schon Jahre lang vielen einheimischen Botanikern (wie Herbarien und handschriftliche Notizen ausweisen,) als Bürger der Flora bekannt waren, — wohin hätte es wohl führen sollen, wenn ich noch über die gedruckten Quellen hätte zurückgehen wollen?

Was nun die einzelnen Mitarbeiter an dem Aufbau unserer Landesflora und deren Antheil an der Arbeit betrifft, so sind ihrer folgende:

Ackermann F. L. F., früher Seminarlehrer und bis 1851 Seminardirector in Ludwigslust, jetzt Prediger zu Brudersdorf unweit Dargun, bereicherte unsere Flora durch Entdeckung der schönen *Anemone vernalis* (und *Viola uliginosa*).

\* Arndt C. 1. geb. in Neubrandenburg, Privatlehrer in Quoten, entdeckte die erratiche *Centaurea Calcitrapa*.

Becker H. F. Forstinspector zu Rövershagen (+), gab heraus: Beschreibung der Bäume und Sträucher, welche in Mecklenburg wild wachsen (Drost 1791. 8.; 2. vermehrte Aufl. 1805). — Verzeichniß der Pflanzen, welche sich auf dem h. Damme bei Doberan finden, in seiner „topographischen Beschreibung des h. Dammes“ (Schwerin 1792). — Er entdeckte an neuen mecklenb. Pflanzen: *Ulex europaeus*, *Hippophaë rhamnoides* und *Salix cinerea*.

\* Betcke Dr. E. F., geb. in Neustadt, widmete sich anfänglich der Pharmacie und conditionirte eine Zeit lang in Ludwigslust, studirte dann Medicin. Als practischer Arzt ließ er sich zuerst in Malchin nieder, wo er die Umgegend (öfters gemeinschaftlich mit F. Timm und Detharding) botanisch durchforschte, und siedelte sich dann im J. 1830 nach Penzlin über. Er schrieb: *Animadversiones bot. in Valerianellas* (Diss. inaug. Rost. 1826. 4to). — Monographische Beschreibung der Brombeersträucher Mecklenburgs (Archiv IV. S. 73 ff. 1850). — Bemerkungen und Berichtigungen über einige mecklenburgische Pflanzen (Archiv V. S. 209 ff. 1851). — An neuen Pflanzen entdeckte er: *Rubus vulgaris*, *Radula* und *horridus*, (so wie die *Subspecies villicaulis*, *suberectus*, *affinis*, *discolor* und *thyrseiflorus*), *Agrimonia odorata*, *Valerianella Auricula*, *Hieracium Rothianum* und *praealtum*, *Stachys annua*; auch die Bastarde *Salix viminalis-Caprea*, *Cirsium hybridum* und *oleraceo-acaule* hat er aufgefunden. — Nach ihm belegte De Candolle eine neue zu den Valerianeen gehörige Pflanzengattung mit dem Namen *Betckea*. — Bei der vorliegenden Arbeit unterstützte B. mich auf das freundlichste durch Mittheilung von Pflanzen, Büchern und handschriftlichen Notizen, die von Detharding und Link aufgezeichnet waren, so wie durch Angabe vieler neuer Standorte seltener Pflanzen unserer Flora, namentlich aus der Umgegend von Penzlin.

1. Die Namen derjenigen Botaniker, welche noch gegenwärtig Mitglieder unseres Vereins sind, habe ich durch einen Stern, die gestorbenen oder ausgetretenen durch einen eingeklammerten Stern bezeichnet.

\* Beuthe, geb. in Neustrelitz, früher Pharmaceut und als solcher in Braunschweig conditionirend, jetzt Bauschreiber in Neustrelitz, lieferte Beiträge zu Schultz Prodrromus sup. 2 (1837) und zu meinem Nachtrage zur Flora Mecklenburgs (Archiv IV. S. 151 ff. 1850). Die von ihm entdeckten neuen Pflanzen sind: *Arabis arenosa*, *Utricularia intermedia*, (*Polygonum mite*), *Setaria verticillata*, *Arundo varia*, *Chara fragilis*.

Blandow D. C. conditionirte als Pharmaceut in Neubrandenburg, Malchin und Waren und starb am letzteren Orte, wo er auch das Amt eines Notarius bekleidete, im J. 1810. Er war ein tüchtiger Kenner der Laubmoose und gab eine Sammlung mecklenburgischer Laubmoose in 5 Lieferungen (1804 bis 1808) und eine Uebersicht der mecklenburgischen Moose im J. 1809 heraus. Einige andere botanische Mittheilungen von ihm finden sich in den Müll. Beitr. zu den Strel. Anz. 1806, 46 und 1808, 50. Auch an Sturms deutscher Flora hat er mitgearbeitet. Ein von ihm gefertigtes Moosbuch mit eingeklebten Exemplaren befindet sich in meinem Besitz. — Willdenow legte einer neuen Laubmoosgattung den Namen Blandowia bei.

Seine neuen Beiträge zur Landesflora sind: *Geranium sanguineum*, *Corrigiola litoralis*, *Seseli annuum*, *Gentiana Pneumonanthe*, *Orobanche coerulea*, *Eriophorum alpinum*, und an Laubmoosen: *Sphagnum squarrosum*, *Physcomitrium fasciculare*, *Barbula fallax*, *Trichostomum rigidulum*, *pallidum*, *Hymenostomum microstomum*, *Dieranum cerviculatum*, *longifolium*, *Schraderi*, *Mnium stygium*, *serratum*, *rostratum*, *affine*, *Bryum lacustre*, *inclinatum*, *latifolium*, *Warneum*, *elongatum*, *pallens*, *atropurpureum*, *Amblyodon dealbatus*, *Bartramia marchica*, *Orthotrichum obtusifolium*, *pumilum*, *diaphanum*, *Leskea paludosa*, *polycarpa*, *Polytrichum strictum*, *Hypnum exiguum*, *Blandowii*, *Starkii*, *incurvatum*, *populeum*, *megapolitanum*, *cordifolium*, *stramineum*, *Stockesii*, *commutatum*, *palustre*, *Fissidens osmundoides*.

Bleichschmidt, über dessen Lebensverhältnisse mir weiter nichts bekannt ist, als daß er vor etwa dreißig Jahren in Neustrelitz als Pharmaceut conditionirte, lieferte Schultz zu seinem 2. Nachtrage *Corallorrhiza innata* als neuen Beitrag zur mecklenb. Flora.



\* Boll E. schrieb im Archiv Folgendes über die Landesflora: Die Seestrand- und Salinenflora der deutschen Ostseeländer (1848 II. S. 67 ff.). Flora von M. Strelitz nebst Beiträgen zur gesammten meklb. Flora (1849. III. S. 5 ff.). Nachtrag zur Flora Mecklenburgs (1850. IV. S. 151 ff.). Zweiter Nachtrag (1851. V. S. 163 ff.). — Neue Beiträge zur Flora lieferte er nur: (*Polygala comosa*, *Elsholtzia Patrini*), *Potamogeton mucronatus* und einige wenige zwar schon lange bekannte, aber noch nicht einregistrirte Pilze.

\* Brinkmann D. F. L. Handlungsgärtner in Rostock, gab 1844? eine Sammlung meklb. Gräser (erstes Hundert, — ob nicht mehr erschienen?) heraus.

Brockmann J. A. F. jetzt Prebiger zu Profesen, entdeckte als Hauslehrer zu Ludwigslust in bortiger Gegend *Iris sibirica*.

\* Brockmüller H. früher Lehrer in Grabow, jetzt in Wölfschendorf bei Mehna, schrieb: Beitrag zur Kenntniß der Haideflora des südwestlichen Mecklenburg (1852. Archiv VI. S. 100 ff.); Nachtrag dazu (1853. Archiv VII. S. 255 ff.). *Deux Verbascum hybrides de la flore mecklembourgeoise* (in den Archives de la Flore de France et d'Allemagne 1855). Er entdeckte den Bastard *Anemone ranunculoidi-nemorosa*.

Brückner A. F. L. Dr. med. und Hofrath, wurde geb. am 29. Nov. 1744 zu Ruhblank in M. Strelitz und starb am 21. April 1823 als practischer Arzt zu Neubrandenburg. Als eiferiger Botaniker hatte er auf seinen vielfachen Berufsreisen Gelegenheit die Flora unseres Landes gründlich zu durchforschen, beschränkte sich aber keineswegs auf dies Gebiet, sondern brachte durch die Verbindungen, in denen er mit vielen ausländischen Botanikern stand, ein für jene Zeit ansehnliches Herbarium von etwa 8000 Arten zusammen. Dasselbe befindet sich, — da Brückner mein Großvater mütterlicher Seits war, — in meinem Besitz, und enthält unter anderen viele Alpenpflanzen (von Hoppe und Schleicher gesammelt), Pflanzen aus Italien (dort bei einjährigem Aufenthalt durch G. Brückner und E. v. Dertzen gesammelt), aus Süd-Frankreich (von Salzmann), Spanien (von Hecht), Ungarn, so wie aus den botanischen Gärten zu Berlin, Göttingen, Greifswald, Halle, Würzburg u. s. w. — Als botanischer

Schriftsteller ist er zwar selbst nicht aufgetreten, wie aber seine die heimische Flora betreffenden Forschungen dennoch nicht verloren gingen, werden wir sogleich zu erfahren Gelegenheit haben.

Brückner A. F. Dr. med. geb. den 22. Nov. 1781 zu Neubrandenburg und gest. ebendasselbst am 25. Mai 1818, der älteste Sohn des vorhergehenden, veröffentlichte seine und des Vaters botanische Entdeckungen in dem *Prodromus Florae Neobrandenburgensis*, Jenae 1803. Später schrieb er noch ein *Florae Stargardiensis Supplementum* (Gryphiae 1817), von welchem aber nur der erste Bogen, die Nachträge bis zur Decandria umfassend, gedruckt, jedoch nicht im Buchhandel erschienen ist. — Diese letzte Arbeit ist in so fern von Interesse, als darin die ersten Spuren pflanzengeographischer Bestrebungen in Mecklenburg auftauchen, indem er in der Vorrede M. Strelitz ganz richtig in zwei botanische Gebiete eintheilt und die charakteristischen Pflanzen derselben angiebt. Von ihm wurde also der Faden zuerst angeknüpft, den erst 24 Jahre später der jüngere Bruder so erfolgreich weiter spann.

Die neuen Beiträge zur Landesflora, welche in den beiden angeführten Schriften enthalten sind, und von denen die meisten dem Vater zufallen, sind: *Ranunculus polyanthemos*, *Cardamine Impatiens*, *hirsuta*, *Viola hirta*, *Spergula pentandra*, *Hypericum tetrapterum*, *Trifolium medium*, *Oxalis corniculata*, *Laserpitium pruthenicum*, *Gentiana Amarella*, *Verbascum Lychnitis*, *Veronica longifolia*, *Mentha sylvestris*, *Stachys germanica* *Atriplex roseum*, *Betula pubescens*, *humilis*, *Sparganium ramosum*, *Panicum sanguinale*, *Setaria viridis*, *Brachypodium sylvaticum*, *Lolium arvense*, *Lycopodium inundatum*, *Polystichum Oreopteris*, *Hypnum rusci-folium*.

\* Brückner G. A. Dr. med. und Geh. Medicinalrath, geb. am 18. Dec. 1789 zu Neubrandenburg, zweiter Sohn des A. F. L. Br., seit 1814 praktischer Arzt in Ludwigslust. Von seinen Schriften beziehen sich nur zwei auf unsere Flora: Ueber den Stand der Botanik in Mecklenburg (in *Dfens Isis* 1824 Beil. 3). — Abriß der Pflanzengeographie Mecklenburgs (1841 als Anhang zu Langmanns Flora von Mecklenburg). — An neuen Pflanzen entdeckte er: *Lepidium*

sativum, *Scutellaria hastifolia*, *Centaurea phrygia*, *Trematodon ambiguus*, *Hydrodictyum utriculatum*, *Furzellaria lumbricalis*, *Rhodomela subfusca*, *Fucus serratus*, *Boletus edulis* und *Hydnum coralloides*. Welche dankenswerthe Hilfe er mir in Betreff der vorliegenden Arbeit gewährt hat, erhellet aus den vorausgehenden Abschnitten (vergl. S. 42. 54. 60. 66. 97. 135 ff.).

\* Brückner H. Dr. med. in Schwerin, geboren zu Ludwigslust, ältester Sohn des letztgenannten, entdeckte *Zeora vitellina*, *Biatora ferruginea*, *sphaeroides*, *Agaricus odoratus*, *stercorarius*, *Cantharellus cinereus*, *Hydnum Erinaceus*, *Corticium aureum*, *Helvella crispa*, *Peziza Marsupium*.

Crome G. E. W. lebte bis Michaelis 1806 als Pharmaceut in Schwerin, ging dann nach Göttingen und starb (wann?) als Professor in Mägelin. Er gab eine „Sammlung deutscher Laubmoose“ heraus, von welcher die erste Lieferung zu Schwerin 1803 und die letzte (2. Nachlieferung) 1806 erschien; alle darin enthaltenen Arten sind in der Umgegend von Schwerin gesammelt. Einige andere botanische Mittheilungen von ihm finden sich in den Mühl. Beitr. zu den Strel. Anz. 1806, 46. 1808, 50. Es existirte früher auch eine handschriftliche Flora Suerinensis von ihm auf der Großherzoglichen Bibliothek zu Ludwigslust, die aber jetzt verschollen ist. Im J. 1831 hatte Detharding sie von dort entliehen, und schrieb darüber an Betcke: „es sind hübsche Sachen darin, Wredow hat das M. S. trefflich genutzt, es enthält aber noch viele Goldkörner und bemerkt viele Standorte.“ — Seine neuen Entdeckungen sind: *Viola mirabilis*, *Villarsia nymphaeoides*, *Cicendia filiformis*, *Heleocharis ovata*, *Scirpus fluitans*, *Sphagnum cuspidatum*, *Funaria hibernica*, *Bryum turbinatum*, *Hypnum piliferum*, *salebrosum*, *sylvaticum*, *brevirostre*.

\* Danneel D. geb. in Deterow, studierte die Jurisprudenz, wendete sich dann der Landwirthschaft zu, und ist jetzt Senator in Deterow. Ihm fällt die Entdeckung von *Anacamptis pyramidalis* (und *Nonnea pulla*) zu.

Detharding G. G. Dr. med. geb. zu Rostock den 22. Juni 1765 und gest. ebendort im J. 1838. Er veröffentlichte: Botanische Bemerkungen als Beitrag zur meklenb. Flora (in der Monatschrift

von und für Meckbg. 1797 S. 288 ff.). Beiträge zur mecklenb. Flora, — in den Rostock. gemeinnützigen Aufsätzen 1809 (auch abgedruckt in den Mitgl. Beitr. zu den Strel. Anzeigen 1809 St. 50. 51; vergl. auch noch ebenda 1808, 50 und 1811, 7). Verzeichniß einer Sammlung von getrockneten meckbg. Gewächsen (Rostock 1809). *Conspectus plantarum Magniducatum Megapol. phanerogamarum* (Rost. 1828). Zu dieser letzteren Arbeit lieferten ihm viele Botaniker Beiträge; da er aber bei den einzelnen neuen Species die ersten Entdecker nicht immer namhaft macht, so werde ich diese Arten als von ihm selbst gefunden aufführen müssen, wodurch sein Antheil an den neuen Entdeckungen größer ausfällt, als er es in Wirklichkeit gewesen ist. Von ihm werden nämlich als mecklenburgische Pflanzen zuerst genannt: (*Ranunculus nemorosus*), *Erysimum hieracifolium*, *Cochlearia danica*, (*Camelina dentata*, *Diploaxis tenuifolia*), *Viola canina*, *Sagina maritima*, *apetala*, *Malva rotundifolia*, *Althaea officinalis*, *Fragaria elatior*, *Sanguisorba officinalis*, *Caucalis daucoides*, *Valerianella dentata*, *Inula salicina*, *Senecio erucaefolius*, *Thrinicia hirta*, *Hypochaeris glabra*, *Tragopogon major*, *Cuscuta Epilinum*, *Myosotis sylvatica*, *versicolor*, *Veronica Buxbaumii*, *Rhinanthus minor*, *Primula elatior*, (*Statice maritima*), *Rumex sanguineus*, *Euphorbia exigua*, *Najas major*, *Gagea lutea*, *Juncus balticus*, *filiformis*, (*alpinus*), *Scirpus rufus*, *Carex chordorrhiza*, *teretiuscula*, *paradoxa*, *brizoides*, *Panicum filiforme*, *Bromus erectus*, (*Triticum strictum*), *Ahnfeltia plicata*, *Hypoglossum alatum*, *Laminaria saccharina*, *Chara aspera*, *horridula*. — Als D. im J. 1829 zum Mitglied der botanischen Gesellschaft in Regensburg ernannt war, beabsichtigte er in deren Schriften einen Nachtrag zu dem *Conspectus* zu veröffentlichen. Dies scheint aber unterblieben zu sein, wenigstens habe ich keine Spur desselben auffinden können. Manche botanische Notiz aber habe ich noch aus mehreren Briefen Dethardings geschöpft, welche theils an Betcke, theils an G. Brückner gerichtet waren, und die mir von diesen beiden freundlichst zur Benutzung mitgetheilt worden sind. Auch mit Mertens in Bremen und mit L. Reichenbach in Dresden stand D. in regem botanischen Verkehr; er sammelte für die von letzterem herausgegebene *Flora exsiccata*, und in Reichen-



bach's Iconographie sind mehrere von D. gelieferte mecklenburgische Pflanzen abgebildet. — Nach ihm trägt die Pflanzengattung *Dethardingia* N. ab Esenb. = *Reinwardtia* Spr. (zu den *Convosbulaceen* gehörig) den Namen. Ueber sein mecklenburgisches Herbarium, welches sich im Besitze des Moskauer Museums befindet, vergl. das *Freimüthl. Abendblatt* Nr. 58.

Ditmar L. P. F. Dr. jur. Justizrath und Syndicus in Moskau, wirkte an der dritten Abtheilung von J. Sturms Flora von Deutschland mit. Er hat das erste Bändchen (oder Heft 1 bis 4, Nürnberg 1817) derselben bearbeitet, welches auf 64 trefflichen Kupfertafeln eben so viele mecklenburgische Pilz-Arten, und darunter sehr viele neue Species, enthält; auch die Tafeln zu Linz's *Observationes etc.* 1809 hat er gezeichnet. Außerdem gab er noch Mittheilungen über Pilze in den *Müßl. Beitr. zu den Strel. Anzeigen* J. 1805 St. 8. 20. 31. 46. J. 1808 St. 50. J. 1809 St. 8 J. 1810 St. 8, und über mecklenb. Algen ebendasselbst J. 1805 St. 20 und J. 1803 St. 50. — Seine für die Landesflora neuen Entdeckungen sind *Polygonum lapathifolium*, *Diatoma tenue*, *Tabellaria flocculosa*, *Calothrix distorta*, *Draparnaldia glomerata*, *Conferva floccosa*, *Spirogyra elongata*, *condensata*, *nitida*, *Zygnema cruciatum*, *Vaucheria bursata*, *hamata*, *geminata*, so wie 97 Pilzarten. — Sprengel benannte die zur Fam. der *Onagreen* gehörige Gattung *Ditmaria* nach ihm, die aber später mit der Gattung *Erisma* Rudge wieder zusammengezogen ist.

\* Drewes J. Lehrer an der Realschule in Güstrow, schrieb einen Nachtrag zu Prahl's *Index etc.* 1847 als Schulprogramm. Er erwähnt zuerst die wahrscheinlich nur eingeschleppte *Linaria arvensis*.

Ehrenberg C. G. Professor in Berlin, untersuchte Schlamm aus dem Wismarschen Hafen, und machte daraus in den Monatsberichten der Berliner Akademie 1840 und 41 folgende neue Diatomeen bekannt: *Surirella hamella*, *Testudo*; *Synedra Gallionii*; *Ceratonöis Fasciola*, *Closterium*; *Navicula gibba*, *Scalprum*, *Hippocampus*, *inversa*; *Cocconema Boeckii*; *Syncycelia Salpa*; *Campylodiscus Remora*, *Echnöis*; *Cocconöis undulata*, *Navicula*; *Dietyocha Fibula*. — Da ich Ehrenberg's

Arbeit nur aus den Citaten bei Rützing und Rabenhorst kenne, so kann ich für die Vollständigkeit der vorstehenden Angaben nicht bürgen.

\* Fiedler B. C. Fr. Dr. med. früher Assistenzarzt auf dem Sachsenberge, jetzt Amtsarzt in Dömitz. Sein Lieblingsstudium sind die Laubmoose und Pilze, über welche er Folgendes veröffentlicht hat: Synopsis Hypnearum Megapol., Rost. 1844. — Synopsis der Laubmoose Mecklenburgs, Rostock 1844. — Drei Lieferungen getrockneter meßb. Laubmoose 1844 ff. — Beiträge zur meßbg. Pilzflora 1848 ff. (4 Liefer. getrockneter Pilze). — Uebersicht der Pilze Mecklenburgs in Archiv IX. S. 12 ff. und XII. S. 48 ff. (noch unvollendet). Fiedler lieferte auch viele neue Beiträge zu unserer Pilzflora in Klotzschii Herbarium vivum mycologicum, curante L. Rabenhorst ed. 1. (20 Centur.) und ed. 2 (1855 ff. bis jetzt 8 Cent.), so wie auch zu den Fungis europ. 1 Cent.). Die darin vorkommenden mecklenburgischen Arten hat er theils selbst schon in der vorhin citirten Abhandlung unseres Archivs namhaft gemacht, die übrigen aber mir handschriftlich mitgetheilt, wodurch unsere Pilzflora abermals eine namhafte, dankenswerthe Bereicherung erfahren hat. Als Entdeckungsjahr aller dieser Fiedlerschen Arten habe ich dasjenige angesetzt, in welchem sie in und für Mecklenburg zuerst publicirt worden sind. — Seine sehr zahlreichen neuen Entdeckungen gehören alle den Kryptogamen an. Es sind: *Phascum curvicollum*; *Barbula gracilis*, *latifolia*; *Dicranum crispum*; *Bryum cernuum*; *Orthotrichum Ludwigii*, *fallax*, *tenellum*, *fastigiatum*, *speciosum*, *coarctatum*, *crispulum*, *stramineum*, *Lyellii*; *Cinclidotus fontinaloides*; *Hypnum glareosum*, *confertum*, *Schleicheri*; *Fissidens incurvus*; *Saprolegnia ferax*; *Palmella cruenta*; *Nitella gracilis*, *mucronata*, *syncarpa*, *tenuissima*; *Chara scoparia*, nebst 360! Pilzarten. — Ihm zu Ehren trägt die Laubmoosgattung *Fiedleria* den Namen, so wie auch *Sporocadus Fiedleri* Rab. und *Sporotrichum Fiedleri* Rab.

Fleischer, über den mir weiter nichts bekannt, entdeckte, wie Rabenhorst angiebt, den Pilz *Agaricus chrysenterus* in Mecklenburg.

Förcke H. G. Dr. geb. den 24. Dec. 1764 zu Alten Kalben und gest. als Professor der Botanik in Rostock am 6. Nov. 1835. Ueber seine Lebensverhältnisse habe ich in Archiv X. S. 90 ff. aus-

fährlicher berichtet. Von seinen Arbeiten bezieht sich nur die *Commentatio de Cladoniis* (Rost. 1828) auf unsere Flora. Förbes neue Entdeckungen sind: (*Lepidium latifolium*, *Geum intermedium*,) *Primula farinosa*, *Ulmus effusa*, *Poa sudetica*, *Phascum Floerkeanum*, *Peltigera malacea*, *Cladonia papillaria*, *caespiticia*, *decorticata*, *incrassata*, *cervicornis*, *degenerans*, *pyxidata*, *ochrochlora*, *pityrea*, *Floerkeana*, *deformis*, *uncinata*, *squamosa*, *glauca*, *pungens*, *Arbuseula*, *stellata*. — Nach ihm trägt auch die Gattung *Floerkea* Muehlbg. (zu den *Hydrocharideen* gehörig) den Namen. Seine große Flechtensammlung besitzt die Klosterveranstaltung.

v. Flotow J. ausgezeichnete Flechtenologe, gest. 1858 als Major a. D. zu Hirschberg in Schlessen, sammelte (wahrscheinlich auf einer Babereise nach Doberau,) folgende für unsere Flora neue Algen: *Anabaina flos aquae*, *Physactis durissima*, *Rivularia pygmaea*. Sie sind publicirt in *Ritzing Deutschlands Algen*, Nordhausen 1845.

(\*) Gerbes J. F. früher Rector in Ludwigslust, jetzt in Schwerin, entdeckte *Muscari botryoides*.

Giesebrecht Ad. früher Seminardirector in Mirow und gest. 1856 in Königsberg, entdeckte zuerst die *Polygala amara* und *Ajuga pyramidalis* bei Mirow.

\* Griewank C. geb. zu Conow unweit Ludwigslust, war an letzterem Orte 1820–24 Collaborator und 1824–29 Inspector am Landeschullehrer-Seminar, wurde im J. 1829 Prediger zu Daffow und 1856 Präpositus des Klützer Cirkels. Er schrieb: *Zur Pflanzenkunde Mecklenburgs* (in *Freimüth. Abbl.* 1839. Beil. zu Nr. 1084); *Verzeichniß der im Klützer Ort vorkommenden seltneren Pflanzen Mecklenburgs* (1847, *Archiv* I. S. 18 ff. vergl. auch die *Botan. Zeitg.* 1847, S. 449–455); über *Lepturus incurvatus* Trin. auf dem *Privat* (1851, *Archiv* V. S. 159 ff.); *Nachtrag zu den Pflanzen des Klützer Orts* (1854, *Archiv* VIII. S. 178 ff.); über *Senecio nemorensis* und *saracenicus* (1854, *ebendas.* S. 185). — An neuen Pflanzen entdeckte er: *Barbarea* (*arcuata*), *stricta*, *praecox*; *Cochlearia Linnaei* (*offic.* und *anglica*); *Malva moschata*, *Hypericum hirsutum*, *Rubus rudis*, *Potentilla sterilis*, *Cnidium venosum*, *Senecio nemorensis*, *Cuscuta monogyna*, (*Veronica opaca*, *Euphrasia verna*),

*Mentha nepetoides*), *Leonurus Marrubiastrum*, *Salix acutifolia*, *Ruppia maritima*, (*Zannichellia pedicellata*), *Orchis laxiflora*, *Carex strigosa*, *Hornschuchiana*, *Gaudinia fragilis*, *Lepturus incurvatus*, *Himantalia lorea*. — Meine vorliegende Arbeit hat er auf das dankenswertheste dadurch unterstützt, daß er mir für den phanerogamischen Theil der nachfolgenden Floren-Uebersicht aus dem reichen Schatze seiner Beobachtungen zahlreiche interessante Bemerkungen mitgetheilt hat.

Oriewank G. Dr. med. Sohn des Letztgenannten, Assistenzarzt auf dem Sachsenberge, schrieb: *Kritische Studien zur Flora Mecklenburgs*, Rostock 1856, als Inaugural-Dissertation.

\* Häcker N. Provisor in Lübeck und Verfasser der *Flora von Lübeck*, entdeckte in Meckbg. *Hypnum undulatum* und *silesiacum* (s. Rabenhorst deutsch. Kryptog.-Flora).

Hahn E. Dr. phil. früher Subrector in Güstrow, gest. vor etwa fünf und zwanzig Jahren als Rector in Friedland, entdeckte im südwestlichen M. *Hypericum pulchrum*, *Eryngium campestre* und *Euphorbia Esula*; (s. Nützl. Beitr. zu den Strel. Anzeigen 1809 St. 8).

(\*) Guth E. früher Privatlehrer in Ludwigslust, dann Rector in Krahow und endlich Prediger in Gneien, wo er am 28. Aug. 1859 an der Cholera starb, entdeckte *Lunularia vulgaris*, *Ectocarpus ochraceus*, *Nemalion multifidum*, *Phyllophora membranifolia*, *Brodiaei*, *Polysiphonia allochroa*, *Phycodrys sinuosa*, *Stilephora rhizoides*, *Laminaria digitata*.

Rahle, Apotheker in Hagenow, entdeckte *Conferva sericea* als neuen Beitrag zur Flora.

v. Kamptz G. E. geb. am 19. Mai 1763 zu Kl. Plassen und gest. am 13. Aug. 1823 als Oberhauptmann in Mirow, über welchen ich in Archiv VIII. S. 148 schon etwas ausführlicher berichtet habe, bereicherte die Landesflora durch Entdeckung von *Astragalus arenarius*, *Linnaea borealis*, (*Anagallis coerulea*), *Blechnum Spicant* und *Depazea Linnaeae*. Vergl. Nützl. Beitr. zu den Strel. Anz. 1806 St. 37 und 46. — Nach ihm (?) benannte C. G. Nees v. Esenbeck eine Myrtaccengattung *Kamptzia*, die aber hernach in der



Gattung *Syncarpia* Ten. wieder aufgegangen ist (C. G. Nees ab Esenbeck de *Kamptzia*, novo *Myrtacearum* genere, Bonn ap. Weber 1841).

\* Knochenhauer W. in den J. 1833 und 34 Subrector in Neubrandenburg, dann einige Jahre Lehrer in Neustrelitz, und jetzt Director der Realschule in Meiningen, war der erste Finder von *Potentilla supina*.

\* Koch F. Salinenbeamter in Sülz entdeckte zuerst die *Viola epipsila*.

\* Koch F. (Bruder des vorigen), Baumeister, früher in Lübtzhen und Dömitz, jetzt in Dargun, fand zuerst den *Agaricus tigrinus*.

Landt, früher in Mirow, war der Entdecker der *Utricularia neglecta* (und des *Erodium moschatum*).

\* Langmann J. Lehrer an der Realschule in Neustrelitz, schrieb: *Flora der beiden Großherzogthümer Mecklenburg, Neustrelitz* 1841. Nachtrag dazu im Archiv 1850, IV. S. 145 ff. — *Flora von Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Berücksichtigung der beiden Großherzogthümer Mecklbg., Neustrelitz* 1856. Er nennt zuerst (*Cerastium brachypetalum*, *Galeopsis pubescens*, *Hieracium vulgatum*, *Koeleria glauca*), *Melilotus officinalis* und *Potamogeton densus*.

\* Lehmyer, Hofgärtner in Schwerin, ist der Entdecker des *Agaricus cepaestipes*.

Einl. H. F. Dr. in den J. 1792 bis 1811 Professor in Rostock, gest. am 1. Jan. 1851 als Prof. in Berlin, über dessen Leben ich schon in Archiv V. S. 217 ff. ausführlichere Notizen gegeben habe. Unter seinen zahlreichen Schriften enthalten folgende auf unsere Flora Bezügliches: *Dissert. bot. et primitiae Florae Rostochiensis*, Suerin 1795. 4., worin auch eine Anzahl von Kryptogamen aufgeführt ist, deren Entwässerung mir aber nicht überall hat gelingen wollen. — Ferner: *Observationes in Ordines plantarum naturales*, dissert. I und II in dem Magazin der Gesell. naturf. Freunde in Berlin 1809 und 1813, Pilze enthaltend, von denen die in der noch zu Rostock geschriebenen disser. I. erwähnten fast sämmtlich zu den mecklenburgischen gehören. Unbekannt ist mir leider seine Gratulationschrift zum

50jährigen Doctorjubiläum des Prof. J. W. Josephi zu Rostock gehalten, welche den Titel führt de antiquitatibus botanicis Rostochiensibus (Berlin 1835. 1 Bog. 4.). — Kleinere Mittheilungen von ihm sind abgedruckt in den Müll. Beitr. u. s. w. 1806, 20. 31. 46. 1808, 50. 1810, 8. 1811, 7. — Außerdem existirt von ihm noch handschriftlich eine „Uebersicht der mecklb. Flora,“ von welcher sich ein von Detharding an Dr. Betcke mitgetheiltes Auszug in unserer Vereinsbibliothek befindet. Es werden darin nur die Dicotyledonen (721 Arten) aufgezählt, da die weitere Arbeit wahrscheinlich durch Links Weggang von Rostock unterbrochen wurde; verfaßt ist sie nach dem Aug. 1810, da die Beobachtungen, welche Link in jenem Monate auf einer Excursion nach Rastenburg machte, darin schon benutzt sind. Sie enthält einige interessante kritische Bemerkungen, und ist nach dem natürlichen Systeme geordnet, — der erste derartige Versuch in Mecklenburg. Die Pflanzen, durch welche Link unsere Landesflora bereicherte, sind: *Ranunculus hederaceus*, *divaricatus*, *fluitans*, *rep-tans*, (*Cardamine sylvatica*), *Sinapis alba*, *Elatine Hydropiper* und *Alsinastrum*, *Genista anglica*, *Trifolium striatum*, *filiforme*, *Vicia cassubica*, *Callitriche autumnalis*, *Sedum boloniense*, *Galium saxatile*, *Gnaphalium luteo-album*, *Sonchus palustris*, *Crepis virens*, *Campanula Rapunculus*, *Pyrola chloranta*, *Erythraea linariaefolia*, *ramosissima*, *Myosotis intermedia*, *Lamium maculatum*, *Obione pedunculata*, *Taxus baccata*, *Allium oleraceum*, *Juncus maritimus*, *Carex riparia*, *Glyceria maritima*, *Triticum caninum*. — *Cylindrospermum spirale*, *Oscillaria viridis*, *princeps*, *Sphaeroplea annulina*, *Oedogonium vesicatum*, *tumidulum*, *Conferva fracta*, *laetevirens*, *Spirogyra quinina*, *decimina*, *Zygnema ericetorum*, *Vaucheria Dillwynii*, *Ceramium rubrum*, *Polysiphonia violacea*, *Sphaerococcus confervoides*, so wie an Pilzen 92 Arten. — Nach ihm trägt die zur Familie der Nostochinae gehörige Gattung *Linkia* Lyngb. den Namen.

Meyer C. F. früher Rector in Ludwigslust, später Schulrath in Schwerin, gest. 1850?, machte im J. 1836 in No. 910 und 918 des Freimüth. Abendbl. ein Verzeichniß seltener Pflanzen aus der Umgegend von Schwerin bekannt. Er war der Entdecker von (*Viola*

laetea), *Cucubalus baccifer*, *Orobanche rubens*, *Polycnemum arvense* und *Epipogon aphyllum*.

Neuendorf H. in Rostock, über dessen Lebensverhältnisse mir nichts weiter bekannt ist, als daß er mit Detharding in enger botanischer Verbindung stand, entdeckte *Calamagrostis Halleriana* und *Carex Davalliana*.

\* Nolte C. F. Dr. Professor der Botanik in Kiel, und Verfasser der *Novitiae Florae Holsaticae*, durchstreifte Mecklenburg auf mehreren Excursionen in den J. 1820—23, worüber er in der Vorrede zu seinen *Novitiis* berichtet, und entdeckte an neuen Pflanzen *Helosciadium repens*, *Carduus acanthoides* und *Lobelia Dortmanna*.

v. Dergen C. Landrath auf Brunn unweit Neu-Brandenburg, gest. 1837, früher ein sehr eifriger Botaniker, bis dies Studium bei ihm gegen das der Lepidopterologie mehr in den Hintergrund trat, entdeckte zuerst die *Ophrys muscifera*.

Prahl J. F. geboren im Lauenburgischen, früher Lehrer in Gilstrow und jetzt Prediger zu Hohen-Horn im Herzogthum Lauenburg, schrieb 1837 einen *Index plantarum quae circa Güstroviam sponte nascuntur Phanerogamarum* (Gilstrow bei Ditz), worin zum ersten Male als Bürger unserer Flora auftraten: *Rubus glandulosus*, *Potentilla verna*, *Orchis incarnata*, *Leersia oryzoides*, *Festuca sylvatica*, *Elymus europaeus*; (auch *Solanum humile*, *Centaurea solstitialis*, *Alopecurus nigricans* und *Avena flavescens* werden hier zum ersten Male erwähnt).

Rabenhorst L. Dr. Prof. in Dresden, erwähnt 1845 in seiner *Kryptogamenflora Deutschlands* an neuen mecklenb. Pflanzen, deren Entdecker er jedoch nicht namhaft macht: *Bacillaria paradoxa*, *Suriella thermalis* und *Aegagropila Linnaei*.

Ramelow, Pharmaceut, entdeckte im J. 1845 (wie G. Griewant angiebt,) *Myriophyllum alterniflorum*.

Richter, Sanitätsrath in Boizenburg, ist der Entdecker des *Chrysosplenium oppositifolium* (und der *Anemone pratensis* var. *viridiflora*).

Röper J. früher Prof. in Basel, seit 1838 Prof. der Botanik in Rostock, schrieb: *Uebersicht der Gräser Mecklenburgs* 1840. 4to

(auch im mecklenb. Quart-Kalender 1841 und 42 abgedruckt). — Zur Flora Mecklenburgs I. Theil (die Farne, Rostock 1843. 8vo. II. Theil (die Gräser) 1844. — Nachträge und Berichtigungen zur mecklb. Flora, in der bot. Zeitung 1846 S. 161 ff. — Beitr. zur mecklenbg. Flora, im Tageblatt der XXVII. Versammlung deut. Naturforscher u. s. w. 1850 S. 50. — Beitr. zur Naturgeschichte der Ophioglosseae, in der botanischen Zeitung 1859 No. 1, 2. 28 — 31. 37. — Seine neuen Entdeckungen sind: *Gagea minima*, *Scirpus parvulus*, *Carex extensa*, (*Arundo littorea*), *Equisetum Telmateja*, *Botrychium matricariaefolium* und *simplex*, *Aspidium aculeatum*; (vergl. auch *Fumaria micrantha*, *Sclerochloa procumbens*, *Festuca loliacea*, *Triticum glaucum* und *Lolium italicum*). — Nach ihm trägt die zur Familie der Sapindaceen gehörige Gattung *Roepera* Juss. fil. ihren Namen.

Rose (mir unbekannt) entdeckte (wie Ravenhorst angiebt,) *Merisopoedia glauca*.

(\*) Schmidt A. Plantagen-Director in Ludwigslust, entdeckte *Oenothera muricata*, *Senecio paludosus*, *Petasites tomentosus*, (*Helianthus tuberosus*), *Jurinea cyanoides*, *Digitalis ambigua*, *Mentha Pulegium*, *Allium acutangulum* und *Bromus inermis*. — Er veröffentlichte: „Bemerkungen auf einer Reise nach St. Petersburg besonders in Hinsicht der Landwirthschaft und Gartenkunde“, — in den Neuen Annalen der mecklb. Landwirth. Gesell. St. 39 — 43. 1814.

v Schreiber, weiland Prof. in Bützow, entdeckte *Helosciadium repens*.

(\*) Schreiber H. Apotheker in Grabow, gest. 1853, schrieb: Flora der Umgegend von Grabow und Ludwigslust, im Archiv VII. S. 200 ff. J. 1853; darin wird *Polemonium coeruleum* zuerst als einheimische Pflanze erwähnt.

Schultz C. F. Dr. med. und Hofrath, geb. 1765 zu Stargard, widmete sich anfänglich der Pharmacie, studirte darauf Medicin, lebte dann und starb als practischer Arzt in Neubrandenburg am 27. Juni 1837. — Er war nicht bloß ein sehr gelehrter Arzt, sondern auch ein tüchtiger Botaniker, der besonders das Studium der Laub- und Lebermoose eifrig betrieb. In seinen letzten Lebensjahren beschäftigte er



sich auch mit astronomischen Forschungen. Nachdem er 10 Jahre lang auf seinen ärztlichen Reisen W. Strelitz nach vielen Richtungen hin botanisch erforscht hatte, gab er im J. 1803 seinen *Prodromus Florae Stargardiensis* heraus, in welchem 779 Phanerogamen und 721 Kryptogamen beschrieben werden, wodurch die gesammte mecklenburgische Flora, die damals schon 1241 Arten zählte, abermals einen neuen Zuwachs von etwa 300 Species erhielt, von denen 221 allein auf die Klasse der Pilze kamen. Diesem *Prodromus* folgte im J. 1819 noch ein *Supplementum primum*, — das *Sup. secundum*, dessen Ausarbeitung für den schon schwer erkrankten Verfasser der Prof. Dr. A. Grisebach in Göttingen übernahm, wurde nicht mehr gedruckt, weil Schulz bald nach Vollendung des Manuscripts (von welchem ich eine Abschrift besitze,) aus diesem Leben abberufen wurde. — Andere, nicht speciell auf Mecklenburg bezügliche botanische Schriften von ihm sind: de *Barbula et Syntrichia* (1823 in den *Actis acad. Caes. Leopold* vol. XI. pars 1); eine Abhandlung über *Barbula* in der *Sylloge Ratisbon.* 1824 vol. I. p. 34 ff. und bryologische Beobachtungen ebendasselbst 1828 Bd. II. S. 119 ff. 177 ff.

Schulz stand mit vielen berühmten Botanikern in Verbindung und Tauschverkehr; auch bezog er jährlich Sämereien aus dem botanischen Garten in Berlin, von denen er die im Freien ausdauernden selbst im Garten cultivirte, diejenigen aber, welche mehr Wärme beanspruchten, seinem Freunde, dem Prediger Hennings in Eichhorst übergab, der sich mit der Zucht von Treibhauspflanzen beschäftigte. Auf diese Weise brachte er ein sehr ansehnliches Herbarium von etwa 20,000 Arten zusammen, von denen aber sein mecklenburgisches Herbarium, die Belege zu seinem *Prodromus* enthaltend, streng getrennt blieb. Diese beiden Herbarien kamen durch seine testamentarische Verfügung an die Rostocker Universität, seine werthvolle Bibliothek wurde in öffentlicher Auction um Spottpreise verschleudert. — Seine Verdienste um die Botanik wurden dadurch geehrt, daß er von mehreren gelehrten Gesellschaften zum Mitgliede erwählt wurde, und daß C. Sprengel die Umbelliferengattung *Schultzia* nach ihm benannte; auch die *Jungermannia Schultzii* trägt seinen Namen. — Mich selbst knüpfte ein näheres Interesse an den Dahingeshiedenen, indem er,

nebst G. Brückner und W. Knochenhauer, zuerst in mir die Liebe zur Botanik weckte und meine ersten Studien darin auch gelegentlich leitete.

Die Pflanzenarten, durch welche Schulz unsere Flora vermehrte, und unter denen manche von ihm überhaupt zuerst determinirte Species sich befinden, sind folgende: *Nasturtium palustre*, *Arabis hirsuta*, (*Viola persicifolia*), *Drosera intermedia*, *Alsine tenuifolia*, *Stellaria glauca*, *Rubus thyrsoides*, *fruticosus*, *Ceratophyllum submersum*, *Valerianella carinata*, *Scabiosa suaveolens*, (*Lappa tomentosa*), *Hieracium pratense*, *Campanula bononiensis*, *latifolia*, *Cervicaria*, *Myosotis (caespitosa)*, *stricta*, *sparsiflora*, *Verbascum Phlomoides*, (*Moenchii*, *collinum*, *Schottianum*, *Veronica polita*), *Orobanche ramosa*, (*Polygonum minus*, *Salix cuspidata*), *Potamogeton obtusifolius*, *filiformis*, *Ornithogalum nutans*, *Schoenus ferrugineus*, *Eriophorum gracile*, *Carex stellulata*, *canescens*, *stricta*, *pilulifera*, *ampullacea*, *paludosa*, *filiformis*, *Poa bulbosa*.

*Equisetum pratense*, *Asplenium Breynii*, septentrionale.— *Sphagnum subsecundum*, *Physcomitrium sphaericum*; *Phascum patens*, *bryoides*, *crispum*; *Pottia minutula*; *Barbula Hornschuchiana*, *brevicaulis*; *Trichostomum homomallum*; *Gymnostomum rutilans*; *Didymodon longirostris*, *capillaceus*; *Ceratodon cylindricus*; *Dicranum strumiferum*, *Schreberi*, *rufescens*, *subulatum*, *majus*; *Bryum strictum*, *intermedium*, *bimum*, *Duvalii*, *erythrocarpon*; *Meesia Albertini*, *tristicha*; *Bartramia ithyphylla*; *Grimmia trichophylla*; *Racomitrium ericoides*; *Orthotrichum cupulatum*, *affine*; *Eucalypta streptocarpa*; *Polytrichum angustatum*, *gracile*, *formosum*; *Fontinalis squamosa*; *Neckera pinnata*; *Leskea subtilis*; *Hypnum albicans*, *plumosum*, *trifarium*, *myosuroides*, *alopecurum*, *chrysophyllum*, *fluviale*, *uncinatum*, *lycopodioides*.

*Riccia natans*, *ciliata*, *Rebouillia hemisphaerica*; *Lejeunia serpyllifolia*; *Mastigobryum trilobatum*; *Chiloseyphus polyanthos*, *palescens*; *Lophoclea heterophylla*; *Sphagnocoetis communis*; *Jungermannia setacea*, *connivens*, *divaricata*, *barbata*, *excisa*, *inflata*, *Schultzii*, *exsecta*; *Scapania nemorosa*, *uliginosa*, *undulata*; *Alicularia scalaris*; *Sarcoseyphus Ehrharti*.

*Microcoleus autumnalis*; *Chara latifolia*.

*Verrucaria epidermidis, carpinea, punctiformis*; *Pertusaria Wulfenii*; *Opegrapha herpetica, atra, varia*; *Urceolaria cinerea, seruposa*; *Placodium lentigerum, saxicola, elegans, murorum*; *Zeora brunnea, glaucoma, icmadophila, cerina*; *Lecanora atra, sophodes, varia, albella, Hageni*; *Imbricaria tiliacea, physodes, Acetabulum*; *Parmelia obscura, caesia*; *Sticta scrobiculata*; *Peltigera polydactyla*; *Calycium chlorellum; hyperellum*; *Lecidea citrinella, albo-atra, dolosa, parasema*; *Biatora uliginosa, microphylla, anomala, rubella, rosella, byssoides*; *Cladonia delicata, cariosa, botrytes, alcornis, gracilis, fimbriata, macilenta, furcata*; *Cetraria saepincola*; *Evernia furfuracea*; *Ramalina pollinaria*. — Die Classe der Pilze vermehrte er durch 221 neue Arten.

Schulz L. E. F. Dr. med. wurde etwa um das J. 1754 zu Friedland geboren, studierte Medicin zu Frankfurt an d. Ober, ließ sich dann als practischer Arzt in seiner Vaterstadt nieder, wo er, wahrscheinlich noch vor Ablauf des vorigen Jahrhunderts, — die näheren Data über seine Lebensverhältnisse fehlen mir, — gestorben ist. Als Inaugural-Dissertation schrieb er im J. 1777 eine kleine Abhandlung „de singularibus quibusdam morborum curationibus,“ worin er als solche merkwürdige Curmethoden bespricht: 1. die Heilung mancher Krankheiten durch Musik, 2. durch Musik und Tanz, 3. durch Electricität und Magnetismus, und 4. endlich, durch Ohrfeigen und Stockprügel, — die allerdings in manchen Fällen gar nicht übel angebracht sein mögen! — Diese Dissertation würde schwerlich der Vergessenheit entgangen sein, wenn sie nicht auf den letzten acht Seiten noch einen Anhang enthielte, welcher die Ueberschrift führt: „Enumeratio systematica stirpium per ducatum Megapolitano-Strelitziensem observatarum,“ denn durch diesen so bescheiden auftretenden Anhang ist Schulz der Begründer der wissenschaftlichen Botanik in Mecklenburg geworden. Hier begegnen wir nämlich nicht allein zum ersten Male den Linne'schen Pflanzennamen und dessen Systeme in Mecklenburg, sondern es ist dies überhaupt auch der erste Versuch eine Uebersicht der vaterländischen Flora herzustellen. Das Jahr 1777 ist also das Geburtsjahr unserer mecklenburgischen Flora! Leider giebt

Schulz keine Standorte an, sondern nur die Namen von 483 Pflanzenarten, nach dem Sexualsystem geordnet; 435 Species gehören den Phanerogamen an, 48 den Kryptogamen. Sie sind mit wenigen Ausnahmen durch spätere Forschungen als Bürger unserer Strelitzischen Flora bestätigt worden, so daß aus dieser Arbeit sogleich eine brauchbare Grundlage von 444 Pflanzenarten für unsere Flora hervorzing.

Es sind dies nämlich folgende Species: *Anemone Hepatica*, *nemorosa*, *ranunculoides*; *Myosurus minimus*; *Ranunculus aquatilis*, *Flammula*, *Lingua*, *auricomus*, *repens*, *bulbosus*, *arvensis*, *secleratus*, *Ficaria*; *Caltha palustris*; *Trollius europaeus*; *Delphinium Consolida*; *Nymphaea alba*; *Nuphar luteum*; *Papaver Argemone*, *Rhoeas*, *dubium*; *Chelidonium majus*; *Fumaria officinalis*; *Nasturtium officinale*, *amphibium*; *Barbarea vulgaris*; *Turritis glabra*; *Cardamine pratensis*; *Sisymbrium officinale*, *Sophia*; *Alliaria officinalis*; *Sinapis arvensis*; *Alyssum incanum*; *Draba verna*; *Cochlearia Armoracia*; *Camelina sativa*; *Thlaspi arvense*; *Teesdalea nudicaulis*; *Capsella bursa pastoris*; *Raphanus Raphanistrum*; *Helianthemum vulgare*; *Viola palustris*, *odorata*, *sylvestris*, *tricolor*; *Reseda luteola*; *Drosera rotundifolia*, *anglica*; *Parnassia palustris*; *Polygala vulgaris*; *Dianthus deltoides*; *Saponaria officinalis*; *Silene inflata*, *nutans*; *Lychnis flos cuculi*; *Agrostemma Githago*; *Sagina procumbens*, *nodosa*; *Spergula arvensis*; *Spergularia rubra*; *Holosteum umbellatum*; *Stellaria nemorum*, *media*, *Holostea*, *graminea*; *Malachium aquaticum*; *Cerastium glomeratum*, *arvense*; *Linum catharticum*; *Malva sylvestris*, *neglecta*; *Tilia platyphyllos*; *Hypericum perforatum*, *humifusum*, *quadrangulum*; *Acer pseudo-platanus*; *Geranium pusillum*, *molle*, *Robertianum*; *Erodium cicutarium*; *Oxalis acetosella*; *Evonymus europaeus*; *Rhamnus cathartica*, *Frangula*; *Sarothamnus scoparius*; *Genista tinctoria*; *Ononis spinosa*; *Anthyllis Vulneraria*; *Medicago lupulina*; *Melilotus macrorrhiza*; *Trifolium pratense*, *arvense*, *repens*, *agrarium*; *Lotus corniculatus*; *Astragalus glycyphyllos*; *Ornithopus perpusillus*; *Vicia dumetorum*, *Cracca*; *Lathyrus pratensis*, *montanus*; *Prunus spinosa*, *Padus*; *Spiraea Ulmaria*, *Filipendula* *Geum urbanum*, *rivale*; *Rubus Idaeus*, *cae-*



sus; *Fragaria vesca*; *Agrimonia Eupatoria*; *Rosa canina*, *tomentosa*; *Comarum palustre*; *Potentilla anserina*, *argentea*, *reptans*, *Tormentilla*; *Crataegus Oxyacantha*; *Pyrus communis*, *Malus*; *Sorbus Aucuparia*; *Epilobium hirsutum*, *montanum*, *palustre*; *Circaea lutetiana*; *Myriophyllum spicatum*; *Hippuris vulgaris*; *Callitriche verna*; *Lythrum Salicaria*; *Bryonia alba*; *Herniaria glabra*; *Scleranthus annuus*; *Sedum acre*, *reflexum*; *Ribes nigrum*; *Saxifraga Hirculus*, *tridactylites*, *granulata*; *Chrysosplenium alternifolium*; *Hydrocotyle vulgare*; *Sanicula europaea*; *Cicuta virosa*; *Aegopodium Podagraria*; *Carum Carvi*; *Pimpinella Saxifraga*; *Sium latifolium*; *Oenanthe fistulosa*, *Phellandrium*; *Aethusa Cynapium*; *Angelica sylvestris*; *Thysselinum palustre*; *Heracleum Sphondylium*; *Daucus Carota*; *Anthriscus sylvestris*; *Conium maculatum*; *Hedera Helix*; *Viscum album*; *Sambucus nigra*; *Viburnum Opulus*; *Lonicera Periclymenum*, *Xylosteum*; *Asperula odorata*; *Galium Aparine*, *uliginosum*, *palustre*, *verum*; *Valeriana officinalis*, *dioica*; *Valerianella olitoria*; *Knautia arvensis*; *Succisa pratensis*; *Eupatorium cannabinum*; *Tussilago Farfara*; *Petasites officinalis*; *Bellis perennis*; *Erigeron acer*; *Solidago Virga aurea*; *Inula Helenium*; *Pulicaria vulgaris*; *Bidens tripartita*; *Filago germanica*, *arvensis*; *Gnaphalium sylvaticum*, *uliginosum*, *dioicum*; *Artemisia Absinthium*, *campestris*, *vulgaris*; *Tanacetum vulgare*; *Achillea Millefolium*; *Anthemis arvensis*; *Matricaria Chamomilla*; *Chrysanthemum Parthenium*, *segetum*; *Senecio palustris*, *vulgaris*; *Cirsium lanceolatum*, *palustre*, *acaule*, *oleraceum*, *arvense*; *Carduus crispus*; *Lappa vulgaris*, *Carlina vulgaris*, *Serratula tinctoria*, *Centaurea Cyanus*, *Scabiosa*; *Lampsana communis*; *Cichorium Intybus*; *Leontodon autumnalis*, *hastilis*; *Tragopogon pratensis*; *Hypochoeris radicata*; *Taraxacum officinale*; *Lactuca muralis*; *Sonchus oleraceus*, *arvensis*; *Hieracium Pilosella*, *murorum*; *Jasione montana*; *Campanula rotundifolia*, *patula*, *rapunculoides*, *Trachelium*, *glomerata*; *Vaccinium Myrtillus*, *uliginosum*, *Oxycoccus*; *Andromeda polifolia*; *Calluna vulgaris*; *Ledum palustre*; *Pyrola rotundifolia*; *Fraxinus excelsior*; *Cynanchum Vincetoxicum*; *Menyanthes trifoliata*; *Gentiana cam-*

pestrus; Erythraea Centaurium; Convolvulus sepium, arvensis; Cuscuta europaea; Asperugo procumbens; Cynoglossum officinale; Anchusa officinalis, arvensis; Symphytum officinale; Echium vulgare; Pulmonaria officinalis; Lithospermum officinale, arvense; Myosotis palustris; Solanum nigrum, Dulcamara; Hyoseyamus niger, Datura Stramonium; Verbascum Thapsus, nigrum; Scrophularia nodosa; Linaria vulgaris; Veronica Beccabunga, Chamaedrys, officinalis, serpyllifolia, arvensis, verna, triphyllus, agrestis, hederifolia; Melampyrum arvense, nemorosum, pratense; Pedicularis sylvatica, palustris; Rhinanthus major; Euphrasia officinalis; Odontites rubra; Lathraea Squamaria; Mentha aquatica, arvensis; Lycopus europaeus; Origanum vulgare; Thymus Serpyllum; Calamintha Acanthos; Clinopodium vulgare; Nepeta Cataria; Glechoma hederacea; Lamium amplexicaule, purpureum, album; Galeobdolon luteum; Galeopsis Ladanum, Tetrahit; Stachys sylvatica; Betonica officinalis; Marrubium vulgare; Ballota nigra; Leonurus Cardiaca; Scutellaria galericulata; Prunella vulgaris; Ajuga reptans, genevensis; Teucrium Scordium; Verbena officinalis; Pinguicula vulgaris; Utricularia vulgaris, minor; Lysimachia vulgaris, Nummularia; Anagallis arvensis; Primula officinalis; Hottonia palustris; Statice Armeria; Chenopodium album; Blitum bonus Henricus, rubrum; Atriplex angustifolium, latifolium; Rumex conglomeratus, crispus, aquaticus, Acetosella; Polygonum amphibium, Persicaria, aviculare, Convolvulus; Euphorbia helioscopia, palustris, Peplus; Mercurialis perennis; Urtica urens, dioica; Parietaria officinalis; Humulus Lupulus; Ulmus campestris; Fagus sylvatica; Quercus Robur; Corylus Avellana; Carpinus Betulus; Salix pentandra, fragilis, repens; Populus tremula; Betula alba; Alnus glutinosa; Juniperus communis; Pinus sylvestris; Stratiotes aloides; Hydrocharis Morsus ranae; Alisma Plantago; Sagittaria sagittifolia; Butomus umbellatus; Triglochin palustre; Potamogeton gramineus, crispus, pusillus; Lemna trisulca, minor; Typha latifolia; Sparganium simplex; Acorus Calamus; Orchis militaris, Morio, maculata, latifolia; Epipactis Helleborine, palustris; Nottia Nidus avis; Iris Pseud-Acorus; Paris quadrifolia; Convalla-

ria multiflora, majalis; Smilacina bifolia; Gagea pratensis; Juncus communis; articulatus, bufonius; Luzula pilosa, campestris; Heleocharis palustris; Scirpus caespitosus, sylvaticus; Eriophorum vaginatum, latifolium; Carex arenaria, vulpina, vulgaris, acuta, panicea; Panicum Crus galli; Phalaris arundinacea; Anthoxanthum odoratum; Alopecurus pratensis, geniculatus; Phleum pratense; Agrostis vulgaris, Spica venti; Milium effusum; Phragmites communis; Aira flexuosa; Holcus lanatus; Avena pratensis; Briza media; Glyceria fluitans, aquatica; Molinia coerulea, Dactylis glomerata; Cynosurus cristatus; Festuca ovina, elatior; Bromus secalinus, arvensis, tectorum; Triticum repens; Hordeum murinum; Lolium perenne, temulentum.

Equisetum arvense, sylvaticum, hiemale; Lycopodium clavatum; Botrychium Lunaria; Polypodium vulgare; Polystichum F. mas; Cystopteris fragilis; Asplenium F. femina, Ruta muraria; Pteris aquilina. — Sphagnum cymbifolium; Funaria hygrometrica; Barbula muralis, ruralis; Polytrichum commune; Leskea complanata, sericea; Dicranum scoparium; Bryum pyriforme; Hypnum tamariscinum, splendens. — Marchantia polymorpha, Radula complanata. — Morchella esculenta, Helvella lacunosa und Peziza leporina.

Außerdem führt Schulz noch 16 Flechten, 2 Algen und 3 Pilze auf, die sich nicht mehr gut enträthseln lassen. — Ausgeschlossen habe ich von dieser Aufzählung: Ligustrum vulgare, Sempervivum tectorum, Brassica campestris und nigra, Lactuca virosa und Populus alba, da ihnen das Bürgerrecht nicht gebührt. Ganz zu streichen sind: Primula elatior, Lysimachia nemorum, Laserpitium latifolium, Erica Tetralix, Rosa spinosa, Potentilla arvensis (?), Thalictrum flavum, Melampyrum sylvaticum und Lepidium ruderales, da sie in M. Strelitz nicht wachsen; was Rubus fruticosus sei, ist nicht mehr zu ermitteln, Sedum sexangulare gehört zu acre, und sein Ranunculus reptans zu Flammula.

\* Siemerling B. Dr. Apotheker zu Neubrandenburg, entdeckte den Polyporus nigricans.

Siemssen H. C. Dr. phil. geb. zu Altstrelitz den 2. Mai

1768, gest. als Privatdocent zu Klostoc am 17. Juni 1833, hat sich um mehrere Zweige der vaterländischen Naturkunde bleibende Verdienste erworben, worüber ich schon in Archiv X S. 110 ff. berichtet habe. In der Botanik aber sind seine Leistungen am wenigsten erheblich, indem sich dieselben nur auf einige Mittheilungen in den Mühl. Beiträgen u. s. w. (1806, 46. 1808, 50. 1811, 7) beschränken, so wie auf die Entdeckung folgender, früher in N. noch nicht beachteter Pflanzen: *Rubus saxatilis*, *Ribes alpinum*, *Artemisia maritima*, *Cuscuta Epithymum*, *Uredo Circaeae*, *Aecidium Sweertiae*, *Puccinia Acerum*, *Collarium nigrospermum*, *Sporotrichum vitellinum*.

\* *Strud C.* Lehrer in Dargun, entdeckte *Gümbelia crinita*.

*Lhede J. C.* geb. den 29. März 1764 zu Grabow, seit 1808 Lehrer und seit 1827 Schulrath in Parchim, gest. den 15. April 1831 (s. den Nekrolog im Freim. Abbl. Nr. 669), gab botanische Mittheilungen in den Mühl. Beitr. u. s. w. 1806, 8 und 20; 1808, 50, und bereicherte die Flora durch *Thlaspi campestre*, *Geranium pratense*, *Potentilla procumbens*, (*Alchemilla montana*, *Scandix Pecten*), *Senecio campestris*, *Antirrhinum Orontium*, *Linaria Elatine*, *Veronica montana*, *Galeopsis ochroleuca*, *Thesium montanum*, *Potamogeton praelongus*, *Cephalantera rubra*, *Liparis Loeselii*, *Gagea spathacea*, *Rhynchospora fusca*, *Polypodium Phegopteris*, *Zeora rubra*, *Lecidea abietina*, *Cetraria pinastri*, *Mitruha cucullata*, *Peziza Pteridis* (?), *Polystigma Pteridis*, *Sphaeria tessellata*, *Licea variabilis*.

*Timm J. Ch.* geb. am 7. Dec. 1734 in dem hinterpommerschen Städtchen Wangerin, widmete sich der Pharmacie, lernte in Anclam, conditionirte hernach dort, so wie auch in Bergen und Klostoc, und ward Martini 1760 Apotheker in Malchin, wo er hernach auch das Bürgermeisteramt bekleidete und im J. 1805 starb. Vorzüglich durch J. Hedwig angeregt und bei seinen Forschungen unterstützt, durchstreifte er auf zahlreichen Excursionen die schöne und fruchtbare Umgegend seines Wohnortes, und besuchte auch mehrere Male die Ostseeküste, um die Seestrands- und Meeresflora kennen zu lernen. Als ein sehr nützlicher Gehülfe bewies sich ihm auf diesen Streifereien der Tagelöhner Hafer, welcher, wie Timm in der Vorrede zu seinem



Prodromus erzählt, weder des Lesens noch des Schreibens kundig, dennoch eine solche practische Kenntniß der Pflanzen sich erwarb, daß er neue Arten, die ihm aufstießen, sogleich erkannte, und Timm ihm sogar die Auffindung mancher der kleinsten Kryptogamen verdankte. Was Timm auf diese Weise sammelte, machte er im J. 1788 durch seinen Prodromus Florae Megapolitanae bekannt. Trotz dieses allgemeineren Titels umfaßt derselbe jedoch nur den vorhin schon bezeichneten Theil des Schweriner Landes, nämlich das Gebiet des Malchiner und Cummerower Sees, und ein Stückchen der Seeküste. Er hatte sich bei der Ausarbeitung dieses Buches zum Gesetze gemacht, darin nur solche Pflanzen aufzunehmen, die er selbst in zuverlässig mecklenburgischen Exemplaren gesehen hatte, und deren Anzahl ziemlich groß war, denn er zählt in dem Prodromus 696 Phanerogamen und 404 Kryptogamen auf. In den J. 1791 und 95 gab er zu demselben noch zwei Nachträge, welche in Siemssens Magazin Bd. I, 202 ff. und II, 222 ff. abgedruckt sind. Ein Auszug eines botan. Briefes von ihm an Detharding steht in der Monatschrift von und für Mecklg. 1797 S. 32. Die Laubmoosgattung *Timmia* Hedw. trägt nach ihm den Namen. Sein Herbarium befindet sich im Besitz seines Enkels F. Timm.

Von allen unseren Botanikern hat Timm die meisten Arten, nämlich 644, aufgefunden. Seine neuen Entdeckungen sind nämlich folgende: *Thalietrum minus, flavum*; *Anemone pratensis*; *Ranunculus acris, lanuginosus, Philonotis*; *Aquilegia vulgaris*; *Actaea spicata*; *Nuphar pumilum*; *Corydalis cava, intermedia*; *Nasturtium sylvestre*; *Cardamine amara*; *Dentaria bulbifera*; *Arabis Thaliana*; *Erysimum cheiranthoides*; *Lepidium ruderales*; *Senebiera Coronopus*; *Neslea paniculata*; *Cakile maritima*; *Crambe maritima*; *Gypsophila muralis*; *Dianthus prolifer, Armeria, Carthusianorum, superbus*; *Silene Otites*; *Lychnis Viscaria*; *Melandrium album, rubrum*; *Honkenya peploides*; *Moehringia trinervia*; *Arenaria serpyllifolia*; *Stellaria uliginosa, crassifolia*; *Cerastium semidecandrum, triviale*; *Radiola linoides*; *Malva Alcea*; *Tilia ulmifolia*; *Hypericum montanum*; *Acer campestre, platanoides*; *Geranium palustre, dissectum, columbinum*; *Impatiens Noli tangere*; *Oxalis stricta*; *Genista pilosa, germanica*;

*Ononis repens*; *Medicago falcata*, *minima*; *Melilotus alba*; *Trifolium alpestre*, *fragiferum*, *montanum*, *hybridum*, *procumbens*; *Astragalus Cicer*; *Vicia tenuifolia*, *sepium*, *angustifolia*, *lathyroides*, *pisiformis*, *sylvatica*; *Ervum hirsutum*, *tetraspermum*; *Pisum maritimum*; *Lathyrus sylvestris*, *palustris*; *Orobus vernus*, *niger*; *Prunus insititia*, *avium*; *Fragaria collina*; *Potentilla opaca*; *Rosa rubiginosa*; *Alchemilla vulgaris*, *arvensis*; *Poterium Sanguisorba*; *Sorbus torminalis*; *Epilobium angustifolium*, *parviflorum*, *roseum*, *tetragonum*; *Oenothera biennis*; *Circaea alpina*; *Myriophyllum verticillatum*; *Ceratophyllum demersum*; *Peplis Portula*; *Montia fontana*; *Illecebrum verticillatum*; *Scleranthus perennis*; *Sedum Telephium*; *Ribes Grossularia*, *rubrum*; *Eryngium maritimum*; *Apium graveolens*; *Falcaria Rivini*; *Pimpinella magna*; *Berula angustifolia*; *Oenanthe Lachenalii*; *Seseli Libanotis*; *Selinum Carvifolia*; *Archangelica officinalis*; *Peucedanum Oreoselinum*; *Pastinaca sativa*; *Torylis Anthriscus*; *Anthriscus vulgaris*; *Chae-rophyllum temulum*, *bulbosum*; *Adoxa Moschatellina*; *Cornus sanguinea*; (*Sambucus Ebulus*); *Sherardia arvensis*; *Asperula arvensis*, *cynanchica*; *Galium boreale*, *Mollugo*, *sylvaticum*; *Dipsacus sylvestris*, *pilosus*; *Scabiosa Columbaria*; *Aster Tripolium*, *Erigeron canadensis*, *Inula britannica*; *Pulicaria dysenterica*; *Bidens cernua*; *Filago minima*; *Helichrysum arenarium*; *Achillea Ptarmica*; *Anthemis tinctoria*, *Cotula*; *Chrysanthemum Leucanthemum*, *inodorum*; *Arnica montana*; *Senecio viscosus*, *sylvaticus*, *Jacobaea*; *Carduus nutans*; *Onopordum Acanthium*; *Centaurea Jacea*, *maculosa*; *Arnoseris minima*; *Picris hieracioides*; *Scorzonera humilis*; *Achyrophorus maculatus*; *Chondrilla juncea*; *Lactuca Scariola*; *Crepis biennis*, *tectorum*, *paludosa*; *Hieracium Auricula*, *cy-mosum*, *boreale*, *umbellatum*; *Xanthium Strumarium*; *Phyteuma spicatum*; *Campanula persicifolia*; *Vaccinium Vitis Idaea*; *Erica Tetralix*; *Pyrola minor*, *secunda*, *uniflora*, *umbellata*; *Monotropa Hypopithys*; *Ilex Aquifolium*; *Vinca minor*; *Sweetia perennis*; *Gentiana cruciata*; *Echinosperrum Lappula*; *Myosotis hispida*; *Scrophularia aquatica*; *Gratiola officinalis*; *Linaria minor*; *Veronica Anagallis*, *scutellata*, *Teucrium*, *spicata*; *Limosella aquatica*; *Me-*

*Juncus* *crispus*; *Pedicularis* *Sceptrum*; *Orobanche* *arenaria*; *Salvia* *pratensis*; *Stachys* *palustris*, *arvensis*, *recta*; *Prunella* *grandiflora*; *Trientalis* *europaea*; *Lysimachia* *thyrsiflora*, *nemorum*; *Centunculus* *minimus*; *Samolus* *Valerandi*; *Glaux* *maritima*; *Statice* *Limonium*; *Litorella* *lacustris*; *Plantago* *major*, *media*, *lanceolata*, *maritima*, *Coronopus*; *Chenopodium* *maritima*; *Salsola* *Kali*; *Salicornia* *herbacea*; *Chenopodium* *hybridum*, *urbicum*, *murale*, *glaucum*, *polyspermum*, *Vulvaria*; *Atriplex* *litorale*; *Rumex* *maritimus*, *obtusifolius*, *Hydrolapathum*; *Polygonum* *Bistorta*, *Hydropiper*, *dumetorum*; *Aristolochia* *Clematitis*; *Empetrum* *nigrum*; *Euphorbia* *Cyparissias*; *Mercurialis* *annua*; *Quercus* *sessiliflora*; *Salix* *alba*, *triandra*, *viminalis*, *purpurea*, *Caprea*, *aurita*; *Populus* *nigra*; *Myrica* *Gale*; *Alisma* *parnassifolium*, *natans*, *ranunculoides*; *Scheuchzeria* *palustris*; *Triglochin* *maritimum*; *Potamogeton* *natans*, *rufescens*, *lucens*, *perfoliatus*, *compressus*, *pectinatus*; *Ruppia* *maritima*; *Zannichellia* *palustris*; *Zostera* *marina*; *Lemna* *polyrrhiza*, *gibba*; *Typha* *angustifolia*; *Sparganium* *minimum*; *Arum* *maculatum*; *Calla* *palustris*; *Orchis* *mascula*; *Gymnadenia* *conopsea*; *Platanthera* *bifolia*; *Herminium* *Monorchis*; *Cephalanthera* *pallens*, *Xiphophyllum*; *Listera* *ovata*; *Goodyera* *repens*; *Spiranthes* *autumnalis*; *Malaxis* *paludosa*; *Asparagus* *officinalis*; *Convallaria* *Polygonatum*; *Anthericum* *Liliago*, *ramosum*; *Gagea* *arvensis*; *Allium* *vineale*, *Scorodoprasum*; *Juncus* *glaucus*, *capitatus*, *obtusiflorus*, *supinus*, *squarrosus*, *compressus*, *Tenageia*; *Cyperus* *flavescens*, *fuscus*; *Schoenus* *nigricans*; *Cladium* *Mariscus*; *Rhynchospora* *alba*; *Heleocharis* *acicularis*; *Scirpus* *pauciflorus*, *setaceus*, *lacustris*, *maritimus*, *compressus*; *Eriophorum* *polystachyum*; *Carex* *dioica*, *pulicaris*, *disticha*, *muricata*, *paniculata*, *remota*, *leporina*, *elongata*, *limosa*, *montana*, *praecox*, *digitata*, *glauca*, *pallescens*, *flava*, *distans*, *sylvatica*, *Pseudo-Cyperus*, *arenaria*, *hirta*; *Setaria* *glauca*; *Hierochloa* *odorata*; *Alopecurus* *agrestis*; *Phleum* *arenarium*, *Boehmeri*; *Agrostis* *alba*, *canina*; *Calamagrostis* *lanceolata*, *neglecta*, *Epigeios*, *sylvatica*; *Ammophila* *arenaria*, (*baltica*); *Koeleria* *crispata*; *Aira* *caespitosa*; *Corynephorus* *canescens*; *Holcus* *mollis*; *Arrhenatherum* *elatius*; *Avena* *strigosa*, *fatua*, *pubes-*

cens, caryophyllea, praecox; *Triodia procumbens*; *Melica uniflora*, *nutans*; *Poa annua*, *nemoralis*, *trivialis*, *pratensis*, *compressa*; *Glyceria spectabilis*, *distans*; *Festuca rubra*, *gigantea*, *arundinacea*; *Brachypodium pinnatum*; *Bromus mollis*, *asper*, *sterilis*; *Triticum junceum*; *Elymus arenarius*; *Hordeum secalinum*; *Nardus stricta*.

*Equisetum palustre*, *limosum*; *Pilularia globulifera*; *Lycopodium Selago*, *annotinum*, *complanatum*; *Botrychium rutaefolium*; *Ophioglossum vulgatum*; *Osmunda regalis*; *Polypodium Dryopteris*; *Polystichum Thelypteris*, *spinulosum*, *cristatum*; *Asplenium Trichomanes*.

*Sphagnum acutifolium*; *Splachnum ampullaceum*; *Physcomitrium pyriforme*; *Phaseum serratum*, *muticum*, *cuspidatum*, *nitidum*, *subulatum*; *Pottia cavifolia*, *truncata*; *Anacalypta lanceolata*; *Barbula unguiculata*, *convoluta*, *subulata*; *Trichostomum tortile*; *Weisia controversa*, *cirrhata*, *curvirostra*; *Ceratodon purpureus*; *Dicranum pellucidum*, *flexuosum*, *varium*, *heteromallum*, *flagellare*, *undulatum*, *spurium*, *glaucum*; *Mnium punctatum*, *undulatum*, *hornum*, *cuspidatum*, *stellare*; *Bryum nutans*, *erudum*, *annotinum*, *carneum*, *pseudotriquetrum*, *roseum*, *capillare*, *caespiticium*, *argenteum*; *Timmia megapolitana*; *Aulacomnion palustre*, *androgynum*; *Paludella squarrosa*; *Meesia uliginosa*, *longiseta*; *Bartramia pomiformis*, *fontana*; *Schistidium ciliatum*; *Grimmia apocarpa*, *pulvinata*; *Racomitrium lanuginosum*, *heterostichum*, *canescens*; *Orthotrichum anomalum*, *crispum*, *leiocarpum*; *Encalypta vulgaris*; *Diphyscium foliosum*; *Buxbaumia aphylla*; *Tetraphis pellucida*; *Polytrichum undulatum*, *tenellum*, *nanum*, *aloides*, *urnigerum*, *juniperium*, *piliferum*; *Fontinalis antipyretica*; *Leucodon sciuroides*; *Leptohymenium filiforme*; *Anomodon viticulosus*, *curtipendulus*; *Neckera crispa*; *Leskea trichomanoides*, *polyantha*; *attenuata*; *Climacium dendroides*; *Hypnum serpens*, *velutinum*, *nitens*, *lutescens*, *rutabulum*, *cuspidatum*, *Schreberi*, *purum*, *myurum*, *abietinum*, *denticulatum*, *riparium*, *murale*, *praelongum*, *strigosum*, *longirostrum*, *triquetrum*, *loreum*, *stellatum*, *squarrosus*, *cupressiforme*, *filicinum*, *Crista castrensis*, *molluscum*, *fluitans*,



aduncum, scorpioides; Fissidens bryoides, taxifolius, adiantoides.

Riccia fluitans, crystallina, glauca; Anthoceros laevis, punctatus; Fegatella conica; Metzgeria furcata; Aneura pinguis, multifida, palmata; Blasia pusilla; Pellia epiphylla; Fossombronina pusilla; Frullania dilatata, Tamarisci; Madotheca platyphylla; Ptilidium ciliare; Trichocolea Tomentella; Lepidozia reptans; Calypogeia Trichomanis; Lophoclea bidentata; Liochlaena lanceolata; Jungermannia trichophylla, bicuspidata, ventricosa; Plagiochila asplenioides.

Tetraspora bullosa; Nostoc commune, pruniforme; Conferva rivularis, canalicularis, glomerata, rupestris; Aegagropila Froelichiana; Botrydium granulatum; Vaucheria caespitosa; Enteromorpha intestinalis, compressa; Ulva latissima; Phycoseris Linza; Callithamnion repens; Ceramium diaphanum: Furcellaria fastigiata; Chondrus crispus; Delesseria sanguinea; Chorda Filum; Fucus vesiculosus, canaliculatus? serratus; Halidrys siliquosa; Nitella flexilis; Chara foetida, hispida.

Verrucaria nitida; Pertusaria communis; Graphis scripta; Lecanora subfusca; Collema atro-coeruleum, crispum; Imbricaria saxatilis, olivacea, caperata, conspersa, parietina; Parmelia stellaris, pulverulenta; Lobaria pulmonaria; Peltigera venosa, horizontalis, canina, aphotosa; Calycium adpersum, lenticulare; Conioeybe furfuracea; Lecidea sanguinaria, geographica; Baeomyces roseus; Cladonia coniocraea, coccifera, digitata, rangiferina; Stereocaulon tomentosum; Cetraria glauca, juniperina; Hagenia ciliaris; Evernia prunastri; Ramalina fraxinea, calicaris, farinacea; Cornicularia aculeata; Bryopogon jubatus; Usnea barbata, florida; nebst 79 Pilzarten.

\* Timm Fr. Apotheker in Malschin, Eufel des vorhergenannten, entdeckte *Rubus Sprengelii* (und *Collomia grandiflora*.) — Zu der vorliegenden Arbeit theilte er mir das S. 118 ff. abgedruckte Verzeichniß der officinellen Pflanzen mit.

Lode G. J. geb. den 31. Mai 1733 zu Zollenspieker in den Vierlanden, gest. am 30. Dec. 1797 als Consistorialrath zu Schwerin, beschäftigte sich als Botaniker vorzugsweise mit dem Studium der

einheimischen Pilze, worüber er in den J. 1790 und 91, als er noch Prediger zu Preitzier war, ein Werk veröffentlichte, welches den Titel führte: *Fungi Mecklenburgenses selecti*. Anfangs hatte Tode sich ein weiteres Ziel gesteckt, nämlich die Ausarbeitung einer mecklenburgischen Flora, wozu ihn um das J. 1775 besonders der Botaniker Murray in Göttingen angeregt hatte. Diese Arbeit aber blieb liegen, als vor ihrer Vollendung im J. 1788 Timms Prodrömus erschien. Schon seit dem J. 1778 hatte aber Tode mit besonderer Vorliebe sich den Pilzen zugewendet, anfangs nur deshalb, weil ihr Studium bis dahin am meisten vernachlässigt worden war, bald aber weil die mannigfaltigen und schönen Formen dieser Pflanzen ihn so fesselten, daß er nicht wieder von ihnen loskommen konnte. Die Frucht dieser Beschäftigung war das oben angeführte Werk, durch welches unsere Pilzflora, aus welcher bis dahin nur 82 Species bekannt geworden waren, um 108 Arten vermehrt wurde, unter denen sehr viele überhaupt von Tode zuerst beschriebene und benannte Species sich befinden. Es war dies eine für jene Zeit sehr tüchtige Arbeit, die freilich den Anforderungen, welche jetzt die Mykologie stellt, nicht mehr entsprechen kann. Schon im J. 1811 erkannte Link (*Observ. in ord. plant. S. 35*) daß sich in Tode's Werk viele Irrthümer eingeschlichen hätten, weil dessen Mikroskop nicht stark genug gewesen sei, und er auch das Messer zum Seciren der Pilze nicht richtig zu handhaben gewußt habe.

Ferner veröffentlichte Tode noch: Bemerkungen über *Phallus caninus* Schäf. in der Monatschrift von und für Mecklg. 1792 S. 380; Antwortschreiben an Frn. Cand. Florke in Kotelow a. a. D. 1793 S. 10 ff., (wieder abgedruckt in unserem Archiv IX S. 30 ff.). Auch in den Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin (11 Bde. 1780—94) finden sich von ihm noch folgende Aufsätze: vom Sichtschwamme (III Nr. 18); vom neuen Schwamme (III Nr. 19); Beschreibung zweier mikroskopischer Schwämme (IV, 11); Versuch einer genauen Eintheilung der Keulenschwämme (ib. 12); Beschreibung des Knopfschwammes (*Aerospermum*), eines neuen Schwammgeschlechtes (ib. 18); Bemerkung, die Samendecke (*velum*) der Schlüsselchwämme betreffend (ib. 19); Versuch einer neuen methodischen Eintheilung der Blatterschwämme (V. Nr. 2); Beschreibung des Hut-

werfers, *Pilobolus* (ib. 3); Beschreibung des Venusschwammes, *Hysterium* (ib. 4); Zusatz zu dem Aufsatz über Blätterschwämme (ib. 27); Fortgesetzte Bemerkungen bei den Schwämmen (VI, 16). Endlich sind auch noch mykolog. Mittheilungen von ihm in den Abhandlungen der naturforschenden Gesell. zu Halle abgedruckt, welche ich leider nicht gesehen habe. Tode's mykologische Leistungen wurden dadurch geehrt, daß eine im südlichen Afrika wachsende Farngattung durch Swartz den Namen *Todea* erhielt; auch *Typhula Todei* Fries, *Ascophora Todeana* Corda und *Chordostylum Todei* Corda wurden nach ihm benannt.

Aber auch noch auf einem andern, von der Botanik sehr entfernt liegendem Gebiete hat Tode sich in Mecklenburg einen Namen gemacht. Als nämlich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ein natürlicher Rückschlag gegen die pietistische Richtung erfolgte, die im Schweriner Lande unter dem Herzog Friedrich geherrscht hatte, und mit dem Regierungsantritt des Herzog Friedrich Franz I. die rationalistische Aufklärungsperiode eintrat, war es Tode, der in dem merkwürdigen und hitzigen Streit, welcher sich über das Milbheimsche Noth- und Hülfsbüchlein entspann, von der Regierung den Auftrag erhielt, eine purificirte Ausgabe dieses von der pietistischen Partei hart angefochtenen Buches zu besorgen. Hernach arbeitete er auch mit an dem bekannten im J. 1794 von Stenemund und Passow herausgegebenen Ludwigs-luster Gesangbuche, worin sich auch sieben „aufgeklärte“ Lieder von ihm befanden.<sup>1</sup> Ueberhaupt trat in den letzten Lebensjahren Todes die Botanik bei ihm immer mehr hinter die Theologie zurück. Ob dies in dem Grade geschehen sei, daß Tode zuletzt seine früheren botanischen Beschäftigungen geradezu für sündhaft gehalten habe, und deshalb das Manuscript, so wie die fertigen Kupferplatten zu der Fortsetzung seiner 1790 begonnenen *Fungi Mecklenburgenses* in einen Teich versenkte, in welchem nach seinem Tode auch sein Herbarium auf Tode's ausdrücklichen Befehl den Untergang fand (vergl. Archiv X, 66), — oder ob, wie eine andere Sage lautet, letzteres lediglich aus Eitelkeit geschah, damit man nach seinem Ableben nicht im Stande

1. Vergl. meine Geschichte Mecklenburgs Bd. 2 S. 438 ff.

sei ihm aus dem Herbarium etwa Fehler in seinen veröffentlichten Arbeiten nachzuweisen, — dies zu entscheiden, muß ich dahingestellt sein lassen, da nur die Thatsache feststeht, die Gründe aber, aus welchen diese hervorging, verschieden erzählt werden. Zur Ehre Tode's möchte ich mich an die erstere Relation halten, da sie ein weniger nachtheiliges Licht auf seinen Character wirft, wie die letztere.

Trentepohl J. F. In welchen Beziehungen dieser obdenburgische Botaniker zu Mecklenburg gestanden hat, ist mir nicht bekannt; ich erwähne ihn nur, weil Rabenhorst in seiner Kryptogamienflora Deutschlands auf Trentepohl's Autorität Mecklenburg als das Vaterland des *Physarum alatum* nennt.

Treviranus L. C. war von 1811—16 Professor der Botanik in Rostock, jetzt in Bonn. Er entdeckte in Mecklenburg: *Alyssum calycinum*, (*Lathyrus tuberosus*), *Plantago arenaria*, *Avena tenuis*, *Festuca Myurus* var. *sciuroides* und *Scapania compacta*. Nach ihm trägt die zu den Personaten gehörige Gattung *Trevirana* Willd. den Namen.

Hollbrecht A. C. F. Prediger zu Belitz in der Präpositur Deterow, widmete sich früher der Pharmacie, und entdeckte, zu Neubrandenburg conditionirend, dort im Stargarder Bruche den *Galanthus nivalis*.

(\*) Bortisch L. Prediger in Satow bei Kröpelin, entdeckte *Allium ursinum*, (und *Eranthis hiemalis*).

\* Weidner F. Dr. med. in Sülz, geb. in Neustrelitz, schrieb als Inaugural-Dissertation: „Die in Mecklenburg wildwachsenden phanerog. Giftpflanzen. Rostock 1856.“ Er entdeckte *Cardamine parviflora* und theilte mir ein Verzeichniß der selteneren bei Sülz wachsenden Pflanzen mit.

Weigel C. C. Verf. der *Flora Pomerano-Rugica* 1769, entdeckte (nach Detharding) in Mecklenburg *Arctostaphylos Uva ursi*.

\* Willebrand H. W. H. Prediger in Malow bei Crivitz, entdeckte *Bupleurum tenuissimum*, *Salix holosericea* (und gemeinschaftlich mit C. Griewank *Barbarea stricta*, *Hypericum hirsutum*, *Rubus rudis*). Ein Aufsatz von ihm über die Flora der alten mecklenburgischen Burgwälle steht in Archiv VI., 132.



Wrebow J. C. L. geb. am 10. Nov. 1773 zu Gilsfrow, und gest. als Prediger zu Parum am 11. Aug. 1823 (s. Archiv X S. 117), schrieb: Tabellarische Uebersicht der in M. wildwachsenden phaner. Pflanzengeschlechter, Lüneburg 1808 — Oekonomisch-technische Flora von Mecklg. Bd. 1 und 2. Lüneburg 1811. 12 (nicht vollendet). Kleinere Mittheilungen von ihm finden sich in den Mitgl. Beitr. 1808 St. 50. Er entdeckte: *Anemone Pulsatilla*, *Rubus dumetorum*, *Thesium ebracteatum*. Ecklon benannte nach ihm die zu den Irideen gehörige Gattung *Wredowia*, die hernach von anderen wieder mit *Aristea* vereinigt worden ist. — Sein Herbarium befindet sich im Besitz des Landschullehrer-Seminars zu Ludwigslust.

(\*) Wüstnei C. G. G. geb. am 18. Februar 1810 in Malchin, gest. am 12. Oct. 1858 als Lehrer an der Bützgerschule in Schwerin (vergl. über ihn Archiv XIII. 2 ff.), schrieb: Verzeichniß der um Schwerin wildwachsenden phanerogamischen Pflanzen, Schwerin 1854, 8vo (Schulprogramm). Die Lebermoose Mecklenburgs, in Archiv VIII S. 49 ff. 1854; auch gab er 1850 eine Sammlung getrockneter meckl. Lebermoose heraus, und betheiligte sich an Habenhorst's *Bryologia Europaea* (Dresden 1858). An neuen Arten entdeckte er: *Corydalis solida*, *Melilotus dentata*, *Barbula laevipila*, *Preissia commutata*, *Lophoclea minor*, *Jungermannia crenulata*, *obtusifolia*, *albicans*, *Zeora hypnorum*, *Micarea Wüstneii*, *Imbricaria diffusa*, *aspera*, *Lecidea enteroleuca*, *punctata*, *Biatora granulosa*, *Stereocaulon condensatum*, nebst 33 Pilzarten. — Die deutsche Pilzgattung *Wüstneia* Rabenh. trägt seinen Namen deren einzige Species, *W. sordida*, von Wüstnei an trockenen Eschenzweigen bei Schwerin entdeckt wurde.

\* Zabel H. früher Assistent am botanischen Museum in Greifswald, jetzt Forstgehülfe zu Buddenhagen unweit Wolgast, Verfasser der in Archiv XIII. abgedruckten Flora von Neuvorpommern und Rügen, entdeckte in d. J. 1856 und 57 auf seinen Excursionen in dem ganzen östlichen Gränzgebiete Mecklenburgs (wie er mir gütigst mitgetheilt hat): *Carex caespitosa*, *Buxbaumii*, *Festuca borealis*, *Polysiphonia nigrescens*, *Mesogloia vermicularis*, *Desmarestia viridis*, *Chara ceratophylla*, *crinita*, *baltica*.

Zachariä (+), über den mir weiter nichts bekannt, ist der einzige Finder der *Ononis arvensis* in M. gewesen.

\* Zander H. D. F. Dr. phil., Prediger zu Barkow bei Plau, entdeckte *Aconitum Napellus*.

\* \* \*

Zur Vervollständigung der vorstehenden geschichtlichen Notizen will ich noch erwähnen, daß Mecklenburg auch einmal (von c. 1760 bis 1843) einen botanischen Garten gehabt hat, welcher zur Zeit unseres Universitäts-Schisma's in Bützow geboren wurde und in Rostock starb. Wer sich für die Geschichte desselben interessirt, findet einige Mittheilungen darüber in: Eschenbachs Annalen der Rostockschen Academie 1794 Bd. V. St. 19 S. 151; Link dissert. botanicae, Suerin 1795 Praefat. p. IV; Neue Monatschrift von und für Mecklenburg 1798 S. 18; Wehnerts Meckb. Journal 1806 Bd. II S. 227; Freimuth. Abendblatt 1844 Nr. 1325 im Correspondenzartikel aus Rostock. — Als Curiosum will ich nur erwähnen, daß zur Anschaffung von Pflanzen und Sämereien anfänglich jährlich eine Summe von 12 Thln. ausgesetzt war, und daß die im J. 1789 im Garten vorhandenen Pflanzen sich in einem solchen Zustande befanden, daß man, als derselbe nach Rostock verlegt wurde, gar nichts davon mitnahm. — Die erste botanische Excursion auf academische Anregung fand zu Rostock im J. 1655 statt; zu derselben lud der Prof. Simon Pauli öffentlich ein.

Um auch gelegentlich hier gleich alle die Pflanzengattungen zusammen zu fassen, die unseren Landsleuten zu Ehren benannt worden sind, will ich noch erwähnen, daß im J. 1848 drei neue in Venezuela entdeckte Gattungen durch Dr. H. Karsten (aus Stralsund) *Grischovia*, *Schwerinia* und *Stannia* getauft worden sind, und zwar nach Dr. Grischow in Stavenhagen, dem Großherzoge Friedrich Franz II. von M. Schwerin, und dem Prof. Dr. Stannius in Rostock. Schon gegen Ende des vorigen Jahrhunderts erhielt eine schöne zur Familie der Scitamineen gehörige Gattung des Cap-Landes den Namen *Strelitzia*, zu Ehren der damaligen Königin Charlotte von England, geborenen Prinzessin von M. Strelitz.

## VIII. Statistik der Flora.

Auch eine Betrachtung der Bestandtheile unserer Flora von einem lediglich statistischen Standpunkte würde nicht ohne Interesse sein, und daher habe ich die beiden nachfolgenden Tabellen *A.* und *B.* zusammengestellt, von denen die erstere einen genauen Nachweis des Antheils giebt, den die einzelnen Botaniker an den in den verschiedenen Pflanzenklassen gemachten Entdeckungen genommen haben, die zweite aber eine chronologische Uebersicht dessen liefert, was in den einzelnen der 9 Decennien, während welcher man sich mit der Erforschung der heimischen Flora beschäftigt hat, an neuen Pflanzen aufgefunden worden ist.

*A.*

	Phan.	Fil.	M. fr.	Hep.	Alg.	Lich.	Fung.	S. S.
Afermann	1	.	.	.	.	.	.	1
Becker	3	.	.	.	.	.	.	3
Betke	8	.	.	.	.	.	.	8
Beuthe	4	.	.	.	1	.	.	5
Blandow	6	.	40	.	.	.	.	46
Bleichschmidt	1	.	.	.	.	.	.	1
Boll	1	.	.	.	.	.	4	5
Brockmann	1	.	.	.	.	.	.	1
Brückner A. F. T. und A. F.	22	2	1	.	1	.	.	26
Brückner G.	3	.	1	.	3	.	2	9
Brückner A. jun.	.	.	.	.	.	3	7	10
Crome	5	.	7	.	.	.	.	12
Danneel	1	.	.	.	.	.	.	1
Detharding	35	.	.	.	5	.	.	40
Ditmar	1	.	.	.	12	.	97	110
	92	2	49	0	22	3	110	278

	Phan.	Fil.	M. fr.	Hep.	Alg.	Lich.	Fung.	S. S.
Tr.	92	2	49	.	22	3	110	278
Ehrenberg	.	.	.	.	16	.	.	16
Fiedler	.	.	19	.	7	.	360	386
Fleischer	.	.	.	.	.	.	1	1
Flörke	3	.	1	.	.	18	.	22
v. Flotow	.	.	.	.	3	.	.	3
Gerdes	1	.	.	.	.	.	.	1
Giesebrecht	2	.	.	.	.	.	.	2
Griewant C.	18	.	.	.	1	.	.	19
Häcker	.	.	2	.	.	.	.	2
Hahn	3	.	.	.	.	.	.	3
Euth	.	.	.	1	7	.	.	8
Kahle	.	.	.	.	1	.	.	1
v. Kampf	2	1	.	.	.	.	1	4
Knochenhauer	1	.	.	.	.	.	.	1
Koch	1	.	.	.	.	.	.	1
Koch F.	.	.	.	.	.	.	1	1
Landt	1	.	.	.	.	.	.	1
Langmann	2	.	.	.	.	.	.	2
Lehmeyer	.	.	.	.	.	.	1	1
Lint	30	.	.	.	15	.	92	137
Meyer	4	.	.	.	.	.	.	4
Neuenborf	2	.	.	.	.	.	.	2
Nolte	3	.	.	.	.	.	.	3
v. Dertzen	1	.	.	.	.	.	.	1
Prahl	6	.	.	.	.	.	.	6
Rabenhorst	.	.	.	.	3	.	.	3
Ramelow	1	.	.	.	.	.	.	1
Richter	1	.	.	.	.	.	.	1
Röder	3	4	.	.	.	.	.	7
Rose	.	.	.	.	1	.	.	1
	177	7	71	1	76	21	566	919



	Phan.	Fil.	M. fr.	Hep.	Alg.	Lich.	Fung.	S. S.
Tr.	177	7	71	1	76	21	566	919
Schmidt	8	.	.	.	.	.	.	8
v. Schreber	1	.	.	.	.	.	.	1
Schreiber	1	.	.	.	.	.	.	1
Schulz F.	31	3	46	22	2	52	221	377
Schulz L.	417	11	11	2	.	.	3	444
Siemerling	.	.	.	.	.	.	1	1
Siemssen	4	.	.	.	.	.	5	9
Strud	.	.	1	.	.	.	.	1
Thebe	14	1	.	.	.	3	5	23
Timm J.	349	14	109	26	27	40	79	644
Timm F.	1	.	.	.	.	.	.	1
Tobe	.	.	.	.	.	.	108	108
Trentepohl	.	.	.	.	.	.	1	1
Treviranus	4	.	.	1	.	.	.	5
Vollbrecht	1	.	.	.	.	.	.	1
Vortisch	1	.	.	.	.	.	.	1
Weidner	1	.	.	.	.	.	.	1
Weigel	1	.	.	.	.	.	.	1
Willebrand	2	.	.	.	.	.	.	2
Wrebow	3	.	.	.	.	.	.	3
Wüstnei	2	.	1	5	.	8	33	49
Zabel	3	.	.	.	6	.	.	9
Zander	1	.	.	.	.	.	.	1
S.	1022	36	239	57	111	124	1022	2611

**B.**

Decennium.	Phan.	Fil.	M. fr.	Hep.	Alg.	Lich.	Fung.	S. S.
I. (1771-80)	417	11	11	2	0	0	3	444
II. (1781-90)	271	13	107	25	22	37	124	599
III. (1791-1800)	93	1	3	1	7	3	94	202
IV. (1801-10)	105	4	73	7	30	55	341	615
V. (1811-20)	13	3	15	13	3	0	48	95
VI. (1821-30)	61	0	7	0	0	18	0	86
VII. (1831-40)	20	0	0	3	15	0	2	40
VIII. (1841-50)	28	3	21	0	14	0	73	139
IX. (1851-60)	14	1	2	6	20	11	337	391
	1022	36	239	57	111	124	1022	2611

Betrachten wir nun die einzelnen Pflanzenklassen noch etwas näher, so löset sich zunächst unsere Phanerogamenflora in diejenigen Bestandtheile auf, welche die nachstehende Tabelle angiebt, wobei in der letzten, mit G. bezeichneten Columne die von meiner Zählungsmethode abweichende Artenzahl hinzugefügt ist, welche man für die einzelnen Familien erhält, wenn man die von Garcke in seiner Flora von Nord- und Mitteldeutschland (ed. 4) befolgte Methode zu Grunde legt. Da ich aber seit dem Druck des 2. Bogens der vorliegenden Arbeit noch einige Aenderungen in dem dort S. 18 und 23 mitgetheilten Verzeichnisse der Varietäten und Bastarde vorgenommen habe, bitte ich, diese hier zu berücksichtigen, weil sonst die nachfolgenden Zahlen mit jenen früheren Angaben nicht ganz übereinstimmen würden. Es sind nämlich S. 19 *Elatine triandra* und *Salix angustifolia* zu streichen, dagegen aber S. 18 *Viola lactea* und S. 19 *Polygonum mite*

und minus unter die Varietäten einzureihen, desgleichen S. 23 *Salix Smithiana* unter die Bastarde. — Außerdem ist S. 19 in der zweiten Columne Z. 6 v. oben irrtümlich *Potentilla* statt *Veronica* gesetzt.

	einheim.	eingebürg.	Var.	Bast.	verwilt.	verirrt.	zweifelh.	S. S.	Bard.
Ranunculaceae	30	2	4	1	3	1	.	41	38
Berberideae	.	.	.	.	2	.	.	2	2
Nymphaeaceae	3	.	.	.	.	.	.	3	3
Papaveraceae	.	4	.	.	.	1	1	6	6
Fumariaceae	3	1	.	.	.	1	.	5	5
Cruciferae	28	14	4	1	5	4	.	56	56
Cistineae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Violarieae	7	1	2	.	.	1	1	12	10
Resedaceae	.	1	.	.	.	1	.	2	2
Droseraceae	4	.	.	.	.	.	.	4	4
Polygaleae	2	.	1	.	.	.	.	3	3
Sileneae	14	2	.	.	2	3	1	22	22
Alsineae	24	.	6	.	.	.	1	31	28
Elatineae	2	.	.	.	.	.	.	2	2
Lineae	2	.	.	.	.	.	.	2	2
Malvaceae	6	.	1	.	1	.	.	8	7
Tiliaceae	2	.	.	1	.	.	.	3	2
Hypericineae	7	.	.	.	.	.	.	7	7
Acerineae	3	.	.	.	.	.	.	3	3
Geraniaceae	9	.	.	.	3	.	1	13	13
Balsamineae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Oxalideae	1	2	.	.	.	.	.	3	3
Celastrineae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Rhamneae	2	.	.	.	.	.	.	2	2
Papilionaceae	46	5	3	.	4	3	.	61	60
Amygdaleae	2	2	.	.	.	.	.	4	4
	200	34	21	3	20	15	5	298	287

	einheim.	eingebürg.	Var.	Dist.	verwilt.	verirrt.	zweifelh.	S. S.	Garde.
Tr.	200	34	21	3	20	15	5	298	287
Rosaceae	34	.	9	1	5	1	.	50	47
Sanguisorbeae	9	.	1	.	.	.	.	10	10
Onagrariae	9	2	.	1	.	.	1	13	12
Halorageae	3	.	.	.	.	.	.	3	3
Hippurideae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Callitricheae	2	.	2	.	.	.	.	4	4
Ceratophylleae	2	.	.	.	.	.	.	2	2
Lythraeae	2	.	.	.	.	.	.	2	2
Cucurbitaceae	.	1	.	.	.	.	1	2	2
Portulacaeae	1	.	1	.	1	.	.	3	3
Paronychieae	3	.	.	.	.	.	.	3	3
Scleranthaeae	2	.	.	.	.	.	.	2	2
Crassulaceae	4	.	1	.	2	.	.	7	6
Grossularieae	2	2	.	.	.	.	.	4	4
Saxifrageae	5	.	.	.	.	.	.	5	5
Umbelliferae	33	6	1	.	3	1	.	44	44
Araliaceae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Corneae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Loranthaceae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Caprifoliaceae	5	1	.	.	1	.	.	7	7
Stellatae	10	2	.	1	.	1	1	15	14
Valerianeae	2	4	.	.	.	.	.	6	6
Dipsaceae	6	.	.	.	.	.	.	6	6
Compositae	84	16	9	3	12	4	.	128	124
Ambrosiaceae	.	1	.	.	.	.	.	1	1
Lobeliaceae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Campanulaceae	10	2	.	.	.	1	.	13	13
Vaccinieae	4	.	.	.	.	.	.	4	4
Ericineae	11	.	.	.	.	.	.	11	11
	448	71	45	9	44	23	8	648	627



	einheim.	eingebürg.	Bar.	Bast.	verwilt.	verirrt.	zweifelh.	S. S.	Garde.
Tr.	448	71	45	9	44	23	8	648	627
Monotropeae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Aquifoliaceae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Oleaceae	1	.	.	.	1	.	.	2	2
Asclepiadeae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Apocynae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Gentianeae	11	.	.	.	.	.	.	11	11
Polemoniaceae	1	.	.	.	1	.	.	2	2
Convolvulaceae	5	1	.	.	.	.	1	7	7
Boragineae	14	3	1	.	2	1	1	22	22
Solaneae	1	3	2	.	4	.	.	10	10
Scrophularineae	32	8	5	5	3	1	1	55	49
Orobancheae	4	1	.	.	.	.	.	5	5
Labiatae	29	10	6	4	1	.	1	51	49
Verbenaceae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Lentibularieae	5	.	.	.	.	.	2	7	5
Primulaceae	12	1	1	.	.	.	.	14	13
Plumbagineae	2	.	1	.	.	.	.	3	3
Plantagineae	7	.	.	.	.	.	.	7	7
Amaranthaceae	.	.	.	.	2	.	.	2	2
Chenopodeae	8	10	3	.	2	3	.	26	23
Polygoneae	15	2	3	1	.	1	.	22	22
Thymeleae	.	.	.	.	1	.	.	1	1
Santalaceae	2	.	.	.	.	.	.	2	2
Eleagneae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Aristolochieae	.	1	.	.	.	.	1	2	2
Empetreae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Euphorbiaceae	4	4	.	.	.	.	.	8	8
Urticeae	2	4	1	.	1	.	.	8	7
Cupuliferae	5	.	.	.	.	.	.	5	5
	615	119	68	19	62	29	15	927	891

	einheim.	eingebürg.	Bar.	Bast.	verwilt.	verirrt.	zweifelh.	S. S.	Garde.
Tr.	615	119	68	19	62	29	15	927	891
Salicineae	14	.	9	7	.	.	.	30	24
Betulineae	4	.	.	.	.	.	.	4	4
Myricae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Coniferae	3	.	.	.	.	.	.	3	3
Dicotyl. S.	637	119	77	26	62	29	15	965	923
Hydrocharideae	2	.	.	.	.	.	.	2	2
Alismaceae	5	.	.	.	.	.	.	5	5
Butomeae	1	.	.	.	.	.	.	1	1
Juncagineae	3	.	.	.	.	.	.	3	3
Potameae	17	.	4	.	.	.	.	21	21
Najadeae	2	.	.	.	.	.	.	2	2
Lemnaceae	4	.	.	.	.	.	.	4	4
Typhaceae	5	.	.	.	.	.	.	5	5
Aroideae	2	1	.	.	.	.	.	3	3
Orchideae	25	.	1	.	.	.	.	26	26
Irideae	2	.	.	.	.	.	.	2	2
Amaryllideae	1	.	.	.	3	.	.	4	4
Asparageae	6	.	.	.	.	.	.	6	6
Lilaceae	12	2	.	.	4	.	1	19	19
Colchicaceae	.	.	.	.	1	.	.	1	1
Juncaceae	15	.	4	.	.	.	.	19	19
Cyperaceae	68	.	5	.	.	.	.	73	73
Gramineae	74	19	5	4	3	5	1	111	108
Monocotyl. S.	244	22	19	4	11	5	2	307	304
Dicotyl. S.	637	119	77	26	62	29	15	965	923
S. S.	881	141	96	30	73	34	17	1272	1227

Von den in den beiden ersten Columnen aufgezählten 1022 einheimischen und eingebürgerten phanerogamischen Arten gehören fast 0,74 den Dicotyledonen, und 0,26

den Monocotyledonen an. — Die am stärksten vertretenen Familien sind:

Compositae	0,0978	Rosaceae	0,0332	
Gramineae	0,0909	Ranunculaceae	0,0313	
Cyperaceae	0,0665	Orchideae	0,0244	
Papilionaceae	0,0499	Alsineae	0,0234	
Cruciferae	0,0410	Chenopodeae	0,0176	
Scrophularineae	0,0391	Boragineae	}	
Umbelliferae	} 0,0381	Polygoneae		} 0,0166
Labiatae		Potameae		

Reduciren wir die bis jetzt in Mecklenburg mit Sicherheit gefundenen Arten, Varietäten und Bastarde (mit Ausschluß der 17 zweifelhaften Arten), — im Ganzen also 1255 —, auf Garcke's Flora von Nord- und Mitteldeutschland (ed. 4), so finden wir, daß er 1212 derselben als wirkliche Species betrachtet. Von den 96 Varietäten erkennt er nämlich nur 25 als solche an, 71 aber als Arten; von den 30 Bastarden gelten ihm nur 16 als solche, 14 dagegen als Species; von den verwirrten Pflanzen fehlen zwei bei ihm noch ganz und gar, nämlich *Sedum hybridum* und *Polypogon monspeliensis*. Von den cultivirten Pflanzen, welche Garcke aus dem bezeichneten Gebiete aufzählt und die ich nicht mit berücksichtigt habe, werden in Mecklenburg etwa 150 allgemeiner auf Feldern und in Gärten angebauet. Demnach umfaßte unsere Phanerogamenflora gegenwärtig nach Garcke's Zählungsmethode:

1022	} einheim. und eingebürg. Arten
+ 71	
+ 14	} 73 verwilderte
	} 34 verwirrte
	} 150 cultivirte

S. 1364 Arten,

also 0,64 der 2129 Arten, die Garcke aus Nord- und Mitteldeutschland namhaft macht. Veranschlagen wir die gesammte deutsche Phanerogamenflora auf etwa 3300 Arten, so besitzen wir davon 0,41.

Diese Abtheilung des Pflanzenreiches, welche die augenfälligsten Objecte darbietet, ist von unseren Botanikern immer mit besonderer Vorliebe durchforscht worden. Auf viele neue Entdeckungen dürfen wir daher in derselben nicht mehr hoffen. Einen Fingerzeig dafür, was wir noch etwa Neues finden könnten, geben uns die benachbarten Floren, von denen manche schon recht sorgfältig durchsucht sind, nämlich Holstein durch Nolte, Lübeck durch Häcker, das Hamburger Gebiet durch Sonder, das Berliner durch Kunth, die Ufermark durch Gerhardt,<sup>1</sup> Neuvorpommern und Rügen durch Zabel. Aus den Arbeiten dieser Botaniker habe ich diejenigen uns zur Zeit noch fehlenden Pflanzen zusammengestellt, in deren Verbreitungsbezirk Mecklenburg liegt, oder deren Bezirk unserem Lande wenigstens nach einer Seite hin nahe kommt, so daß wir darnach zwei Classen noch zu beachtender Pflanzen erhalten, von denen die einen durch ganz Mecklenburg, die anderen aber nur in gewissen Gränzbezirken aufgefunden werden möchten. Hätte ich alles namhaft machen wollen, was nach der Angabe verschiedener Floristen in den bezeichneten Ländern vorkommen soll, so hätte sich die Anzahl der nachstehend aufgeführten

---

1. Programm des Gymnasiums zu Prenzlau 1856. — Sehr unkritisch ist Schmidts Flora von Pommern und Rügen 1840, auch in der neuen, von Dr. Baumgardt 1848 besorgten Auflage; Dietrichs Flora Marchica (1841) enthält gleichfalls manche verdächtige Angaben.



Pflanzen noch sehr vergrößern lassen; es haben sich aber in jenen Angaben eine Menge von Irrthümern eingeschlichen, weshalb ich alles irgend Verdächtige ausgeschlossen habe. Die Pflanzen, für deren Vorhandensein in den benachbarten Ländern mir genügende Autoritäten zu sprechen scheinen, sind nun folgende:

*Thalictrum simplex* Holstein, Hinterpommern? Königsberg und Memel.  
*Anemone sylvestris* Ufermark.

*Adonis vernalis* Ufermark, Hinterpommern.

*Nigella arvensis* Ufermark, Mittelmark.

*Fumaria muralis* Gebiet der Flora von Hamburg.

*F. capreolata* bei Kiel, Hamburg und Greifswald eingeschleppt.

*Camelina microcarpa* Andr. bei Rennitz unweit Greifswald eingeschleppt (Zab. in litt.).

*Alyssum montanum* Oderberg.

*Diplotaxis muralis* bei Stralsund, Wolgast, Swinemünde eingeschleppt.

*Senebiera didyma* bei Wolgast, Eldena, Hamburg und Altona eingeschleppt.

*Viola persicifolia* Schk. Potsdam (sec. Ruche).

*Polygala depressa* Hamburg, Greifswald, Rügen.

*Gypsophila fastigiata* im Geb. d. Flora von Berlin, Oranienburg?

*Dianthus arenarius* Wolgast.

*Silene viscosa* Hiddensöe.

*S. chlorantha* Ufermark.

*Sagina subulata* Holstein.

*Stellaria Frieseana* Herzth. Lauenburg, Lübeck.

*Moenchia erecta* Hamburg.

*Cytisus sagittalis* bei Wolfshagen (Uferm.), aber wohl nur verwildert.

*Vicia villosa* Hamburg, Lauenburg, Wittstocker Haide, Ufermark, bei Rennitz unweit Greifswald auf Saatäckern (eingeschleppt, — sec. Zabel in litt.).

*Tetragonolobus siliquosus* Holstein, Rügen, Ufermark.

*Astragalus Hypoglottis* Ufermark.

*Coronilla varia* in der Ufermark und bei Berlin eingebürgert.

- Spiraea salicifolia* bei Greifswald eingebürgert.  
*Rubus Chamaemorus* Swinemünde.  
*Cydonia vulgaris* auf Hiddensöe bei Kloster eingebürgert.  
*Epilobium obscurum* Hamburg.  
*Isnardia palustris* Lauenburg, Gebiet der Flora von Hamburg.  
*Trapa natans* Mittelmark, bei Wörlitz unweit Dessau häufig (C. Griew.)  
*Lythrum hyssopifolia* Altmark (unweit Wittenberge), Berlin.  
*Bryonia dioica* Gebiet der Floren von Lübeck und Hamburg.  
*Galium tricornis* Hamburg.  
*G. sylvestre* desgl. auf Haideboden.  
*Petasites albus* Holstein.  
*Aster Amellus* Schwedt.  
*Linosyris vulgaris* Dranienburg? Schwedt, Garz.  
*Stenactis annua* von Hamburg längs der Südgrenze bis in die Uferm.  
*Inula Conyza* Hamburg, Prigwall, Rügen.  
*Scorzonera purpurea* Perleberg, Ufermark, Demmin.  
*Cotula coronopifolia* Holstein und nordwestl. Deutschland.  
*Senecio vernalis* in Vorpommern eingeschleppt.  
*Crepis praemorsa* Rügen.  
*Hieracium virescens* Hamburg, Rakeburg, Kiel.  
*Xanthium italicum* längs der Elbe bis Hamburg.  
*Campanula sibirica* Ufermark.  
*Symphytum tuberosum* bei Lenzen an der Elbe häufig (Schreiber).  
*Linaria spuria* Holstein.  
*Veronica peregrina* bei Hamburg und Greifswald eingeschleppt.  
*V. praecox* Berlin, Prenzlau, Stettin.  
*Melampyrum sylvaticum* Flora von Hamburg, Mittelmark.  
*Orobanche elatior*, *Epithymum*, *caryophyllum* Vorpommern.  
*Salvia vesticillata* Prenzlau, Stettin.  
*Teucrium Scorodonia* Hamburg, Berlin, Rügen.  
*Chenopodium ficifolium* Hamburg.  
*Beta maritima* häufig an der Nordsee, aber auch schon bei Heiligen-  
 hafen an der Ostsee in Holstein gefunden.  
*Atriplex calotheca* Zingst, Stralsund.  
*A. nitens* Hamburg.

- Rumex pratensis* Hamburg, Lübeck, Prenzlau.  
*R. domesticus* Hamburg.  
*Asarum europaeum* Flora von Hamburg.  
*Salix daphnoides* Rügen.  
*S. bicolor*, *nigricans* Hamburg.  
*Hydrilla verticillata* Pommern im Danmschen See.  
*Potamogeton rutilus*, *trichoides* Hamburg.  
*Najas flexilis* Pommern unweit Stettin.  
*Zannichellia polycarpa* holst. Ostseeküste.  
*Orchis tridentata* Mittelmark, Ufermark, Stettin?  
*O. coriophora* Britzwalde.  
*Platanthera viridis* Holstein.  
*Listera cordata* Rügen, Harburg.  
*Microstylis monophyllos* Rügen, Ubedom, Wollin.  
*Cypripedium Calceolus* Rügen, Ufermark.  
*Narthecium ossifragum* Flora von Hamburg.  
*Juncus tenuis* Hamburg, Holstein.  
*Heleocharis multicaulis* Gebiet der Flora von Hamburg.  
*Scirpus Duvalii*, *Pollichii*, *Rothii* am unteren Laufe der Elbe.  
*S. radicans* Holstein, Lauenburg, Voitz a. d. Peene.  
*S. supinus* Ufermark.  
*Carex axillaris*, *maxima* Vorpommern.  
*C. stenophylla* Holstein.  
*C. microstachya* Lübeck.  
*C. supina* Holstein, Oberberg.  
*C. laevigata* Kiel.  
*Alopecurus nigricans* Hornem. var. *exserens* Ledb. bei Greifswald  
 und auf Müschgut (Zabel in litt.!).  
*Chamagrostis minima* in d. Hamburger Flora eingeschleppt.  
*Aira uliginosa* Rügen, Vüineburger Haide.

Würden alle diese 94 Pflanzen demaleinst auch als  
 Bürger unserer mecklenburgischen Flora nachgewiesen, —  
 was kaum zu erwarten steht, — so würde dadurch die  
 Gesamtsumme unserer Phanerogamen auf 1458 Arten

ansteigen und diese würden dann 0,44 der deutschen Phanerogamenflora ausmachen.

Auch die Klasse der zierlichen Farne ist schon sehr sorgfältig durchsucht, indem von den 74 Species, welche nach Rabenhorst in Deutschland (incl. der Schweiz, Italiens und des Lombardisch-Venetianischen Königreichs) vorkommen,<sup>1</sup> in Mecklenburg schon etwas mehr als die Hälfte, (nämlich wenn *Lycop. Chamaecyparissus* und *Polystichum dilatatum* auch als Arten gelten,) gefunden sind. Wir besitzen demnach schon 0,506 der gesammten deutschen Farne. Daß wir auch hier nicht mehr viel Neues zu hoffen haben, zeigt eine Vergleichung der benachbarten Floren, welche nur noch zwei Species vor uns voraus haben, nämlich *Salvinia natans*, die bei Lübeck, und *Isoëtes lacustris*, welche bei Ratzeburg die westliche Landesgränze berührt. Ich zweifele nicht, daß beide auch noch in Mecklenburg selbst aufgefunden werden, wodurch die Zahl unserer Farne dann auf 0,53 der deutschen Arten ansteigen würde.

An Laubmoosen, deren Kenntniß wir besonders Blandow, Crome, Fiedler, Schulz und Timm verdanken, kennen wir in Mecklenburg nach meiner Zählung 239, nach Rabenhorst's 243 Arten. Da letzterer in seiner Kryptogamenflora überhaupt an deutschen Species 543 aufzählt, so würde unser Antheil an der deutschen Moosflora 0,44 betragen. Auch diese Classe wird hinfort nicht

---

1. Rabenhorst zählt in seiner Kryptogamen-Flora Bb. II. Abth. 3 (1848) nur 69 Arten; ich habe bei der Zählung noch fünf hinzugefügt, nämlich *Pilularia globulifera*, *Salvinia natans*, *Botrychium simplex* und *matricariaefolium*, *Cystopteris sudetica*.



viel neue Ausbeute mehr geben, denn die Gränzländer haben, so viel ich weiß, vor uns nur noch voraus:

*Bryum cernuum* bei Neubamm.

*B. pallescens* bei Hamburg und in Holstein.

*B. Wahlenbergii* auf Nüßen, bei Neubamm und Hamburg.

*Fiedleria subsessilis* bei Greifswald.

*Orthotrichum cupulatum* bei Hamburg.

*Pottia Heimii* bei Spandau.

*Pyramidium tetragonum* in Hinterpommern.

*Racomitrium aciculare* bei Hamburg.

*Schistidium maritimum* an Felsblöcken des holsteinischen Ostseestrandes.

*Seligeria calcarea* auf Stubbenkammer.

Durch Auffindung dieser 10 Arten würde unsere Moosflora auf 253, oder auf 0,46 der deutschen Species ansteigen.

Die Kenntniß unserer Lebermoose verdanken wir hauptsächlich F. Schultz, Timm und Wüßnei. Von den durch Rabenhorst aufgezählten 178 deutschen Arten sind in M. schon 57, also 0,32 aufgefunden. Da diese Zahl gegen die für die Laubmoose erhaltene verhältnißmäßig noch sehr zurücksteht, so dürfen wir in dieser Classe wohl noch auf manchen Zuwachs rechnen, und zwar möchten dabei hauptsächlich folgende, in den benachbarten Gebieten wachsende Species ins Auge zu fassen sein:

*Jungermannia bicrenata* in Holstein.

*J. caespititia* bei Bergedorf unv. Hamburg.

*J. curvifolia* in Holstein.

*J. incisa* in Holstein.

*J. intermedia* in Holstein.

*Mastigobryum deflexum* in Holstein.

*Aneura pinnatifida* in Holstein.

*Scapania curta* in Holstein.

*Sarcoseyphus Funckii* in Holstein.

*Haplomitrium Hookeri* bei Hamburg.

*Geocalyx graveolens* in Pommern.

Selbst durch Auffindung aller dieser Arten in M., wodurch die Zahl der unserigen auf 68 oder 0,38 ansteigen würde, möchte diese Classe unserer Flora wohl kaum erschöpft sein.

Noch viel schwächer aber ist es mit unserer Erforschung der drei letzten Classen des Pflanzenreiches bestellt. Denn von den 1435 deutschen Algen, welche Rabenhorst aufzählt, kennen wir in M. (besonders durch Ditmar, Ehrenberg, Fiedler, Huth, Koch,<sup>1</sup> Link, Timm und Zabel) nur erst 140, oder 0,09. Von diesen gehören 91 Species der Ostsee an, — eine viel zu geringe Anzahl im Vergleich zu der, welche sich nach den Forschungen Fröhlichs (Prediger in Born bei Schleswig † 1846), v. Suhrs (Hauptmann in Rendsburg † ?), Pohlmanns (Handelsgärtner in Lübeck † 1849) u. a. für die Küsten von Schleswig, Holstein, Lübeck, Femern, Rügen u. s. w. ergeben hat. Von dort sind nämlich folgende 148 uns zur Zeit noch fehlende Ostseespecies bekannt geworden (sec. Rabenhorst, Rützing und Pohlmann in litt.):

1. Während des Druckes dieses Bogens erhalte ich von Herrn Baumeister F. Koch in Dargun noch einen Beitrag von 29 neuen Diatomaceen für unsere Algenflora, welche er in einem Meereschlamm unter dem heiligen Damme bei Doberan entdeckt, und die Hr. Prof. Ehrenberg in Berlin determinirt hat. Dadurch steigt die Gesamtzahl unserer Algen von 111 (S. 181) schon auf 140 Arten, und die ganze Summe unserer Pflanzen von 2611 auf 2640. Auf S. 182 ist demnach auch in der Tabelle B. für das Decennium IX. die Zahl der darin entdeckten Algen auf 49, und die der sämmtlichen Pflanzen auf 420 (statt 20 und 391) zu erhöhen.

- Eunotia Westermanni* Flensburg.  
     *gibberula*.  
*Synedra gracilis*.  
     *Sigma*.  
     *saxonica* Flensburg.  
*Amphipleura danica*.  
*Navicula Oxyphyllum* Flensb.  
     *interrupta* Kolberg.  
     *baltica* Kiel.  
     *lamprocarpa*.  
*Amphora elliptica*.  
     *hyalina*.  
*Rhapidogloea micans*.  
*Schizonema sericeum* Flensb.  
     *rutilans*  
     *Hoffmanni* Flensb.  
     *balticum*.  
     *Ehrenbergii*.  
     *cuprinum*.  
     *Navicula*.  
*Achnanthes brevipes*.  
*Striatella unipunctata*.  
*Tessella interrupta*.  
*Rhabdonema arcuatum*.  
*Gomphonema exiguum* Flensb.  
     *curvatum*.  
*Podosphenia gracilis*.  
     *Lyngbyei*.  
     *Ehrenbergii*.  
*Melosira nummuloides*.  
     *moniliformis*.  
     *lineata*.  
*Cocconëis pygmaea*.  
     *consociata*.
- Cocconëis aggregata*.  
     *oceanica*.  
     *Scutellum*.  
*Dietyocha Speculum*.  
*Amphitetras antediluviana*.  
*Heteractis pruniformis* Gelling-  
     ger Bucht.  
*Cylindrospermum gelatinosum*  
     *ibid*.  
*Phormidium Thinoderma* Kiel.  
*Lyngbya aeruginosa*.  
     *ferruginea* Gelling, Bucht.  
     *confervicola*.  
*Leibleinia chalybaea*.  
*Schizosiphon scopulorum*.  
*Actinococcus roseus*.  
*Physactis lobata* Flensb.  
*Rivularia atra* Holstein.  
     *pellucida* Gell. B.  
*Cruoria pellita*.  
*Batrachospermum moniliforme*  
     Schlesw. Holst.  
*Hormidium ceramicola*.  
*Schizogonium tortum*.  
*Conferva auricoma* Schlesw.  
     *fibrosa* Nügen.  
     *liniformis*.  
     *rigida* Schleswig, Nügen,  
     Danzig.  
*Linum Trabemilinde!*  
*Melagonium*.  
     *littorea*.  
     *cymosa*.  
     *vaucheriaeformis* Flensb.

- Conferva Froelichii.*  
   *crystallina.*  
   *Suhriana Schley.*  
   *heterochloa Schlesw*  
   *refracta.*  
   *centralis.*  
   *uncialis.*  
   *Comatula Flensb.*  
   *globosa Flensb.!*  
*Hormiscia penicilliformis.*  
*Ectocarpus siliculosus Travem.!*  
   *major.*  
   *fasciculatus.*  
   *flagelliformis.*  
   *rufus.*  
   *subverticillatus.*  
   *compactus.*  
   *castanens Flensb.*  
   *brachiatus Travem.!*  
*Vaucheria littorea.*  
*Bryopsis plumosa Femern.*  
*Bangia crispa Schlesw. Danzig.*  
*Phycolapathum cuneatum Flensb.*  
*Enteromorpha complanata.*  
   *clathrata Flensb.!*  
*Dictyosiphon foeniculaceus Tra-*  
   *vemünde.!*  
*Phyllactidium ocellatum.*  
*Ulva Lactuca Holstein!*  
   *oxysperma Kiel.*  
*Porphyra umbilicalis.*  
*Diplostromium tenuissimum.*  
*Callithamnium roseolum.*  
   *minutissimum Gelling. B.*
- Callithamnium pubes.*  
   *roseum.*  
   *corymbosum Flensb.!*  
*Chondrus incurvatus Trav.!*  
*Dumontia filiformis ib.*  
*Polysiphonia arenaria Kilgen.*  
   *stricta.*  
   *divaricata Kiel, Kilgen.*  
   *roseola.*  
   *aculeata Gelling. B.*  
   *tenuis Trav.!*  
   *rugulosa.*  
   *elongata.*  
   *Lyngbyei.*  
   *byssoides.*  
   *flaccida Femern.*  
   *dichocephala.*  
   *lophura.*  
   *secundata.*  
   *formosa.*  
   *rugulosa.*  
   *commutata.*  
*Cystoclonium purpurascens*  
   *Gelt. B.*  
*Sphaerococcus Bangii.*  
   *palmatus Friedericia!*  
*Sphacelaria cirrhosa Flensb.!*  
   *plumosa Trav.!*  
   *pennata.*  
   *spinulosa.*  
*Stypocaulon scoparium.*  
*Cladostephus Myriophyllum.*  
   *spongiosus.*  
*Myrionema stellare.*



Myrionema curtum.	Chorda fistulosa Femern.
Elachista velutina Hofst.	Stilephora paradoxa ib. Kiel.
fucorum.	Desmarestia aculeata Sonder-
ferruginea Kiel, Femern.	burg!
flaccida.	Halorrhiza vaga Gelting. B.
Hildebrandtia deusta.	Lichnia confinis Trav.!
Leathesia baltica.	Phyllitis Fascia Kiel.
marina Flenßb.	Ozothallia nodosa ib. Trav.!
Mesogloia nervosa ib.	Nitella nidifica.
Punctaria plantaginea ib.!	

Auch mit dieser ansehnlichen Zahl dürfte die Algenflora der südlichen Ostseeküste kaum erschöpft sein. — Nicht minder fragmentarisch ist die unserer süßen Gewässer, aus der wir nur erst 49 Arten kennen. Wie viel wir hier noch zu erwarten haben, darüber können uns auch die Nachbarflora keinen auch nur einigermaßen genügenden Fingerzeig geben, da auch bei ihnen das schwierige Studium dieser Pflanzen sehr vernachlässigt geblieben ist. Zwar werden aus Holstein und Schleswig noch etwa 60 Species namhaft gemacht, die bei uns noch nicht beachtet sind, aber das reicht noch lange nicht zur Erschöpfung dieser Pflanzenclasse hin. Denn bedenken wir, daß von den c. 1000 Species deutscher Süßwasseralgae in Schlesien schon c. 500 aufgefunden sind, so dürfen auch wir gewiß mit Recht auf einige hundert Arten rechnen. Unter diesen Verhältnissen glaube ich keine zu hohe Rechnung zu machen, wenn ich die Zahl unserer Algen auf etwa 250 Meeres-species und 400 Sp. der süßen Gewässer veranschlage, — im Ganzen also auf 650 Arten, durch deren Auffindung unsere Algenflora auf 0,45 der deutschen Algenflora ansteigen würde.

Lichenen zählt die deutsche Flora nach Rabenhorst

440 Arten, die unserer nur 124, oder 0,28, welche hauptsächlich durch Flörke, F. Schulz, Timm und Wüsteni entdeckt sind. Aber auch diese Zahl genügt noch nicht, und ich glaube, daß wir es in dieser Classe auf mindestens 176 Species bringen werden.

Die meisten Entdeckungen scheinen aber noch in der Classe der Pilze zu machen zu sein. Rabenhorsts Aufzählung der deutschen Pilze vom J. 1844 umfaßte schon 4079 Arten! und vier Jahre später hatte er dazu schon einen gegen 1000 Species enthaltenden Nachtrag gesammelt, dessen Bekanntmachung er aber noch zurückhielt, weil ihm wöchentlich noch neue Entdeckungen aus allen Gegenden Deutschlands zukamen. Ist dies in den folgenden Jahren so fortgegangen, so müssen jetzt schon gegen 6000 Pilzarten in Deutschland gesammelt worden sein. Gegen diese Summe stehen denn freilich unsere 1022 mecklenburgischen Species, deren Kenntniß wir besonders Ditmar, Fiedler, Vink, F. Schulz, Timm, Tode und Wüsteni verdanken, noch sehr zurück, da sie nur 0,17 derselben betragen, während wir sie doch im Hinblick auf die sorgfältiger durchsuchten Pflanzenklassen auf mindestens 0,40 jener Summe, oder auf etwa 2400 Arten, veranschlagen dürfen. Große Strecken unseres Landes sind mykologisch noch gar nicht ausgebeutet, und es steht hier also den weiteren Forschungen noch ein großes Feld offen.

Stellen wir das für alle Classen gewonnene Resultat noch einmal übersichtlich zusammen, so ergiebt sich folgendes:

	Deutsch- land.	M e f f e n b u r g.			
		jetzt	D.: M. = 1 :	künftig	D.: M. = 1 :
Phanerogamen	3300	1364	0,41	1458	0,44
Farne	73	38	0,50	40	0,53
Laubmoose	543	243	0,44	253	0,46
Lebermoose	178	57	0,32	68	0,38
Algen	1435	140	0,09	650	0,45
Eichenen	440	124	0,28	176	0,40
Pilze	6000	1022	0,17	2400	0,40
	S.   11969	2988		5045	

Es würde demnach in M. noch die ansehnliche Zahl von 2057 Pflanzenarten zu entdecken bleiben, durch deren Auffindung unsere Flora von 0,24 auf 0,42, oder etwas mehr als zwei Fünftel der deutschen Flora ansteigen würde. Da die drei am sorgfältigsten erforschten Classen nicht allein fast diese (0,41), sondern sogar noch eine etwas größere Zahl (0,44, und 50) geliefert haben, so glaube ich daß jene Durchschnittszahl von 0,42 keineswegs zu hoch gegriffen sei, sondern vielmehr nur die Minimumsgränze dessen, was wir noch zu erwarten haben, darstelle.





IX.

# Systematische Aufzählung

der mecklenburgischen Pflanzen.

Ann. Die phanerogamischen eingeborenen und eingebürgerten Pflanzen sind numerirt und mit größerer Schrift gedruckt, die letzteren aber durch einen vorgesetzten Stern kenntlich gemacht. Für die verwilderten und verwirrten Pflanzen sind kleinere Lettern gewählt. — Hinter den lateinischen Speciesnamen ist in Klammern die Jahreszahl der ersten Entdeckung der betreffenden Art in Mecklenburg (vergl. S. 144), so wie der Name des Entdeckers hinzugesügt, letzterer meist nur in einer abgekürzten Bezeichnung, deren Bedeutung man aus dem VII. Abschnitt leicht ermitteln wird, wie z. B. unter L. Sch. der Friedländer Dr. L. Schulz, und unter T. der Maschinen Timm sen. zu verstehen ist. — Ein ! hinter der Jahreszahl zeigt an, daß die Pflanze in dieser meiner Arbeit entweder zuerst als mecklenburgische genannt ist, oder daß ich das Entdeckungsjahr (auf Angabe des Entdeckers selbst gestützt,) etwas früher angesetzt habe, als dies in den bisherigen Publicationen geschehen ist. — Das ! hinter dem Fundorte bedeutet, daß ich entweder dort selbst gesammelt habe, oder Exemplare von jenem Orte in meinem Herbarium besitze.

## I. Dicotyledoneae.

1. *Thalictrum minus* L. (T. 1791) bei Grabow, Görslow untr. Schwerin, Bützow, Güstrow, Waren auf dem Windmühlenberge, Malchin nach Mistorf zu! Neuenbrandenburg am Starg. Berge selten! sehr häufig bei Kl. Nemerow! im Kamelowschen Holze bei Friedland. 1. Ranunculaceae.

Anm. Es kommen in Mecklenburg die beiden Formen vor, welche jetzt allgemein als *T. minus* L. und *T. flexuosum* Bernh. betrachtet werden, und zwischen denen *T. Kochii* Fr. als Verbindungsglied gerade in der Mitte steht. Schon Link unterschied in f. Mscr. 1810 zwei Abänderungen dieser Art in Mecklenburg, Schultz 1818 sogar zwei Species, *minus* und *majus*, äußerte aber später mündlich gegen mich, daß beide unzweifelhaft zusammen fielen. — Von der großen Veränderlichkeit dieser Art habe auch ich mich völlig auf einer Excursion überzeugt, welche ich um dieses Th. willen am 14. Aug. 1854 nach Kl. Nemerow unternahm, und habe alles das bestätigt gefunden, was G. Meyer in f. Fl. excurs. Hanov. S. 5 f. über *Th. minus* sagt. Bei Kl. Nemerow wächst die Pflanze in großer Menge gleich hinter dem Hofe an den Zäunen in der Allee welche zur Chaussee führt; man findet dort Ex., deren Stengel hohl und so dünnwandig ist, daß man ihn mit Leichtigkeit zerdrücken kann, und wiederum andere, bei denen er fast solide ist; ebenso variiren die Blätter in Gestalt und Größe, und die bald stark zusammengedrückt, bald runderen Nüsschen haben 8, 9 oder 10 Rippen; auch die Rispen ändern mehrfach in der Gestalt ab. — Außer Meyer a. a. D. vereinigt auch Wirtzen in seiner Flora der preuß. Rheinprovinz

(Bonn 1857) beide Formen wieder, desgleichen Garcke (ed. 4) und Zabel.

2. *Thalictrum flavum* L. (T. 1788) auf den Wiesen der Haideebene, besonders der Elde! nicht selten, aber auch bei Görslow unv. Schwerin, auf den Torfwiesen am Prival, auf der Insel Buchwerder im Daffower See, bei Evershagen (zw. Doberan und Rostock), Warnemünde, am Peetzer Bach (nördl. von Rostock) und bei Malchin an der hohen Brücke. — In M. Strelitz scheint es zu fehlen. S. 138.

3. *Anemone Hepatica* L. (L. Schulz 1777). In der Haideebene sehr selten, sonst häufig! S. 37. 138.

4. *Anemone Pulsatilla* L. (Wredow 1808) vorzüglich in der großen Haideebene! aber auch im Steinfeld der Holz bei Schwerin, bei Parchim, Güstrow und Rostock. — Sollte sie in M. Strelitz wirklich fehlen?

5. *Anemone pratensis* L. (T. 1788) durch ganz Mecklenburg häufig! S. 118.

β. *viridiflora* bei Boizenburg auf den Elb-Deichen! (Nichter); vergl. Mertens und Koch D. Fl. III, 104.

6. *Anemone vernalis* L. (Ackermann 1841) bei Ludwigslust unweit des ersten Chauffeehauses vor dem Hamburger Thore nur einmal gefunden; etwas häufiger in dem kleinen nördlichen Haidegebiete bei Mandelshagen und Gelbensande! Fehlt in M. Strelitz, und ist überhaupt unter den verwandten Arten die seltenste im nordöstlichen Deutschland.

7. *Anemone nemorosa* L. (L. Sch. 1777).

8. *Anemone ranunculoides* L. (L. Sch. 1777) fehlt nur an wenigen Orten, z. B. bei Ludwigslust.



7 + 8. *A. ranunculoidi-nemorosa* Kunze (Brockmüller 1853) im Neeser Holz bei Grabow, — ein Bastard.

*Adonis aestivalis* L. (T. 1795) ist einige Male unter der Winterfaat gefunden worden, aber ohne Zweifel eingeschleppt.

9. *Myosurus minimus* L. (L. Sch. 1777).

10. *Ranunculus hederaceus* L. (Link 1810). Im nordwestlichen Deutschland nicht selten, (schon in der Altmark, so wie im Geb. d. Floren von Hamburg und Lübeck häufig,) in M. aber nur erst bei Krakow (Huth) und beim Landfruge zw. Rostock und Ribnitz (Link) gefunden. — In M. Strelitz, Ufermark, Pommern, Preußen, Schlesien, Neumark und Mittelmark fehlt diese Pflanze. (S. 33. 39. 138).

11. *Ranunculus aquatilis* L. (L. Sch. 1777). Von dieser wandelbaren Art, über welche S. 10 und C. Griewank in Archiv 8, 181 zu vergleichen, sind bei uns unter anderen auch folgende Formen beachtet worden:

*β. paucistamineus* Tausch. (Sonder 1851) bei Rostock, Daffow! Grabow und wahrscheinlich noch viel weiter verbreitet, aber nicht beachtet.

*γ. marinus* = *tripartitus* Nolte, *confusus* Godr. (C. Griewank 1854, 1851!) am Daffower See in Brackwasser-Wiesengraben!

12. *Ranunculus fluitans* Lam. (Link 1795) bei Grabow in der Elbe, häufig im Daffower See (bis 12' lang) und wahrscheinlich auch noch in anderen meßb. Flüssen, aber nicht beachtet.

Anm. Die Daffower Ex. haben nur 5 (sehr selten 6) Blumenblätter, gehören also zu der Form, die Wirtgen im J. 1846 als eigene Species unter dem Namen *R. Bachii* aufstellte, im J. 1857

aber wieder eingezogen hat. Auch im Geb. der Flora Marchica ist nach Dietrich die Blumenkrone immer 5blättrig, bei Hamburg (nach Sonder) 6–10blättrig, während andere, z. B. Koch, ihr 9–12 Blätter zuschreiben. In diesem Punct läßt sich also der veränderliche Character der Pflanze nicht hinweglaugnen (vergl. S. 10 f.), und ich glaube, daß man nach unbefangener Prüfung demaleinst auch noch diese und vielleicht auch die folgende Art wieder einziehen, und als Varietäten des formenreichen *R. aquatilis* betrachten wird. — Als Nachtrag zu dem S. 10 ff. über die Wasserpflanzen gesagten, will ich noch erwähnen, daß auch Detharding sich schon auf dem Wege befand sie richtig zu würdigen, wie ich erst kürzlich aus einem seiner an Betcke gerichteten Briefe ersehen habe. Er schreibt im J. 1829 an denselben: „Die *Potamogeton*-Arten sind proteusartig, weil sie Wasserpflanzen sind.“

13. *Ranunculus divaricatus* Schrk. (Link 1795) durch ganz M.; er besitzt, wie mehrere *Chara*- und *Potamogeton*-Arten, die Eigenschaft Kalk abzuscheiden, und kommt z. B. hier bei Neubrandenburg, wo diese Art häufiger ist als die vorige, in der Tolense immer stark mit Kalk incrustirt vor.

Ann. Von dieser Art besitze ich in m. Herbarium eine behaarte Varietät, leider ohne Angabe des Fundorts; dieselbe steht dem *R. aquatilis* var. *hololeucus* Lloyd. parallel.

14. *Ranunculus Flammula* L. (L. Sch. 1777).

β. *reptans* F. Schultz.

Ann. Schultz sagt in der Fl. Starg. p. 141: *fateri non pudet me hanc varietatem olim pro R. reptante L. habuisse, usque dum vir aestumatissimus Dr. Link, specimine R. reptantis in alpihus Norvegicis lecti transmissio, errorem sustulit. Hic praecipue foliis omnibus linearibus differt, cum e contrario in varietate nostra folia caulina tantum linearia sint, radicalia vero ovato-lanceolata.*

15. *Ranunculus reptans* L. (Link 1810) am Mechower See (Link), am Lanfower See bei Schwerin (Wüstnei); auch bei Hamburg ist sie an der Elbe nicht

selten, so daß ihr Vorkommen im westl. M. nichts Auffälliges mehr hat. — Link sagt von seiner Pflanze, daß sie völlig mit Ex. übereinstimme, die er aus Lappland besitze (Lk. mscr.)

16. *Ranunculus Lingua* L. (L. Sch. 1777).

17. *R. auricomus* (L. Sch. 1777).

18. *R. acris* L. (T. 1788).

19. *R. lanuginosus* L. (T. 1788) z. B. bei Neubrandenburg sehr häufig! desgl. bei Goldberg u. a. D.

20. *R. polyanthemos* L. (Brück. 1803) z. B. bei Neubrandenburg! Wolkowsche Gypsmühle, am Strande bei Warnemünde u. f. w.

β. *nemorosus* DC. (Deth. 1828) am Rande der Neumühler Tannen bei Schwerin, und angeblich auch noch a. a. D.

21. *R. repens* L. (L. Sch. 1777).

22. *R. bulbosus* L. (L. Sch. 1777).

Anm. Nach der Beobachtung von F. Schultz (2. Nachtrag) verliert der Stengel seine knollenförmige Anschwellung mitunter vollständig.

23. *R. sardous* Crtz. (= *Philonotis* Ehr. T. 1795) z. B. bei Neubrandenburg! Sülz, Dierhagen auf d. Fischlande u. f. w.

\* 24. *R. arvensis* L. (L. Sch. 1777) mit dem Getreide auf kalkhaltigem Boden eingebürgert.

25. *R. sceleratus* L. (L. Sch. 1777).

26. *R. Ficaria* L. (L. Sch. 1777).

27. *Caltha palustris* L. (L. Sch. 1777). S. 36.

28. *Trollius europaeus* L. (L. Sch. 1777) auf den Wiesen im östlichen! und mittleren M. bis nach Pärchim hin weit verbreitet, im W. des Landes fehlend.

*Eranthis hiemalis* L. sp. (Vortisch 1850) auf dem Pfarrberge bei Satow unvw. Kröpelin verwildert; nicht bei Boizenburg, sondern bei Lauenburg.

*Helleborus viridis* L. (C. Griew. 1847, 1832! auf Bauerhöfen zu Lübbsee und Benkendorf im Klütger Ort verwildert. S. 126.

*Helleborus foetidus* L. (Link 1810) bei Gülstrow auf dem Schloßberge der Schöninsel verwildert.

29. *Aquilegia vulgaris* L. (T. 1788) selten in den Laubholzwaldungen bei Schwerin, Gülstrow, Malchin, Neugrandenburg, (vergl. S. 81)! Neustrelitz! und Schönhausen; durch Zufall mitunter (z. B. bei Daffow) zwischen der Saat verwildert. S. 138.

\* 30. *Delphinium Consolida* L. (L. Sch. 1777) in Gärten und auf den Feldern als Unkraut eingebürgert. S. 138.

31. *Aconitum Napellus* L. (Zander 1849) häufig bei Barkow unweit Plau in einem kleinen Erlenbruche, an welchem ein die Nemter Lübz und Plau scheidender Bach hinströmt und sich von S. her in die Elbe ergießt! hier anscheinend wild, aber bei Karlishof! unvw. Neustrelitz angepflanzt. S. 138.

32. *Actaea spicata* L. (T. 1788) an feuchten, schattigen Stellen der Laubholzwälder durch ganz M., aber nicht häufig, z. B. bei Neubrandenburg im Nemerower Holz! Wittenborn (bei Friedland) unweit des Kreidebruches! am Weisdiner Schloßberge, bei der rothen Kirche unvw. Woldeck, in den Ruinen der Papenhägener Kirche unvw. Rothenmoor! im Kemplinschen Holze, bei Pentzlin an der Burg und im Werderschen Garten (Betcke), bei Doberan in Buchwäldern, bei Schwerin, Parchim (auf dem Sonnenberge), bei Medow unvw. Doberlin, Klütz u. f. w. S. 138.



*Berberis vulgaris* L. (T. 1788) hin und wieder verwildert. Berberideae.

*Epimedium alpinum* L. (Brockmüller 1852) im Ludwigsfluster  
Schloßgarten beim Schweizerhause verwildert.

33. *Nymphaea alba* L. (L. Sch. 1777).

2. Nymphae-  
aceae.

34. *Nuphar luteum* L. sp. (L. Sch. 1777).

35. *Nuphar pumilum* Sm. (T. 1795) im See bei dem Schwinkendorfer Theerosen und in den beiden kleinen Langwitzer Seen unweit Bafedow! Außer diesen schon vor 65 Jahren von Timm angegebenen Standorten, sind bis jetzt noch keine anderweitigen in Mecklenburg bekannt geworden. — Auch in Neuvorpommern und im Geb. d. Fl. von Hamburg kennt man nur wenige vereinzelte Standorte, — wenn anders überhaupt die dortige Pflanze mit der unserigen identisch ist.

Anm. Nachdem Garcke (ed. 4) in neuester Zeit die vielen müßigen Species wieder eingezogen hat, in welche *Nymphaea alba* allmählig zersplittert worden war, hatte ich anfänglich Lust auch *N. pumilum* wieder mit der vorausgehenden Art zu verbinden, indem mir das Kennzeichen, worauf man hinsichtlich der Trennung beider besonders Gewicht zu legen pflegt (Gestalt der Narbe und Anzahl der Narbenstrahlen), wandelbar und daher unbedeutend erscheint. Bei genauerer Untersuchung meiner mecklenburgischen Exemplare, deren ich sowohl aus dem J. 1795 als auch vom J. 1859 besitze, fand ich bei diesen noch ein Merkmal, durch welches sich diese Art auffällig von *N. luteum* unterscheidet, nämlich die Blätter sind auf der unteren Fläche mit angedrückten Haaren bedeckt, wovon bei *N. luteum* nie eine Spur vorkommt. Auffällig ist es, daß von den vielen Floren, welche ich über diese Art zu Rathe gezogen habe, dies jedenfalls hier beständige Merkmal nur von einer einzigen erwähnt wird, nämlich von dem Comp. Florae Germaniae cur. Bluff et Fingerhuth, ed. 2 (1837) T. I P. 2 p. 237, wo von den Blättern gesagt ist, daß sie „subtus sericea“ seien. — Dies bringt mich auf die Vermuthung, daß in Deutschland mit dem Namen *N. pumilum* vielleicht

ganz verschiedene Dinge bezeichnet werden mögen, nämlich außer unserer Art auch noch eine kleinere Abart des *N. luteum*. Sollte dies der Fall sein, so muß der unserigen der Name *pumilum* bleiben, da er sich von Timm herschreibt, der dieselbe als *Nymphaea lutea* var. *pumila* bezeichnete.

3. *Papaveraceae*.

\* 36. *Papaver Argemone* L. (L. Sch. 1777).

\* 37. *Papaver Rhoeas* L. (L. Sch. 1777) S. 118.

\* 38. *Papaver dubium* L. (L. Sch. 1777).

*P. hybridum* L. (T. 1788) verirrt bisweilen hierher, indem es mit fremdem Saatkorn eingeschleppt wird. Timm fand es im vorigen Jahrhundert bei Malchin, Struck 1856 bei Kemplin! und 1854 ward es auch bei Bodela unweit Schwerin gesammelt. Es ist aber in seinem Vorkommen ebenso unbeständig, wie *Helminthia echioides*, *Centaurea solstitialis* und ähnliche sporadisch unter dem Getreide erscheinende Pflanzen.

Anm. *Glavcium luteum* L. sp., mit welchem uns die deutschen Floristen beschenken, (es soll an der Ostseeküste wachsen,) ist noch von keinem mecklenburgischen Botaniker gesehen worden. Möglich wäre es, daß es auch einmal hierher, wie nach der preussischen Küste, durch Schiffsverkehr verschleppt worden wäre.

\* 39. *Chelidonium majus* L. (L. Sch. 1777), eine allgemein eingebürgerte Ruderalpflanze, die hin und wieder auch mit gefüllten Blumen vorkommt. Vergl. S. 39. 118. 128.

4. *Fumariaceae*.

40. *Corydalis cava* Schw. et Körte (T. 1788) in Laubholzwaldungen durch ganz M., stellenweise sehr häufig!

41. *Corydalis intermedia* Ehrh. sp. (T. 1788) wie die vorige, sehr häufig!

42. *Corydalis solida* Sm. (Wüstnei 1854), nur bei Schwerin in der Nähe des Neumühler Sees im Gebüsch in wenigen Exemplaren gefunden. — Alle anderen von älteren Floristen angegebenen Standorte sind zu streichen, da sie nur auf einem von Schultz und Detharding veranlaßten Mißverständnisse beruhen.

Num. Welche Form hier übrigens vorliegt, ob die Stammart (die auch bei Hamburg vorkommt), oder die nach Turakka (in den Verhandlungen der K. K. botan. zool. Gesell. in Wien, Bd. 8. Sitz. Ber. S. 81) mit ihr als Abart zu verbindende *pumila* Host. (auf Hibdens-öe und Nützen gefunden), kann ich nicht entscheiden, da ich Wisluczi's Exemplare nur vor 6 Jahren einmal flüchtig gesehen habe. — Hinsichtlich der *C. pumila* Host. herrschen übrigens unter den Floristen große Meinungsverschiedenheiten; nach Meisrich und Sonder wäre sie der *C. intermedia*, nach Zabel aber der *C. solida* am nächsten verwandt, — sie scheint demnach zwischen diesen beiden Arten hin und her zu schwanken. Da nun aber diese letzteren selbst mit getheilten und ungetheilten Bracteen abändern, so wäre es im Hinblick auf diesen großen Formencyclus gar nicht unmöglich, daß Turakka Recht hätte, wenn er a. a. O. meint, daß alle jene drei angeblichen Arten nur eine einzige wirkliche Species bildeten. Die normalen Formen von *solida* und *intermedia* würden dann die beiden Endpunkte der ganzen Entwicklungsreihe bilden. Ich selbst habe *C. solida* nur einmal und zwar bei Bonn gefunden, und schon damals erschien mir ihre Abweichung von *intermedia* sehr unerheblich.

\* 43. *Fumaria officinalis* L. (L. Sch. 1777) überall als Unkraut mit und unter den Culturpflanzen eingebürgert. Vergl. S. 32. 118.

*F. densiflora* DC. (Röper 1850) wurde im J. 1847 auf der Ballaststelle bei Warnemünde durch Schiffsverkehr eingeschleppt gefunden. Auch bei Hamburg, Greifswald und Danzig hat sie sich an ähnlichen Localitäten gezeigt.

44. *Nasturtium officinale* R. Br., L. sp. (L. Sch. 1777). 5. Cruciferae.

45. *N. amphibium* L. sp. (L. Sch. 1777).

46. *N. sylvestre* L. sp. (T. 1788).

47. *N. palustre* Leys. sp. (Schultz 1806).

(45 + 46. 46 + 47) *N. anceps* DC. Unter diesem Namen kommen zwei Bastardbildungen vor, die zwischen den drei letztgenannten Arten hin und her schwanken. In den

Blüthen gleichen beide dem *N. sylvestre* am meisten, in den Blättern und dem ganzen Habitus aber nähern sie sich bald mehr dem *amphibium*, bald dem *palustre*. — De-  
tharding fand diese Pflanze an mehreren Stellen bei  
Kostock, später aber ist sie dort nicht wieder gesehen wor-  
den. Nach Wüstnei käme sie auch bei Schwerin vor.

48. *Barbarea vulgaris* R. Br. (L. Sch. 1777),  
häufig mit der folgenden Varietät, deren spezifische Selbst-  
ständigkeit Griewank sen. (Archiv VIII. S. 182) und jun.  
(Krit. Stud. S. 10) vertheidigen, verwechselt. Letzterer  
führt folgende Standorte an: Kostock am Pfeisenteich und  
bei Schoffin, Dassow a. m. D., in der Lewitz, Flotow  
bei Pentzlin, Neubrandenburg im Starg. Bruch.

*β. arcuata* Reichb. (Griew. 1854) bei Dassow,  
Schwerin, Wismar, Lehßen bei Wittenburg, Zahren bei  
Pentzlin (Griew. jun.).

49. *Barbarea stricta* Andr. (Griew. Willebr. 1847,  
1842!) Prieschendorf und Schwanbeck bei Dassow, zw. Crivitz  
und Schwerin, zw. Doberau und Bargeshagen, Wasdow  
bei Gnoien, Ruppentin bei Plau (Griew. jun.); auf den  
Peenewiesen bei Dargun (Zabel), in M. Strelitz noch  
nicht gefunden.

\* 50. *Barbarea praecox* R. Br. (Griew. 1854) mit  
Sicherheit nur erst bei Wilmsdorf unweit Dassow nach-  
gewiesen; alle übrigen älteren Angaben sind zu streichen,  
da sie auf Verwechslung mit den verwandten Arten beruhen.

51. *Turritis glabra* L. (L. Sch. 1777).

52. *Arabis hirsuta* L. sp. (Schultz 1806): um  
Neubrandenburg am Starg. Berge! und auf dem Datz-  
berge (sehr häufig 1859!), auf den Wällen der Ravens-



burg, im Nemerower Holz unweit des hohen Ufers!, ferner bei Kl. Nemerow, bei Rostock und Schwerin a. m. D. Ludwigslust im Garten der B. Gustava.

53. *Arabis arenosa* L. sp. (Beuthe 1828) in sandigen Gegenden bei Alt- und Neustrelitz, bei Boizenburg.

54. *Arabis Thaliana* L. (T. 1788.)

*A. pauciflora* Grimm spec. (= *A. brassicaeformis* Wallr.) wurde im J. 1829 und 31 von Detharding im Dorfe Papendorf unweit Rostock gefunden, ist aber seitdem in Mecklenburg nicht wieder gesehen worden (Griew. jun. S. 13).

55. *Cardamine Impatiens* L. (A. Brück. 1819) bei Neubrandenburg im Stargarder Bruch und Nemerower Holz vor dem hohen Ufer! im Steinfeld Holz am Pinnow See bei Schwerin; bei Boizenburg am Wege unfern der Pretiner Fähre.

56. *Cardamine parviflora* L. (Weidner 1860!) bei Sülz. Exemplare, welche ich von dieser Fundstelle erhielt, stimmen mit Reichenbachs Abbildung sehr gut überein, nur will ich nicht verhehlen, daß an den unteren Blattstielen die länglichen Blättchen nicht immer ganzrandig sind, sondern hin und wieder einen unregelmäßigen Zahn zeigen.

57. *Cardamine hirsuta* L. (A. Brück. 1819).

β. *sylvatica* Link 1809, in schattigen Wäldern, seltner als die Stammart, welche auf freien, grasigen Plätzen wächst.

58. *Cardamine pratensis* L. (L. Sch. 1777), kommt auch mit gefüllten Blumen vor, so wie auch

β. *hirsuta*, — nicht mit *C. hirsuta* L. zu verwechseln.

59. *Cardamine amara* L. (T. 1788.)

60. *Dentaria bulbifera* L. (T. 1788): bei Magdeburg häufig, bei Schwerin im Steinfeld der Holz (? sie fehlt in Wüsten's Verzeichniß), Malchin im Kalenschen Holz, am hohen Steinort bei Köbel, in den Strel. Laubholzwaldungen bei Friedland, Neubrandenburg! und Neustrelitz nicht selten.

*Hesperis matronalis* L. (T. 1788) hin und wieder als Gartenflüchtling verwildert.

\* 61. *Sisymbrium officinale* L. sp. (L. Sch. 1777), eingebürgerte Ruderalpflanze.

62. *Sisymbrium Sophia* L. (L. Sch. 1777).

63. *Alliaria officinalis* Andr. L. sp. (L. Sch. 1777).

\* 64. *Erysimum cheiranthoides* L. (T. 1788).

65. *Erysimum hieracifolium* L. (D. 1809) an der Elbe bei Gothmann und Bahlendorf unweit Boizenburg, wahrscheinlich durch die Elbe aus dem mittleren Deutschland stromabwärts geführt.

Aus der Gattung *Brassica* werden die Arten *oleracea* L., *Rapa* L., *Napus* L. und *nigra* L. cultivirt, und kommen hin und wieder auch verwildert vor.

\* 66. *Sinapis arvensis* L. (L. Sch. 1777), als lästiges Unkraut unter der Saat eingebürgert. S. 33. 36.

\* 67. *Sinapis alba* L. (Link 1795) cultivirt und verwildert unter dem Sommergetreide; in der Daffower Gegend vor 16 Jahren noch selten, jetzt ein ebenso lästiges Unkraut als die vorausgehende Art (C. Griew.).

*Diploxys tenuifolia* L. sp. von Deth. 1793 bei Warnemünde am Bauhof gefunden, durch Ballasterde dorthin verschleppt. Schon im J. 1809 war sie dort wieder verschwunden, hat sich aber neuerdings abermals dort und bei Rostock sporadisch gezeigt. Auf gleiche

Weise ist sie nach Greifswald, und *D. muralis* nach Stralsund, Wolgast, Swinemünde, Danzig und Memel verschleppt worden.

\* 68. *Alyssum calycinum* L. (Trevir. 1828) durch ganz M. verbreitet und stellenweise auf Mergelboden sehr häufig! — Ich möchte diese Pflanze für einen neueren Einwanderer halten, denn sie ist in den Gegenden von M. Strelitz, die früher von so eifrigen Botanikern wie die Brückner und F. Schultz so lange Jahre durchforscht worden sind, so häufig, daß sie, wenn sie hier damals schon vorhanden gewesen wäre, kaum hätte übersehen werden können.

69. *Alyssum incanum* L. (L. Sch. 1777) auf Sand-10.schollen und sandigen Hügeln durch M. verstreuet! obgleich nicht häufig; in der Neubrandenburger Gegend z. B. nur bei Warlin!

70. *Draba verna* L. (L. Sch. 1777). S. 41.

\* 71. *Cochlearia Armoracia* L. (L. Sch. 1777 fälschlich als *C. officinalis*), besonders an Flußufem durch ganz M. eingebürgert. Ueber den deutschen Namen vergl. S. 37.

72. *Cochlearia danica* L. (D. 1809) am Ufer des Breitlings a. m. St.; auf Pöl nordöstlich von dem Dorfe Vorwerk, bei Dreweskirchen und wahrscheinlich an der östlichen Seite der Wismarschen Bucht noch weiter verbreitet (Griew. jun.). Eine entschiedene Salzpflanze.

73. *Cochlearia anglica* L. (C. Griew. 1847, 1843! als *officinalis*) häufig auf den Salzwiesen bei Sülten zwischen Brüel und Sternberg, desgl. auf Pöl (nordöstlich) von Vorwerk), an der Wismarschen Bucht dicht hinter St. Jacob; bei Brook unweit Klütz?

Ann. Ich muß gestehen, daß ich, seit mir zahlreichere Exemplare von den drei erstgenannten Standorten durch C. Griewank und Wüßmei zugekommen sind, an der von G. Griewank (Krit. Studien S. 16 f.) vorgenommenen und auch von mir früher vertheidigten Vereinigung von *C. anglica* und *officinalis* (unter dem Namen *C. Linnaei* G. Griew.) wieder irre geworden bin. So viel steht jedenfalls fest: wir kennen aus Mecklenburg bis jetzt nur eine einzige Art mit sitzenden, stengelumfassenden Blättern, und zwar ist dies, wie die normal entwickelten Exemplare zeigen, sicherlich *anglica*. Was aber die früher als *officinalis* beanspruchten Exemplare betrifft, so nähern sich dieselben dieser Art allerdings etwas, behalten aber doch in der Gestalt ihrer Schötchen, namentlich der unteren, vollkommen entwickelten, immer überwiegend den Typus der *anglica*. Exemplare, deren Schötchen alle so kugelig und klein wären, wie Reichenbach in der Iconographie Nr. 4260 sie abbildet, sind mir aus M. noch nicht zu Gesichte gekommen. Ich möchte daher glauben, daß uns die wahre *C. officinalis* in M. zur Zeit noch fehlt, und daß unsere pseudo-*officinalis* von Sükten nur durch entweder zu stark salzhaltigen oder durch sterilen Standort verkümmerte Exemplare der *anglica* sind. Auch andere Halophyten, wie z. B. *Statice Limonium* und *Aster Tripolium*, erreichen im Binnenlande um die Salzquellen lange nicht die Leppigkeit in ihrer Entwicklung, welche sie am See-Strande auf günstigen Standorten zeigen.

\* 74. *Camelina sativa* L. sp. (L. Sch. 1777) auf Meckern, besonders Flachsfeldern, vielfach eingebürgert.

β. *dentata* Pers (D. 1809) als Unkraut auf Flachsfeldern.

Ann. *C. microcarpa* Andr. ist in M. noch nicht gesehen worden; auch im Gebiete der Flora von Hamburg kommt sie nicht vor, eben so wenig wie bei Lübeck, und in Neu-Vorpommern ist sie erst neuerdings bei Rennitz unv. Greifswald auf Saatäckern eingeschleppt. G. Meyer hat also nicht Recht, wenn er in seiner Fl. excur. Hannov. behauptet, daß sie in Norddeutschland häufiger sei, als *sativa*.



\* 75. *Thlaspi arvense* L. (L. Sch. 1777) auf Aedern allgemein eingebürgert.

\* 76. *Thlaspi campestre* L. (Thede 1806) auf Aedern eingebürgert, z. B. bei Daffow, Grabow, Rostock u. s. w.; in M. Strelitz noch nicht gefunden.

77. *Teesdalea nudicaulis* L. sp. (L. Sch. 1777).

78. *Lepidium ruderale* L. (T. 1791) am Seestrand und um Salinen, aber auch als Ruderalpflanze vorkommend, z. B. bei Rostock, Wismar und Dömitz. Diese Pflanze wird zwar schon im J. 1777 von L. Schulz unter den M. Strelitzschen aufgeführt, ist aber ebenso, wie auch *Thalictrum flavum* und *Erica Tetralix*, wohl irthümlich von ihm aufgenommen, da kein anderer Botaniker diese Pflanzen hier gefunden hat.

\* 79. *Lepidium sativum* L. (G. Brück. 1841), unter Rein z. B. bei Daffow, A. Krenzlín, Kenow u. a. D. eingebürgert.

*Lepidium latifolium* L. (Flörke 1806), verwildert; früher bei Warnemünde und auf dem Hofe zu Lübbersdorf unweit Friedland, von welchem letzteren Standorte ich ein schon im J. 1793 gefundenes Exemplar in mein Herbarium besitze.

80. *Capsella Bursa pastoris* L. sp. (L. Sch. 1777).

β. *integrifolia* Reichb.

\* 81. *Senebiera Coronopus* L. sp. (T. 1788) soll aus Sibirien stammen, aber eingebürgert in und bei Daffow, bei Wölschendorf unvw. Nehna, bei Güstrow (?) Malchin an der Kirche und vor den Thoren, Quadenschönfeld unvw. Stargard und wahrscheinlich auch noch a. a. D.

\* 82. *Neslea paniculata* L. sp. (T. 1788) auf Aedern unter der Saat eingebürgert.

*Bunias orientalis* L. ist durch Schiffsverkehr nach Rostock und Warnemünde verschleppt.

83. *Cakile maritima* Scop.; L. sp. (T. 1788) See-  
strandspflanze.

84. *Crambe maritima* L. (T. 1791) desgl., aber  
selten: am heil. Damme bei Rethwisch, auf den hohen  
Dünen zwischen Warnemünde und Markgrafenheide (Orlew.  
sen. 1854), und neuerdings auch auf dem Fischlande  
zwischen Dierhagen und Wustrow von Hrn. Holz in Barth  
gefunden. — Diese Pflanze scheint in neuerer Zeit in M.  
seltener zu werden, wie dies auch an der deutschen Nord-  
seeküste der Fall sein soll.

\* 85. *Raphanus Raphanistrum* L. (L. Sch. 1777),  
ein bekanntes lästiges Unkraut im Getreide, von der äh-  
nlichen *Sinapis arvensis* schon aus der Entfernung durch  
die hellgelben Blüthen zu unterscheiden. S. 36.

6. Cistineae. 86. *Helianthemum vulgare* L. sp. (L. Sch. 1777)  
auf sonnigen Hügeln durch ganz M.!

7. Viola-  
riaceae. 87. *Viola palustris* L. (L. Sch. 1777), besonders  
häufig in der Heideebene.

88. *Viola epipsila* Ledeb. (F. Koch 1857 in Archiv  
XII S. 2) im Mütschower Bruche unweit Sülz! und auch  
in Pommern in den Brüchern an der Recknitz und Trebel.  
Auch bei Hamburg und in Neuvorpommern kommt sie vor.

*V. uliginosa* Schr. (Ackerm. 1841) wurde ein einziges Mal  
bei Grabow auf den Wiesen hinter der Ziegelscheune gefunden und  
seitdem nicht wieder, so viel auch darnach gesucht worden ist. Daher  
kann sie das Bürgerrecht in unserer Flora noch nicht beanspruchen,  
zumal da ihr Vorkommen in diesem Theile Norddeutschlands ein  
ganz isolirtes ist.

89. *Viola hirta* L. (A. Brück. 1803) in Laubholz-

waldungen durch M.! jedoch im Gebiete der Grabower Flora fehlend.

Ann. Sie verändert sich weder durch Verpflanzung noch durch Aussaat, und es ist mir daher völlig räthselhaft, wie einige Floristen sie mit der folgenden Art haben vereinigen können. Beide sind hier bei Neubrandenburg häufig, Zwischenformen habe ich nie bemerkt, und selbst der Anfänger in der Botanik wird sie nicht verwechseln.

\* 90. *Viola odorata* L. (L. Sch. 1777), ohne Zweifel nur durch Verwilderung eingebürgert, und stellenweise sehr häufig, wie z. B. auf den Neubrandenburger Stadtwällen! bei Pletz unweit Friedland am Mühlenbache! u. s. w. S. 118. 138.

91. *Viola sylvestris* Lam. (L. Sch. 1777).

β. *Riviniana* Reichb. (Schultz 1837).

92. *Viola canina* L. (D. 1828) in den sandigen Gegenden und im Haidegebiete die häufigste Art dieser Gattung! S. 138.

β. *sabulosa* Reichb. von Willebrand auf einem Sandhügel zw. Jasnitz und Strohkirchen gefunden.

γ. *ericetorum* Schr. (Griew. sen. 1855) im Tannenzuschlag zw. Nohlsdorf und Strömkendorf unweit Wismar.

δ. *lactea* Reichenb. Icon. f. 4507! (Meyer 1828) in der Umgegend von Grabow an mehreren Orten.

Ann. Ich glaube, daß Sonder, C. Griewank (Archiv 8, 179) und Garcke (ed. 4) Recht haben, wenn sie die *V. lactea* an die Formenreihe der vielgestaltigen *V. canina* L. anschließen.

93. *Viola mirabilis* L. (Crome 1828) in Laubholzwaldungen durch M. zerstreuet, hier bei Neubrandenburg z. B. im Nemerower Holz sehr häufig! Weisdin, Bruders-

dorf, Doberan, Schwerin, Ludwigslust, Redefin; fehlt bei Güstrow.

94. *Viola tricolor* L. (L. Sch. 1777). S. 118. 138.

β. *arvensis*.

γ. *syrtica* Flörke (*succulenta*) am Ostseestrande.

Außer diesen 8 Arten führt F. Schultz in seinem zweiten Nachtrage zum Prodrromus noch eine am Wege von Granzin nach Mirow gefundene *V. persicifolia* Roth. an. Da ich diese später nicht wieder gefundene Pflanze nicht gesehen habe, so muß einstweilen dahin gestellt bleiben, ob dies die echte *V. persicifolia* Schk. sei. Aufschluß darüber kann nur Schulze's in Rostock befindliches Herbarium geben.

8. *Reseda-  
ceae.*

\* 95. *Reseda luteola* L. (L. Sch. 1777) früher als Farbpflanze cultivirt und daher auf Dorf-Kirchhöfen u. a. Localitäten hin und wieder eingebürgert.

*R. lutea* L. (T. 1788) an einigen Küstenpunkten vom Auslande her eingeschleppt: bei Warnemünde (dort aber im J. 1809 schon wieder vergebens gesucht), auch bei Rakow unweit Kröpelin. — Bei Schwerin aber, wo Meyer sie angiebt, kommt sie gar nicht vor, sondern wurde dort mit einem Gartenslüchtling der *R. alba* verwechselt. — Auch in Neuvorpommern nur auf dem Wiekler Ballastplage unweit Greifswald.

9. *Drosera-  
ceae.*

96. *Drosera rotundifolia* L. (L. Sch. 1777) häufig auf Torfwiesen und in Fennbrüchern! S. 138.

Anm. Mit letzterem Namen bezeichnet man in M. Sümpfe mit schwimmender Pflanzenbedeckung; es ist dies ein echtes altes deutsches Wort, welches sich auch noch in der englischen Sprache in dem Worte fen (Sumpf, Morast) erhalten hat.

97. *Drosera intermedia* Hayne (F. Schultz 1806) bei Grabow, Ludwigslust! Parchim, Schwerin, Dassow, Ballin unweit Stargard.

98. *Drosera anglica* Huds. (L. Sch. 1777) weiter



verbreitet, als die vorige: bei Dassow (viel seltener als die beiden vorhergehenden), Schwerin, Güstrow, auf der Basedower Wiese bei Malchin, Pentzlin auf den Burgwiesen und im Moore auf dem Felde bei Siehdichum, Neustrelitz, Neubrandenburg! Krumbek u. s. w.; in der Haideebene aber, wo die vorige nicht selten ist, scheint diese Art ganz zu fehlen.

99. *Parnassia palustris* L. (L. Sch. 1777) weit verbreitet, sogar auf Strandwiesen bei Dassow und Warnemünde.

100. *Polygala vulgaris* L. (L. Sch. 1777).

10. Polygaleae.

β. *comosa* Schk. (Boll 1855) sehr häufig bei Neubrandenburg auf dem Gerichtsberge! und auf Hügeln am Kupfermühlengraben! wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Stammart aber von den früheren Botanikern übersehen; neuerdings hat sie Betcke auch bei Pentzlin am Räuberberge gefunden, und ohne Zweifel ist sie auch noch viel weiter durch M. verbreitet.

101. *Polygala amara* L. (Giesebr. 1837) und zwar die Var. *uliginosa* Reich. bei Mirow, aber selten; da sie auch in dem benachbarten Vorpommern wächst (z. B. bei Anclam! und Greifswald), so hat dieser vereinzelte mecklenburgische Standort nichts Auffälliges.

102. *Gypsophila muralis* L. (T. 1788) soll nach Detharding im nördlichen M. fehlen, sonst durch das ganze Land verstreuet, wenn auch nicht häufig.

11. Sileneae.

103. *Dianthus prolifer* L. (T. 1788) z. B. auf dem Kirchhofe zu Pentzlin (Betcke), Belvedere bei Neubrandenburg! u. s. w.

104. *Dianthus Armeria* L. (T. 1788) bei Dassow

a. m. D., bei Schwerin unter Gebüsch an der Chaussee nach Neumühl, bei Parchim, Güstrow auf der Schöwinfel, Malchin im Gränzgraben nach Duchow zu und auf den Peeneanhöhen bei Pinnow, Burg-Schütz, Pentzlin am hohen Seenufer, Neustrelitz am hohen Holz, Woldeck an der Wolfshagener Gränze; Neubrandenburg auf Belvedere und im Nemrower Holz hinter dem hohen Ufer! auf dem äußeren Walle des Stargarder Schloßberges!

105. *Dianthus Carthusianorum* L. (T. 1788).

106. *Dianthus deltoides* L. (L. Sch. 1777).

107. *Dianthus superbus* L. (T. 1788) auf den Elbewiesen, bei Schwerin, Wismar, Güstrow, und im östlichen M. nicht selten!

Ann. — *D. arenarius* L. wird zwar von Detharding (1809 und 1828) als von Zimm bei Fürstenberg gefunden aufgeführt, ist aber weder in Zimm's Herbarium vorhanden, noch auch in dessen mit Papier durchschossenem Handexemplar seines Prodrömus, in welchem er alle späteren Entdeckungen eingetragen hat, erwähnt. Da nun für diese Angabe auch keine anderweitige Bestätigung vorliegt, muß diese Art einstweilen noch aus der Zahl unserer Pflanzenbürger ausgeschlossen bleiben, obgleich mir ihr Vorkommen in jener Gegend gar nicht unwahrscheinlich ist: denn Sand giebt es dort genug, und überdies liegt der Verbreitungsbezirk dieser dem nordöstlichen Deutschland angehörigen Art jenem Landestheile nahe. — Bei Stargard (Langmann) kommt *D. arenarius* ganz gewiß nicht vor. — Dagegen sind aber einige Male verirrte Exemplare von *D. barbatus* in den Wäldern bei Neubrandenburg gefunden worden.

\* 108. *Saponaria officinalis* L. (L. Sch. 1777) häufig eingebürgert.

*S. Vaccaria* L. ward im J. 1806 von Siemssen zwischen der Saat bei Wendorf unweit Güstrow gefunden, — ob nur zufällig dorthin verirrt, oder bleibend eingebürgert? Erstere Annahme ist mir

die wahrscheinlichere, da die Pflanze auch in der Uckermark (wo sie hin und wieder auf Flachsfeldern vorkommt,) unbeständig ist.

109. *Cucubalus baccifer* L. (Meyer 1836) wurde bisher nur einmal bei Zunker-Wehningen unweit Dömitz von Meyer (was Griewank sen. bestätigt,) gefunden, da er aber auch in der anstoßenden Uckermark und Prignitz zwischen Wittenberge und Seehausen, bei Tangermünde und Havelberg im Gebiete des Elbufers vorkommt, hat jener vereinzelt mecklenburgische Standort nichts Auffallendes. Weiter abwärts an der Elbe, im Geb. der Hamburger Flora scheint diese Pflanze nicht mehr zu wachsen.

110. *Silene Olites* L. sp. (T. 1788).

111. *Silene inflata* Sm. (L. Sch. 1777).

112. *Silene nutans* L. (L. Sch. 1777).

*S. Armeria* (Schreib. 1853) hin und wieder als Gartensflüchtling verwilbernd. Ebenso auch

*S. conica* L. (Griew. jun. 1856).

113. *Lychnis Viscaria* L. (T. 1788).

114. *Lychnis flos cuculi* L. (L. Sch. 1777).

115. *Melandrium album* Mill. sp. (T. 1788).

116. *Melandrium rubrum* Weig. sp. (T. 1788).

*M. noctiflorum* L. sp. (D. 1828) mitunter in Gärten und auf Saatsfeldern eingeschleppt.

\* 117. *Agrostemma Githago* L. (L. Sch. 1777) mit dem Getreide eingebürgert.

118. *Sagina procumbens* L. (L. Sch. 1777).

119. *Sagina maritima* Don. (D. 1828) am See-  
strande auf Torfwiesen bei Warnemünde häufig, desgleichen an der Wismarschen Bucht, und am Prival, und wahrscheinlich überall an ähnlichen Localitäten unserer Küste.

120. *Sagina apetala* L. (D. 1828) bei Schwerin

12. Alsi-  
neae.

am faulen See, auf Weideschlägen bei Daffow nicht selten, und ohne Zweifel auch noch viel weiter durch M. verbreitet, aber ihrer Kleinheit wegen übersehen.

β. *depressa* F. Schultz 1819 (glabra Babing. sec. Sonder) bei Neubrandenburg auf dem Brodaer Felde nach Belvedere zu von Schulz entdeckt, von mir jedoch dort später vergebens gesucht.

121. *Sagina nodosa* L. sp. (L. Sch. 1777).

122. *Spergula arvensis* L. (L. Sch. 1777). S. 37.

β. *maxima* Weihe (C. Griew. 1855) bei Daffow häufig, aber ausschließlich auf Leinfeldern.

123. *Spergula pentandra* L. (Brück. 1803), und zwar die Form, welche man jetzt unter dem Namen *Sp. Morisonii* Bor. als eigene, von der Stammform zu trennende Species betrachten will.

124. *Spergularia rubra* L. sp. (L. Sch. 1777).

β. *media* Wahlb. (Link 1795) auf salzhaltigen Wiesen am Strande und um Salinen.

γ. *marginata* Koch (D. 1828) am Seestrande seltener als var. β; bei Wustrow auf dem Fischlande auch am Binnenstrande (Zabel).

Ann. — Geseht doch Fries in der Summa veget. p. 156 selbst von diesen und noch einigen anderen schwedischen Formen zu: „omnes nostrae hujus generis formae sistunt seriem contiguam, cum soli salsitudine magis pinguescentem,“ und dennoch trennt er sie als Arten, weil singula species adeo constans sei, ut omnes distinguere utile videatur, ne diversae confundantur. Diesem zu weit getriebenen „Nützlichkeitsprincip“ zu huldigen, kann ich mich nicht entschließen. Vergl. C. Griewant im Archiv VIII, 180, welcher wenigstens der *S. marginata* die Selbstständigkeit abspricht.



125. *Honckeya peploides* L. sp. (T. 1788) am  
Seeſtrande häufig.

126. *Alsine tenuifolia* L. sp. (F. Schultz 1819).

β. *viscosa* Schreb. kommt nach Schultz mit der  
Stammform gemischt und in dieſe übergehend vor, z. B.  
bei Neubrandenburg, deſgl. auf Brachäckern bei Daſſow.

127. *Moehringia trinervia* L. sp. (T. 1788).

128. *Arenaria serpyllifolia* L. (T. 1788).

129. *Holosteum umbellatum* L. (L. Sch. 1777).

130. *Stellaria nemorum* L. (L. Sch. 1777).

131. *Stellaria media* L. sp. (L. Sch. 1777). S. 37.

132. *Stellaria Holostea* L. (L. Sch. 1777).

133. *Stellaria glauca* With. (Schultz 1806).

134. *Stellaria graminea* L. (L. Sch. 1777).

135. *Stellaria uliginosa* Mur. (T. 1788).

136. *Stellaria crassifolia* Ehr. (T. 1788). — Da  
ſie mitunter mit der vorigen verwechſelt ſein mag, ſo be-  
dürfen ihre von unſeren Floriſten angegebenen Standorte  
einer Reviſion. Als ſichere kann ich nennen: bei Malchin  
die Wieſe hinter dem Jägerhauſe, bei Neubrandenburg die  
Wieſe hinter der Ruhweide, die Pfarrwieſe bei Eichhorſt,  
bei Schwerin die Wieſe bei dem alten Pulverthurm, bei  
Neumühl, bei Daſſow auf der Torfwieſe am Priwal ganz  
nahe am Seeſtrande unter *Phragmites communis*.

137. *Malachium aquaticum* L. sp. (L. Sch. 1777).

138. *Cerastium glomeratum* Thuil. (L. Sch. 1777).

β. *ovatum* Pers.

139. *Cerastium semidecandrum* L. (T. 1788).

β. *glandulosum* Koch (*glutinosum* Fr.)

γ. *glaberrimum* von Prahl b. Güſtrow gefunden.

140. *Cerastium triviale* Lk. (T. 1791).

141. *Cerastium arvense* L. (L. Sch. 1777).

Anm. Ob das von Langmann recipirte *C. brachypetalum* Desp. in M. vorhanden sei, ist noch sehr zweifelhaft.

19. Elati-  
neae.

142. *Elatine Hydropiper* L. (Link 1810) am Meechower See im Ratzeb., an der Süde bei Gothmann, am See zu Hörst bei Tessin, im Rahmenfelder See unweit Pentlin! nicht bei Ludwigslust!!

143. *Elatine Alsinastrum* L. (Link 1810) am Meechower See im Ratzeb., früher auch in einem Söll bei Wulkenzin (unw. Neubrandenburg) nach den ersten Tannen zu, seit 1830 aber verschwunden, weil das Wasserloch völlig ausgetrocknet ist und meistens als Acker benutzt wird (Betche).

Anm. Die Angabe über das Vorkommen der *E. triandra* (Archiv VI. S. 111) in M. hat Willebrand wieder zurückgenommen.

14. Lineae.

144. *Linum catharticum* L. (L. Sch. 1777); auch auf Strandwiesen bei Dassow und Warnemünde.

145. *Radiola linoides* L. sp. (T. 1788).

15. Malva-  
ceae.

146. *Malva moschata* L. (C. Griew. 1854) wurde nur einmal im J. 1838 bei Prieschendorf unweit Dassow gefunden, seitdem nicht wieder; an a. D. vielleicht nur übersehen, da sie auch in den Nachbarländern nicht selten zu sein scheint.

147. *Malva Alcea* L. (T. 1788).

β. *Dethardingii* Link 1810.

Anm. — Eine auffallende Form, welche Link für eine neue Art hielt. Er sagt in s. Mscr.: „Dr. Dr. Detharding hat dieselbe zu A. Karin und Petshow gefunden. Sie unterscheidet sich von *Alcea* durch die schmalere Blättchen und die etwas behaarten Samenbehälter; von *moschata* durch die breiteren äußeren Kelch-

Blätter und die sternförmig angebrückten Haare. Der Stamm ist 5 bis 6 Fuß hoch, grün, nicht bläulich, wie bei *Alcea*, so wie Blätter und Kelch mit sternförmigen Haaren bedeckt. Die Wurzelblätter sind rund, bis  $\frac{1}{3}$  oder  $\frac{2}{3}$  fünffach gespalten, die Blättchen sind 2 bis 3<sup>'''</sup> breit, wo sie am breitesten sind gefiedert eingeschnitten, Die Blüthen sitzen in Büscheln; die äußeren Kelche bestehen aus drei 2<sup>'''</sup>, und darüber, breiten Blättern. Die Blumen sind röthlich, wie an *Alcea* gestaltet. Die Samen haben auf ihrer oberen Kante einzelne kurze Haare. Sie blühet mit *Alcea*.“ — Außer Detharding und Fink scheint noch Niemand diese Pflanze beachtet zu haben. Sollte sie vielleicht ein Bastard von *Alcea* und *moschata* sein?

148. *Malva sylvestris* L. (L. Sch. 1777) in M. allgemein verbreitet; die Früchte dieser und der folgenden Art sind die „Pöppelkäse“ der spielenden Kinder. S. 33. 118.

*M. mauritiana* L. kommt hin und wieder als Flüchtling aus den Gärten vor. — *M. crispa* L. (T. 1795) früher bei Malchin verwildert, ist wieder verschwunden.

149. *Malva neglecta* Wallr. (L. Sch. 1777).

β. *litoralis* Deth. (1828) mit etwas größeren Blumenblättern, am sandigen Seestrande bei Warnemünde.

150. *Malva rotundifolia* L. = *borealis* Wallm. (D. 1828) bei Rostock und Warnemünde häufig, auf der Insel Pöl; außer den Küstengegenden aber nur noch bei Dömitz und Broda an der Elbe gefunden.

151. *Althaea officinalis* L. (D. 1797) hat eine ähnliche Verbreitung, wie die vorhergehende, nämlich am Seestrande bei Wustrow, Markgrafentheide und Schnatermann, aber auch am Elbufer (A. Schmidt). S. 118.

152. *Tilia platyphyllos* Scop. = *grandifolia* Ehr.<sup>16. Tiliaceae.</sup> (L. Sch. 1777). Sie ist außer den in den Diagnosen

angegebenen Kennzeichen auch durch früheren Laubausschlag, frühere Blüthezeit und dichtere Belaubung von der folgenden unterschieden, wie ich durch jahrelange Beobachtung bestätigt gefunden habe. S. 118.

153. *Tilia ulmifolia* Scop. = *parvifolia* Ehr. (T. 1788). Ueber die großen meßb. Linden vergl. S. 75.

(152 + 153) *T. intermedia* DC. (D. 1828), ein häufig angepflanzter Bastard der beiden vorigen.

17. Hypericaceae. 154. *Hypericum perforatum* L. (L. Sch. 1777). S. 118.

155. *Hypericum humifusum* L. (L. Sch. 1777).

156. *Hypericum quadrangulum* L. (L. Sch. 1777).

157. *Hypericum tetrapterum* Fr. (Brück. 1803).

158. *Hypericum pulchrum* L. (Hahn 1809) zwischen Boizenburg und Wittenburg bei Tüschow in den Tannen, und im Holz am Wege von Tüschow nach Schildfeld; in einem Gehölz bei Travemünde.

159. *Hypericum montanum* L. (T. 1788).

160. *Hypericum hirsutum* L. (C. Griew. und Willbr. 1847. 1841!) in einem Gehölz zwischen Lütjenhof und Prieschendorf unv. Dassow.

18. Acerineae. 161. *Acer campestre* L. (T. 1788). Vergl. S. 29.

162. *Acer Pseudo-Platanus* L. (L. Sch. 1777).

163. *Acer platanoides* L. (T. 1788). Alle drei Arten nicht selten in den Wäldern, die beiden letzteren auch häufig angepflanzt. S. 36.

19. Geraniaceae. 164. *Geranium pratense* L. (Thede 1806) auf Wiesen bei Boddin im N. Wittenburg, bei Tschentin unweit Ludwigslust, am Bögenteich bei Rostock. — Auch im Geb. der Flora von Hamburg a. m. D.



165. *Geranium palustre* L. (T. 1788).

166. *Geranium sanguineum* L. (Blandow 1809) bei Waren, Grabow auf den Karstädter Bergen, am hohen Ostseufer bei Markgrafenheide fast bis nach Graal hinunter; bei der Wolkowschen Gypsmühle unweit Dargun (Zabel); Neustrelitz beim Schützenhause und bei Zierke.

167. *Geranium pusillum* L. (L. Sch. 1777).

168. *Geranium dissectum* L. (T. 1788) durch ganz M., auch in der Haideebene (C. Griew.).

169. *Geranium columbinum* L. (T. 1788) desgl.

170. *Geranium molle* L. (L. Sch. 1777).

171. *Geranium Robertianum* L. (L. Sch. 1777).

Vergl. S. 119.

Anm. Das nur durch Link (1795) und Bredow (1809) vertretene *G. sylvaticum* L. (welches nach letzterem bei Parchim vorkommen soll,) bedarf wohl noch einer weiteren Befestigung, da es in neuerer Zeit nie wieder gesehen worden ist. Gartenflüchtlinge sind *G. phaeum* L. im Ludwigsluster und Kempliner Park, und *G. pyrenaicum* L. auf einem großen Rasenplatz des Lindengartens zu Wismar, wo Griewank sen. es 1855 in großer Menge fand, so wie auch bei Rostock, wo es in den Anlagen vor dem Kröpeliner Thore vorkommt (Griew. jun.). — Auch *Erodium moschatum* L. sp. (Landt 1837) ist bei Mirow wohl nur verwildert.

172. *Erodium cicutarium* L. sp. (L. Sch. 1777).

173. *Impatiens Noli tangere* L. (T. 1788). S. 138. 20. Balsamineae.

174. *Oxalis Acetosella* L. (L. Sch. 1777). Vergl. 21. Oxallideae.

S. 33. 36.

\* 175. *Oxalis stricta* L. (T. 1788 als *corniculata*!) als Gartenunkraut an mehreren Orten eingebürgert, z. B. bei Bierhof unweit Boizenburg! Grabow, Ludwigslust, Daffow, Güstrow, bei Neustrelitz am inneren Rande des Thiergartens (Beuthe).

\* 176. *Oxalis corniculata* L. (A. Brück. 1803) wie die vorige, aber seltener: bei Neubrandenburg! Malchin, Boizenburg? — Beide Arten sollen aus Amerika stammen.

22. *Celastrineae*.

177. *Evonymus europaeus* L. (L. Sch. 1777).

Vergl. S. 39. 138.

23. *Rhamnaceae*.

178. *Rhamnus cathartica* L. (L. Sch. 1777).

S. 41. 119. 138.

179. *Rhamnus Frangula* L. (L. Sch. 1777). S. 32.

39. 119. 138.

24. *Papilionaceae*.

180. *Ulex europaeus* L. (Becker 1791) an trockenen, sandigen Orten bei Elmendorst, Klitz, Schöpsin,

zwischen Hagenow und Wittenburg, bei Grabow, Parchim, Gneven und Gudebehn unweit Krivitz, Reinshagen unv. Güstrow, zw. Satow und Berendshagen, bei Gr. Ruffewitz unv. Rostock, Gorew unv. Kröpelin, Briggow unv. Stavenhagen und Neustrelitz am Glambeker See.

181. *Sarothamnus scoparius* L. sp. (L. Sch. 1777).

Vergl. S. 33. 138.

182. *Genista pilosa* L. (T. 1795) im Haide- und

Sandgebiet häufig!

183. *Genista tinctoria* L. (L. Sch. 1777) durch

ganz M., sogar am Strande bei Daffow und Warnemünde. Vergl. S. 33. 119.

*β. ovata* Schultz (1837): foliis ovatis obovatisque, mucronatis, glabriusculis, caule decumbente, basi divaricato-ramoso, leguminibus strigoso-pubescentibus“, — nach Schultz vielleicht eine selbstständige Art, wurde bei Mirrow gefunden. Mir ist sie unbekannt.

184. *Genista germanica* L. (T. 1788).

185. *Genista anglica* L. (Link 1805) in der Haideebene häufig! aber auch bei Daffow, Mönchsweden unv. Doberan, Kritzenow unv. Rostock, und in den Röver Tannen bei Güstrow; in M. Strelitz noch nicht gefunden.

*Cytisus nigricans* L. (Beckmann 1853) bei Lutterstorf unweit Wismar, ist ein Flüchtling aus dem dortigen herrschaftlichen Garten (Griew. jun.).

186. *Ononis spinosa* L. (L. Sch. 1777). S. 37. 419.

β. *angustifolia*, ästiger, dichter beblättert, viel weniger behaart und mit zahlreicheren doppelten Dornen, bei Warnemünde und Dietrichshagen, aber auch auf den Elbdeichen bei Dömitz!

187. *Ononis repens* L. (T. 1788: *arvensis*). S. 119.

β. *inermis* (mitis Gmel.).

*Ononis arvensis* L. = *hircina* Jacq. (Zachariae 1828). Griewant jun. (Krit. Studien S. 22) tritt meinen in Archiv II. S. 63 ausgesprochenen Zweifeln an der Richtigkeit der Angaben unserer älteren Floristen über das häufigere Vorkommen dieser Art in M. bei, und beschränkt dasselbe nur auf einen einmaligen Fund derselben an der Elbe bei Boizenburg, wohin diese Pflanze vielleicht durch Zufall verschlagen sein möge. Auch Link versichert in f. Mscr. diese Art nie in M. gesehen zu haben, und ich glaube kaum, daß wir ihr das Bürgerrecht in unserer Flora ertheilen dürfen, da sie auch in den benachbarten Floren entweder ganz fehlt (wie z. B. im Gebiete von Hamburg, in Neuvoipommern und Aliggen), oder wenigstens nicht sicher beglaubigt ist.

188. *Anthyllis vulneraria* L. (L. Sch. 1777).

β. *maritima* Schweig. (*pubescens*) am Seestrb.

189. *Medicago falcata* L. (T. 1788).

β. *major* (*procumbens* Bess.).

190. *Medicago lupulina* L. (L. Sch. 1777.)

β. *Wildenowiana* bei Güstrow.

191. *Medicago minima* L. (T. 1788) feltener als die beiden vorigen, bei Grabow und Schwerin fehlend.

*M. sativa* L. (Deth. 1809) die Luzerne, cultivirt und selten verwildert. Auch *M. maculata* Willd. wurde im Sommer 1855 bei Warnemünde an einer Stelle gefunden, wo im vorausgehenden Winter französischer Ballast ausgeladen war (Griew. jun. S. 8).

192. *Melilotus dentata* Pers. (Wüst. 1856) auf Poel am Kirchsee bei Kirchdorf ziemlich dicht am Rande des Wassers wachsend; auf Salzwiesen bei Warnemünde schon von Detharding gefunden, aber von ihm fälschlich als *M. arvensis* Wallr. bestimmt.

193. *Melilotus macrorrhiza* Pers. (L. Sch. 1777) fehlt bei Grabow und Schwerin. S. 119.

194. *Melilotus officinalis* Desr. (Langm. 1841) bei Daffow, Schwerin u. a. D. an Wegen.

\* 195. *Melilotus alba* Desr. (T. 1788) soll aus Sibirien stammen, und wäre demnach nur eingebürgert.

\* 196. *Trifolium pratense* L. (L. Sch. 1777) cultivirt, aber auch verwildert und vollständig eingebürgert. S. 35.

197. *Trifolium alpestre* L. (T. 1788).

198. *Trifolium arvense* L. (L. Sch. 1777) durch ganz M., in den sandigen Gegenden aber oft die Brachfelder wie mit einem grauen Schleier bedeckend. S. 37. 119.

199. *Trifolium striatum* L. (Link 1810) bei Daffow am hohen Seeufer, bei Warnemünde am Strande, bei Barthelsdorf, und in der Umgegend von Penglün: zwischen Gr. Helle und Flotow, zw. dem Gr. Heller Holz und Buchow, zw. Mölln und der Meierei.

Ann. *T. scabrum* L. kommt in M. nicht vor.

200. *Trifolium medium* L. (Brück. 1803.)



201. *Trifolium fragiferum* L. (T. 1795) weit verbreitet, sogar auf den Strandwiesen.

202. *Trifolium montanum* L. (T. 1788) Neubrandenburg! Brudersdorf u. s. w., bei Warnemünde selbst am Strande; fehlt aber bei Schwerin.

\* 203. *Trifolium repens* L. (L. Sch. 1777) — nur eingebürgert?

204. *Trifolium hybridum* L. (T. 1788).

205. *Trifolium agrarium* L. (L. Sch. 1777).

206. *Trifolium procumbens* L. (T. 1788).

β. *majus* = *T. campestre* Schreb.

207. *Trifolium filiforme* L. (Link 1795).

208. *Lotus corniculatus* L. (L. Sch. 1777) S. 13.

β. *uliginosus* Schrk. (Link 1810) nicht selten in der Nähe der Stammart, an feuchten, schattigen Orten.

γ. *tenuifolius* Reich. (Griew. sen. 1851) auf salzhaltigen Wiesen bei Dassow häufig.

*Galega officinalis* L. hin und wieder als Flüchtling aus den Gärten.

209. *Astragalus arenarius* L. (v. Kamptz 1806) bei Kafeldüt unv. Mirow; vielleicht im südlichen (leider noch wenig durchforschten!) Sandgebiete noch weiter verbreitet.

210. *Astragalus Cicer* L. (T. 1788) mit Ausnahme des Haide- und Sandgebietes durch ganz M. verstreuet, aber nicht häufig, z. B. bei Neubrandenburg im Brodaschen Holz! Pleeg! Richtenberg! Pentlin und Kemplin (Betche), zwischen Teterow und Güstrow u. s. w.

211. *Astragalus glycyphyllos* L. (L. Sch. 1777).

212. *Ornithopus perpusillus* L. (L. Sch. 1777).

213. *Vicia dumetorum* L. (L. Sch. 1777), durch M. zerstreuet und nicht häufig; z. B. bei Schwerin, Malchin, Dargun, Penzlin, Neustrelitz, Neubrandenburg im Dornestrüpp hinter der Heidemühle beim Eingange in das Mühlenholz!

214. *Vicia Cracca* L. (L. Sch. 1777).

215. *Vicia tenuifolia* Roth. (T. 1795 als *V. Gerardi*) in Torfwiesen bei Pötnitz unv. Daffow, bei Grabow und Drefahl, bei Reizow unv. Malchin, Penzlin, bei Neubrandenburg auf Belvedere am steilen Seenufer! ebendasselbst am Gerichts- und Datzberge! bei Kl. Nemerow!

Ann. *V. villosa* Roth. (bei Langmann) wurde von Dreves nicht auf mecklenburgischem Boden gefunden, sondern in der Wittstoder Haide auf preuß. Gebiete, obgleich dicht an der mecklenb. Gränze.

216. *Vicia sepium* L. (T. 1788).

217. *Vicia angustifolia* Roth. (T. 1791).

β. *sativa* L. (T. 1788) cultivirt und verwildert.

218. *Vicia lathyroides* L. (T. 1791); weit verbreitet, bei Warnemünde sogar am Strande.

219. *Vicia pisiformis* L. (T. 1795) bei Görslow unweit Schwerin am Rande des Holzes nach dem Felde zu, bei Seedorf am Malchiner See, bei Neubrandenburg am Datzberge und im Nemerower Holz.

220. *Vicia sylvatica* L. (T. 1788) mit Ausnahme des Haide- und Sandgebietes in Laubholzwaldungen durch M. (besonders durch das östliche!) zerstreuet, bei Neubrandenburg z. B. im Mühlenholze häufig, noch viel häufiger aber im Nemerower Holze, vergl. S. 81.

221. *Vicia cassubica* L. (Link 1795), wie die vorige Art.

\* 222. *Ervum hirsutum* L. (T. 1788) als Unkraut eingebürgert.

\* 223. *Ervum tetraspermum* L. (T. 1795) desgleichen.

*E. monanthos* L. (Griew. sen. 1854) kommt hin und wieder auch schon verwildert vor. (S. 114.)

224. *Pisum maritimum* L. (T. 1791) am See-  
strande: zw. Warnemünde und Markgrafenheide häufig;  
bei Boltenhagen?

225. *Lathyrus pratensis* L. (L. Sch. 1777).

226. *Lathyrus palustris* L. (T. 1791) an Seen  
auf sumpfigen Wiesen, und an den Ufern unserer größeren  
Flüsse, z. B. der Elbe! Peene, Tolsen! aber auch auf  
den Burgwall-Wiesen bei Böllow unv. Güstrow, so wie  
am Seestrande bei Warnemünde.

*β. tenuifolius* Mey. (C. Griew. 1851!) auf  
den Stepenizwiesen bei Daffow.

227. *Lathyrus sylvestris* L. (T. 1788) in Laubholz-  
wäldungen durch ganz M., z. B. bei Ludwigslust! Waren!  
Feldberg! Neubrandenburg! S. 81.

*L. tuberosus* L. (Treviranus 1828) ist mit Sicherheit früher  
nur einmal bei Barthelsdorf und Bieslow unv. Rostock zwischen der  
Saat gefunden worden, wahrscheinlich nur zufällig dorthin verirrt. —  
Alle anderen angeblichen Fundorte sind bei unseren Floristen zu  
streichen; ebenso auch der *L. sepium* Scop. bei Langmann. — In  
den benachbarten Floren kommt *L. tuber.* bei Lübeck (selten) und in  
der Ufermark vor.

228. *Orobus vernus* L. (T. 1788) fehlt im Haide-  
und Sandgebiet.

229. *Orobus niger* L. (T. 1791) fehlt ebendasselbst.

230. *Orobus tuberosus* L. (L. Sch. 1777), häufig  
z. B. bei Neubrandenburg! Staven! Pless! u. s. w.

25. Amyg-  
daleae.

231. *Prunus spinosa* L. (L. Sch. 1777) ein durch  
bessere Bodencultur in den letzten Jahrzehnten in seiner  
Verbreitung sehr viel mehr beschränktes Gesträuch. S. 119.

\* 232. *Prunus insititia* L. (T. 1788), wahrscheinlich  
nur eingebürgert und von den besseren Pflaumen-Arten  
jetzt immer mehr wieder verdrängt. S. 35.

\* 233. *Prunus avium* L. (T. 1788). Ob nur ein-  
gebürgert? S. 41.

234. *Prunus Padus* L. (L. Sch. 1777). S. 32. 119.

26. Rosa-  
ceae.

235. *Spiraea Ulmaria* L. (L. Sch. 1777).

β. *discolor* (glauca F. Schultz).

236. *Spiraea Filipendula* L. (L. Sch. 1777) zer-  
streuet durch M. und viel seltener als die vorige, z. B.  
bei Zirjow unv. Neubrandenburg! sehr häufig auf der  
Bresewig-Dischleher Gränze unv. Friedland (G. Brücken),  
bei Malchin (Vetke), bei der Wolkowschen Gypsmühle  
(Zabel); am Strande bei Warnemünde, und selbst im  
Gebiete der Grabower Flora.

237. *Geum urbanum* L. (L. Sch. 1777). S. 119.

238. *Geum rivale* L. (L. Sch. 1777).

(237 + 238.) *Geum urbano-rivale* Schiede (Flörke  
1828) ein hin und wieder (z. B. bei Dassel, Mönch-  
weden unv. Doberan, Güstrow im Töpferkuhlenbruch)  
auftauchender Bastard der beiden vorigen, und in seinem  
Habitus zwischen ihnen hin und her schwankend. Der hybride  
Ursprung dieser Pflanze ist durch künstliche Befruchtung er-  
wiesen, aber dennoch ist dieser Bastard fruchtbar! (Fries.  
Nov. p. 167).



Ann. Die jetzt folgende Gattung *Rubus* ist wegen der Wandelbarkeit ihrer Formen, die am schwierigsten zu enträthselnde in unserer ganzen phanerogamischen Flora, und bei keiner anderen Gattung gehen die Ansichten, was Art und was nur Varietät sei, so weit auseinander, wie hinsichtlich dieser Gattung. Da ich mich selbst nicht speciell mit derselben beschäftigt habe, so werde ich in der Aufzählung der Arten der trefflichen monographischen Bearbeitung unserer Brombeersrüucher folgen, welche Dr. Betcke im 4. Jahresheste des Archivs S. 73 bis 144 gegeben hat. Wenn ich dabei nicht umhin kann, eine kleine Reduction der dort aufgezählten 18 Arten vorzunehmen, welche späterhin durch Betckes briefliche Mittheilung noch um 2 neue vermehrt worden sind, so will ich mit dieser meiner Ansicht einem vielleicht besser begründeten Urtheile nicht vorgreifen. Mein Zweck, eine möglichst vollständige Uebersicht unserer Flora zu geben, wird durch mein Verfahren nicht beeinträchtigt, denn in dieser Beziehung kommt wenig darauf an, ob die in M. wachsenden Pflanzen als Arten oder als Varietäten aufgeführt werden, wenn nur keine charakteristische Form gänzlich mit Stillschweigen übergangen wird.

239. *Rubus Idaeus* L. (L. Sch. 1777). Betcke Monogr. S. 81 (S. 33. 119).

240. *Rubus fruticosus* L. (F. Schultz 1806 als *corylifolius*) B. S. 89. Weit verbreitet in M. S. 31. 35.

β. *suberectus* Anders. (Bet. 1850 p. 85).

γ. *affinis* W. N. (Bet. 1850 p. 93).

241. *Rubus thyrsoideus* Wim. (F. Schultz 1806 als *fruticosus*). B. S. 96. Durch ganz Mecklenburg.

242. *Rubus vulgaris* W. N. (Bet. 1854 in litt.).

β. *sylvaticus* W. N. (B. 1854 in litt.).

γ. *discolor* W. N. (B. 1850 p. 98).

δ. *villicaulis* Köh. (B. 1850 p. 103).

Die Stammart und Var. β. sind bei Grabow gefunden worden, γ. bei der Wanzkaer Papiermühle und in

der Umgegend von Daffow, d. in der Pentzliner Gegend: am Lapiszer Holze hinter den Buchowschen Bergen und in den hohen Tannen hinter Kabelsdorf bei Flotow.

243. *Rubus Radula* W. N. (Betcke 1850 p. 107) sehr häufig in M.

244. *Rubus horridus* Hartm. (Bet. 1850 p. 132) in der Bafedower Haide zw. Gielow und Langwitz dicht vor dem Theerosen, links in den Tannen.

245. *Rubus rudis* W. N. (C. Griew. und Willebr. 1850. 1841!) B. S. 129 nur erst in den Hambergen bei Grevismühlen gefunden (wo der Fußsteig nach Wismar den Weg von Grevismühlen nach Eversdorf durchschneidet, zur rechten Hand unter Eichen).

246. *Rubus Sprengelii* W. N. (F. Timm 1850) B. S. 135; am Wege zw. Neubasedow und Liepen, auf dem Schelfwerder und in den Neumühlschen Tannen bei Schwerin, in der großen Bekow bei Hagenow, bei Israelsdorf unv. Daffow.

247. *Rubus dumetorum* W. N. (Wredow 1812 als *nemorosus*) B. S. 117; häufig.

β. *corylifolius* Betcke! nicht Sm. (Willebr. u. C. Griew. 1850. 1841!) B. S. 114; bei der Lütjenhäfer Windmühle in der Nähe des Daffower Binnensees.

γ. *Wahlenbergii* Arrh. (B. 1850 p. 141) in einem trockenen Graben vor den Mollensdorfer Tannen bei Pentzlin.

248. *Rubus glandulosus* Bell. (Prahl 1837) B. S. 122. zerstreuet durch M. und nicht gerade häufig.

β. *thyrsiflorus* Betcke 1850 p. 125 (an W. N.?) um Pentzlin an mehreren Stellen.

249. *Rubus caesius* L. (L. Sch. 1777). B. C.  
138. (C. 32).

250. *Rubus saxatilis* L. (Siems. 1805) B. C. 143.

251. *Fragaria vesca* L. (L. Sch. 1777). C. 30.

252. *Fragaria elatior* L. (D. 1828) viel feltener als die vorige z. B. bei Brudersdorf unweit Dargun (G. Brück.), bei Neustrelitz, Neubrandenburg im Nemerower Holz! bei Gehmündorf, bei Güstrow auf dem Heideberge.

253. *Fragaria collina* Ehr. (T. 1795) scheint im ganzen westlichen M. zu fehlen, aber bei Güstrow, Kemplin, Stavenhagen, und in M. Strelitz nicht selten! C. 35.

254. *Comarum palustre* L. (L. Sch. 1777).

255. *Potentilla supina* L. (Knochenhauer 1837) bei Neubrandenburg am Rande des kleinen Ihlenpohls, und an dem Bache zw. der Bierradenmühle und dem Tolensee! (wo sie aber wieder verschwunden zu sein scheint); bei Staven unv. Friedland, bei Grabow im Gränzdorfe Warnow.

256. *Potentilla anserina* L. (L. Sch. 1777).

β. *sericea*.

*P. recta* L. (Schreiber 1853) als Gartenflüchtling bei Ludwigslust.

257. *Potentilla argentea* L. (L. Sch. 1777).

258. *Potentilla reptans* L. (L. Sch. 1777).

259. *Potentilla procumbens* Sibth., L. sp. (Thede 1806) häufig, z. B. bei Daffow, Grabow, Ludwigslust, Parchim, Mirow, Ballin unv. Stargard, Neustrelitz.

260. *Potentilla Tormentilla* Sibth., L. sp. (L. Sch. 1777). C. 119.

261. *Potentilla verna* L. (Prahl 1837), — von den früheren Botanikern mit *opaca* verwechselt, weshalb auf die von ihnen angegebenen Standorte keine Rücksicht genommen werden kann. — Sie findet sich bei Güstrow an trockenen, sonnigen Orten vor den Köwer Tannen (Prahl,) am Weinberge bei Mirow (Giesebr.), bei Schwerin auf dem Exercierplatze der Artillerie (Wüst.), auf dem Privat mit *opaca* (C. Griew.), bei Seedorf und Bafedow, Zahren und Ankershagen (Betsche), bei Neustrelitz auf dem Turnplatze (Langm.), — gehört also entschieden dem Gebiete unserer Sandflora an.

*β. cinerea* Chaix (Beuthe 1850) bei Neustrelitz a. m. D. 3. B. im russischen Lager, an den Bergabhängen beim herrschaftlichen Bauhose in der Nähe der Schloßkoppel! ohne Zweifel auch noch viel weiter im südlichen sandigen Theile von M. Strelitz (im Verbreitungsbezirke der *Euphorbia Cyparissias*!) vorhanden, aber übersehen, da dieser Landstrich (mit Ausnahme der Umgegend von Mirow) in botanischer Hinsicht leider fast noch eine *terra incognita* für uns ist.

Ann. Früher, so lange ich nur die dichtbehaarten, graufilzigen Exemplare dieser Abart kannte, die ich in der Mark bei Müllersdorf gesammelt hatte, hielt ich dieselbe für eine selbstständige Art; allein die Neustrelitzer Ex. stehen zwischen dieser und der gewöhnlichen Form der *P. verna* so in der Mitte, daß eine spezifische Trennung unmöglich wird.

150 262. *Potentilla opaca* L. (T. 1788), gehört vielleicht auch noch der Formreihe der *P. verna* an.

263. *Potentilla sterilis* L. (C. Griew. 1847. 1838!) bei Daffow auf buschigen Hügeln und an Bachabhängen nicht selten! desgl. bei Wölschendorf unv. Rehna (Brockmüller).



*P. alba* L. (Langm. 1850) im Ludwigslust Schloßgarten verwildert, und wahrscheinlich eben so im Adamsdorfer Holz unv. Neustrelitz, wo sie gleichfalls vorkommen soll.

264. *Agrimonia Eupatoria* L. (L. Sch. 1777)  
S. 119.

265. *Agrimonia odorata* Mill. (Betzke 1851) im Gr. Heller Holz unv. Pentzlin (B.), bei Malchin im Pinnower Walde und in der Wolkowschen Haide bei Dargun (Zabel), bei Schwan und Daffow; sogar am Strande am Rande der Rostocker Haide. — Sollte dies wirklich etwas mehr als eine üppige Waldform der vorigen sein?

266. *Rosa canina* L. (L. Sch. 1777) zu welcher auch *L. Swarzii* Deth., *collina* und *sylvestris* F. Schultz als Formen gehören. S. 33. 41.

267. *Rosa rubiginosa* L. (T. 1795).

β. *glutinosa* F. Schultz.

268. *Rosa tomentosa* Sm. (L. Sch. 1777).

*R. pimpinellifolia* DC. Gartensflüchtling bei Ludwigslust.

*R. lucida* Ehr. (Treviranus 1828) aus Nordamerika stammend, ward vor Jahren einmal am Ostseestrande unsern Rostock gefunden, seitdem nicht wieder; auch bei Hamburg ist sie verwildert.

*R. cinnamomea* L. (Link 1810) und *turbinata* Ait. (Schultz 1837) gleichfalls hin und wieder verwildert.

Anm. *R. arvensis* in Schultz Fl. Starg. ist zu streichen.

269. *Alchemilla vulgaris* L. (T. 1788).

27. *Sanguisorbeae*.

β. *montana* W. wurde nach Link (1810) einmal von Thede gefunden; der Standort ist nicht näher bezeichnet.

270. *Alchemilla arvensis* L. sp. (T. 1788).

271. *Sanguisorba officinalis* L. (D. 1809) in den

Markower Wiesen bei Bärn im zw. Rohnde und Dohmen, zu Ludwigslust bei der Laascher Brücke! bei Rostock, Neustrelitz auf der Schloßkoppel, bei Leppin unv. Stargard auf einer Wiese bei der Kölpiner Brücke.

272. *Poterium Sanguisorba* L. (T. 1788).

28. Poma-  
ceae.

273. *Crataegus Oxyacantha* L. (L. Sch. 1777).

*β. monogyna* Jacq. (Brück. 1803, nicht Timm, dessen *monogyna* nach Ausweis von Originalen in meinem Herbarium sich nur durch Fehlschlagen des einen Griffels von der Normalform unterscheiden). Bei Neubrandenburg fast so häufig wie *oxyac. α.*, und wahrscheinlich auch ebenso im übrigen Mecklenburg.

Anm. Durch genaues Studium beider Formen bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, daß zu ihrer specifischen Trennung keine beständigen charakteristischen Merkmale vorhanden sind. Beide kommen mit 1 und 2 Griffeln vor; beide werden baumartig (*oxyac.* erreicht hier auf dem langen Walle eine Höhe von mehr als 20' und der Stamm unten eine Dicke von 8" im Durchmesser); beide blühen gleichzeitig; bei tief-fiederspaltigen Blättern sind die Blütenstiele bei einigen Pflanzen zottig, bei anderen glatt, ja beides kommt bei einer und derselben Pflanze vor; sind die Blütenstiele behaart, so pflegen es auch die jungen Blätter in stärkerem Maaße zu sein, obgleich dieselben auch bei den Pflanzen mit glatten Blütenstielen wenigstens auf den Atern schwach behaart zu sein pflegen; die Form der Blätter ist sehr wandelbar, im Umriß vom Eirunden bis zum Keil-rautenförmigen; mit den am meisten rundlichen und am wenigsten eingeschnittenen Blättern fand ich nur glatte Blütenstiele verbunden, eine Form, welche den normalen *C. oxyacantha* darstellt. — Studiert man die beiden Formen nur in Herbarien, wo vielleicht nur die Extreme ihrer Gestaltung aufbewahrt sind, so scheinen sie allerdings auf den ersten Blick sehr verschieden, aber diese Täuschung verschwindet, sobald man Gelegenheit hat, sie lebend in zahlreichen Ex. zu vergleichen. — Auch Griewank sen. gesteht brieflich zu, daß die Blattform

sehr veränderlich sei, und daß von der Behaarung der Blütenstiele und Kelche kein Unterschied hergenommen werden könne, will aber dennoch einen solchen in der Blüthezeit finden, indem monogyna 14 Tage später blühe, so wie darin, daß bei monog. die Kelchspindel, wenn die Blumenblätter noch in der Knospe zusammengeballt sind, weit über diese hinausragen, während des Ausblühens sich zurück schlagen und mit ihrer ganzen Länge an die Kelchröhre anlegen, — ferner, daß die einweibigen Griffel liegen und gekrümmter sind, und daß die Blätter im Allgemeinen viel schmaler, gegen den Blattstiel keilsförmiger und vorn mit spitzeren Zipseln versehen sind, als bei *Oxyacantha*. — Ich habe diese von der meinigen abweichende Ansicht dieses gründlichen Kenners unserer Flora den Botanikern nicht vorenthalten wollen.

274. *Pyrus communis* L. (L. Sch. 1777).

275. *Pyrus Malus* L. (L. Sch. 1777) beide im wilden Zustande von Jahr zu Jahr seltener werdend. S. 34.

276. *Sorbus Aucuparia* L. (L. Sch. 1777). S. 38.

277. *Sorbus torminalis* L. sp. (T. 1791) kommt nur in wenigen Waldungen vor: im Steinfeld der Holz bei Schwerin, in der Rostocker Haide, im Zülchendorfer Holz, in der Bafedower Forst bei Seedorf, im Brodowschen Holz unv. Pentzlin, an der Telense: im Remerower Holz auf dem hohen Ufer! und bei Meiershof! S. 39.

Anm. Wenn G. Meyer in s. Fl. excurs. Hannov. die Meinung ausspricht, daß dieser Baum in M. nicht wild, sondern nur angepflanzt sei, so kann ich dieselbe nicht theilen; bei Neubrandenburg z. B. ist er mitten im Remerower Holz zahlreich (aber selten blühend und Früchte tragend!), und dort schon seit einer Zeit vorhanden, zu welcher man in M. die Forsten mehr zu vertilgen, als zu cultiviren suchte. Auch sein Vorkommen in der Stubnitz auf Rügen spricht für sein Indigenat im nördlichen Deutschland.

29. Onagraceae.

278. *Epilobium angustifolium* L. (T. 1791).279. *Epilobium hirsutum* L. (L. Sch. 1777).280. *Epilobium parviflorum* Schreb. (T. 1791).281. *Epilobium montanum* L. (L. Sch. 1777).β. *verticillatum*.γ. *lanceolatum*.282. *Epilobium roseum* Schreb. (T. 1791).

283. *Epilobium tetragonum* L. *adnatum* Gries. (T. 1791) an Uferändern bei Daffow, im Gebiete der Flora von Grabow a. m. D., bei Malchin vor dem Mühlenthore an der Peene, bei Neustrelitz hinter dem Glambecker See.

284. *Epilobium palustre* L. (L. Sch. 1777).

Anm. *E. virgatum* bei Brockmüller und Schreiber ist zu streichen.

\* 285. *Oenothera biennis* L. (T. 1791) aus Virginien stammend, früher zu Küchenzwecken cultivirt, jetzt in der Nähe der Städte und Dörfer häufig verwildert!

\* 286. *Oenothera muricata* L. (Schmidt 1828) hat sich besonders an den Elbufern von Dresden bis Blauenese eingebürgert; sie soll aus Canada stammen.

287. *Circaea lutetiana* L. (L. Sch. 1777) durch ganz Mecklenburg!

288. *Circaea alpina* L. (L. Sch. 1788) besonders in der Haideebene!

(287 + 288.) *C. intermedia* Ehr., ein unfruchtbarer Bastard der beiden vorigen, und in seinen Formen zwischen den beiden Stammarten schwankend.

Anm. *Trapa natans* L. soll früher in der Lewitz gefunden sein, vergl. S. 69. In länger als siebenzig Jahren ist sie aber



keinem unserer Botaniker zu Gesichte gekommen und vielleicht ausgestorben, wie dies auch in Holstein mit ihr der Fall zu sein scheint. Aeltere holsteinsche Floren führen sie noch auf, in den neueren fehlt sie: zuletzt scheint sie vor einigen Jahrzehnten in der Stechnitz gefunden zu sein; jetzt kommen ihre wohlerhaltenen Früchte nur noch in einer mit Geschiebefand bedeckten Papiertorf=Schicht in einer Anhöhe bei Lauenburg im halb fossilen Zustande vor (s. Leonhard und Bronn neues Jahrb. f. Mineral. u. s. w. 1854 S. 36). — Ueberhaupt scheint diese Pflanze in ganz Norddeutschland immer seltener zu werden und bei Danzig, so wie in Schweden ist sie schon gänzlich ausgestorben. Vergl. S. 190.

289. *Myriophyllum verticillatum* L. (T. 1788). 30. Halora-

290. *Myriophyllum spicatum* L. (L. Sch. 1777). geae.

291. *Myriophyllum alterniflorum* DC. (Ramelow 1856) bei Gadebusch im Rosenhagener und Frauenmarker See, so wie bei Dutzow. — Die specifische Trennung dieser Art von der vorhergehenden wäre nach G. Meyer noch näher zu prüfen.

292. *Hippuris vulgaris* L. (L. Sch. 1777). 31. Hippurideae.

β. *fluitans* mit langem (nach Detharding bis 6'), fluthenden und schlaffen Stengel, und 2 bis 3" langen, über 1" breiten, gleichfalls schlaffen Blättern, mit der Spitze etwa 1' hoch aus dem Wasser hervorragend, in diesem Theile die Gestalt der Stammform annehmend, blühend und Früchte tragend. In fließendem Wasser z. B. in der Warnow zwischen der Fähre und Gehlsdorf.

γ.? *undulata* Boll (1857). In dem Tolensee umweit der Vogelstange fand ich bei einer Wassertiefe von 5 bis 6 Fuß häufig eine *Hippuris* zwischen *Fontinalis antipyratica* und Charen wachsend, die mir sehr auffallend war und sich vielleicht als neue Species herausstellen möchte.

Ann. Der Stengel ist lang und schlaff, nicht über den Wasserspiegel hervorragend, unfruchtbar; Blätter  $1\frac{1}{2}$  bis 2 Zoll lang, 1" breit, schlaff, einnervig, durchscheinend, am Rande sehr zart wellig-gekräuselt (ein Merkmal, welches beim Pressen der Pflanze für das Herbarium leider verloren geht!); 12 Blätter in jedem Quirl. — Ich werde diese Pflanze noch ferner im Auge behalten.

*δ. maritima* sehr klein (4 bis 5"), mit nur 4 bis 6 Blättern in jedem Quirl; auf trockenen Salzwiesen bei Dietrichshagen.

32. Callitricheae. 293. *Callitriche verna* L. (L. Sch. 1777) eine sehr veränderliche Art, deren Formen auch schon in unseren mecklenburgischen Florenverzeichnissen als *C. stagnalis*, *platicarpa*, *vernalis* aufgetaucht sind.

294. *Callitriche autumnalis* L. (Link 1810) im Meckower See bei Ratzeburg, in der Haideebene nicht selten! desgleichen bei Schwerin, bei Neustrelitz in den Gräben am Wege nach der Kalkhorst, bei Eichhorst unweit Friedland am Rande des Teiches hinter dem Hofgarten, im Peutscher See (Betsche).

32. Ceratophylleae. 295. *Ceratophyllum demersum* L. (T. 1788).

296. *C. submersum* L. (F. Schultz 1828) bei Neustrelitz in einem Graben, der zum Glanbecker See führt.

34. Lythraceae. 297. *Lythrum Salicaria* L. (L. Sch. 1777).

298. *Peplis Portula* L. (T. 1788); an vielen Orten, auch am Strande bei Warnemünde.

35. Cucurbitaceae. \* 299. *Bryonia alba* L. (L. Sch. 1777). S. 40. 119. 138.

Ann. *B. dioica* Jacq. soll nach Brockmüller (1852) in der Gegend von Gnoien gefunden, und zwar dort gar nicht selten sein.

Da dieses Vorkommen aber ganz vereinzelt im nordöstlichen Deutschland bestehen würde, bedarf es jedenfalls noch einer weiteren Bestätigung; sehr bedenklich ist mir namentlich der Umstand, daß die Botaniker in Gnoien (Guth und Arndt) diese Pflanze in dortiger Gegend noch nicht gefunden haben. Der nordwestlichste bekannte Punct in Deutschland, wo sie vorkommt, ist Lübeck; auch bei Hamburg ziemlich häufig.

300. *Montia fontana* L. (T. 1788).

36. Portulacaceae.

*β. rivularis* Gm. (D. 1828) mit 1' langem fluthenden Stengel z. B. bei Boizenburg in einer Quelle am Elbberge unterhalb Bierhof.

*Portulaca oleracea* L. wurde früher häufiger als jetzt cultivirt, und ist in manchen Gärten verwildert.

301. *Corrigiola litoralis* L. (Blandow 1806) im Halde- und Sandgebiete häufig! 37. Paronychieae.

302. *Herniaria glabra* L. (L. Sch. 1777).

303. *Illecebrum verticillatum* L. (T. 1791) im Halde- und Sandgebiete häufig! fehlt im nördlichen M.

304. *Scleranthus annuus* L. (L. Sch. 1777). 38. Scleranthaceae.

305. *S. perennis* L. (T. 1788). S. 34.

306. *Sedum Telephium* L. (T. 1788). 39. Crassulaceae.

*β. purpurascens* Koch (Brück. 1817) seltener als die Stammart und mehr im südlichen Landestheile.

*S. album* L. (Link 1810) auf Steinmauern um Magdeburg, früher auch an der Schweriner Schloßmauer; Neustrelitz bei der Schloßkoppel und beim Schützenhause, ist wohl ebenso nur verwildert, wie dies ohne Zweifel mit dem von Schutrath Meyer zu Schwerin (1853) an der Eisenbahnüberschneidung in großer Menge gefundenen *S. hybridum* L. der Fall ist.

307. *Sedum acre* L. (L. Sch. 1777). Hierher gehört auch *S. sexangulare* der mecklenb. Floristen mit Ausnahme Link's. S. 138.

308. *Sedum boloniense* Lois. (Link 1810) bei Klocksin südlich vom Malchiner See auf Hügeln in der Nähe der Peene; ohne Zweifel auch noch weiter in M. verbreitet, aber nicht beachtet.

309. *Sedum reflexum* L. (L. Sch. 1777) in den Wäldern um Neubrandenburg nicht selten! bei der Wolkow'schen Gypsmühle unv. Dargun, u. a. D.

*Sempervivum tectorum* L. (L. Sch. 1777) häufig auf den Dächern der Ställe und Schweinekoben angepflanzt. S. 131.

40. Grossulariaceae.

\* 310. *Ribes Grossularia* L. (T. 1788).

311. *R. alpinum* L. (Siems. 1805) im Sulchendorfer Holz unv. Rostock, Schwerin in Steinfelders Holz und auf dem Werder, Parchim auf dem Sonnenberge, Below südlich von Röbel. S. 39.

Anm. Nach ihrem häufigen Vorkommen in den Wäldern der rügianischen Halbinsel Jasmond zu urtheilen, scheint diese Pflanze kalkhaltigen Boden zu lieben.

312. *R. nigrum* L. (L. Sch. 1777). S. 29.

\* 313. *R. rubrum* L. (T. 1788).

41. Saxifragaceae.

314. *Saxifraga Hirculus* L. (L. Sch. 1777) auf Wiesen bei Schwerin, Güstrow, Sildemow, Sülz, Malchin, Dargun! Gr. Giewitz, Penzlin, Prilwitz, Neubrandenburg! u. s. w., scheint aber in der Haideebene zu fehlen.

315. *S. tridactylites* L. (L. Sch. 1777).

316. *S. granulata* L. (L. Sch. 1777).

317. *Chrysosplenium alternifolium* L. (L. Sch. 1777).

318. *Ch. oppositifolium* L. (Richter 1841) bisher nur im südwestlichen M. zwischen Gr. Bengersdorf und Bennin; an der Quelle rechts vom Steige der von Boizenburg nach Geheum führt.



319. *Hydrocotyle vulgare* L. (L. Sch. 1777) häufig, sogar auf Strandwiesen bei Warnemünde. S. 138. 42. Umbelliferae.
320. *Sanicula europaea* L. (L. Sch. 1777). S. 120.
321. *Eryngium campestre* L. (Hahn 1809) sehr häufig auf den Elbdeichen! stromabwärts bis Hamburg.
322. *E. maritimum* L. (T. 1788) häufig am Ostseestrande!
323. *Cicuta virosa* L. (L. Sch. 1777). S. 41. 135.  
β. *tenuifolia*.
324. *Apium graveolens* L. (T. 1788) besonders am Seestrande und um Salzquellen. S. 114. 138.
325. *Helosciadium inundatum* L. sp. (Nolte c. 1823 sec. Betcke Archiv V.) nur in der Haideebene a. m. D., und bei Ratzburg in einem kleinen Teiche bei der Beek; — schwerlich bei Mirow.
326. *H. repens* L. sp. (v. Schreber bei Roth 1793) nicht selten auf Wiesen durch ganz M., mit Ausnahme der Haideebene.
- \* 327. *Falcaria Rivini* Host; L. sp. (T. 1791) auf Aekern, besonders kalkhaltigen, eingebürgert, jedoch, außer auf Pöl, vorzugsweise im östlichen Landestheile: bei Brudersdorf unweit Dargun, Rehow unweit Malchin, Penzlin, Quastenberg bei Stargard, Broda bei Neubrandenburg, Pleetz bei Friedland! — Bei Güstrow, Schwerin und in der Haideebene scheint diese Pflanze zu fehlen.
328. *Aegopodium Podagraria* L. (L. Sch. 1777).
- \* 329. *Carum Carvi* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert?
330. *Pimpinella magna* L. (T. 1791).
331. *P. Saxifraga* L. (L. Sch. 1777). S. 120.  
β. *dissectifolia* Wallr.

*γ. nigra* Wild. 3. B. bei Neubrandenburg im  
Nemerower Holz, bei Dargun (Zab.) u. a. D.

332. *Berula angustifolia* L. sp. (T. 1788). S. 138.

333. *Sium latifolium* L. (L. Sch. 1777). S. 138.

334. *Bupleurum tenuissimum* L. (Willebr. 1839)  
bei der Pötnitzer Ziegelei unv. Daffow, am Kirchsee bei  
Kirchdorf auf Pfl, Dietrichshagen bei Warnemünde, Wu-  
strow auf dem Fischlande, — eine Seestrandspflanze.

*B. rotundifolium* L. (T. 1788) hin und wieder in Gärten und  
auf Aefern verwildert.

335. *Oenanthe fistulosa* L. (L. Sch. 1777). S. 138.

336. *O. Lachenalii* Gm. (T. 1788) am Seefrande  
des Priwal, zwischen dem Schuatermann und Markgrafens-  
haide unv. Rostock.

337. *O. Phellandrium* Lam. (L. Sch. 1777). Vergl.  
S. 120. 138.

\* 338. *Aethusa Cynapium* L. (L. Sch. 1777) mit  
den Culturpflanzen als Unkraut eingebürgert? S. 138.

339. *Seseli annuum* L. (Blandow 1808) auf san-  
digen Wiesen an der Müritz am Kiez bei Waren; bei  
Wittenburg auf der Weide am Fußsteige nach Dreilützow;  
am Wege von Dömitz nach W. und Junker-Wehningen.

340. *Libanotis montana* Crtz. L. sp. (T. 1791)  
am Ostseeufer bei Warnemünde.

341. *Cnidium venosum* Koch; L. sp. (Griew.  
1839. 1828!) auf Elbwiesen bei Boizenburg und Dömitz,  
bei Ludwigslust am Canal diesseits der Laascher Brücke,  
und überhaupt wohl in der Haideebene nicht selten, außer-  
halb derselben jedoch noch nicht gefunden.

*Levisticum officinale* Koch (Schreiber 1853), in Südeuropa

heimisch, wird in Dorfgärten cultivirt und entschlüpft denselben bisweilen.

342. *Selinum Carvifolia* L. (T. 1795) bei Warnemünde, Güstrow (in den Todten- und Röwer-Tannen), im Geb. der Grabower und Malchiner (in d. Benz und auf dem neuen Rücken) Flora, bei Neubrandenburg auf den Wiesen hinter der Kuhweide.

343. *Angelica sylvestris* L. (L. Sch. 1777).

344. *Archangelica officinalis* Hoffm., L. sp. (T. 1788) in M. nicht selten, sogar am Strande bei Daffow und Warnemünde. S. 120.

345. *Peucedanum Oreoselinum* Mönch, L. sp. (T. 1788) nicht selten, auch am Strande bei Warnemünde.

Ann. *P. officinale* L. kommt in M. nicht vor, vergl. Archiv VI. 111.

346. *Thysselinum palustre* L. sp. (L. Sch. 1777).

\* 347. *Pastinaca sativa* L. (T. 1788), eingebürgert?

348. *Heracleum Sphondylium* L. (L. Sch. 1777).

349. *Laserpitium prutenicum* L. (Brück. 1803) bei Daffow am Travenfer, Marktgrafenhaide, in der Wolfschen Haide, Neubrandenburg im Nemerower Holz, fehlt im südlichen M.

350. *Daucus Carota* L. (L. Sch. 1777), ob eingebürgert?

\* 351. *Caucalis daucoides* L. (D. 1828) hin und wieder unter der Saat, und mit dieser eingebürgert.

*Scandix pecten Veneris* L. (Thede 1806) wird bisweilen mit der Saat eingeschleppt, scheint sich aber nirgends wirklich eingebürgert zu haben, wenn nicht etwa bei Ritz, wo C. Grievank sie (nicht häufig) unter dem Sommerforn fand.

352. *Torilis Anthriscus* L. sp. (T. 1788).

353. *Anthriscus sylvestris* L. sp. (L. Sch. 1777) S. 138.

A. *Cerefolium* L. (Schultz 1806) aus dem sibl. Europa stammend, a. m. D. verwildert.

354. *A. vulgaris* Pers. L. sp. (T. 1791).

355. *Chaerophyllum temulum* L. (T. 1788). S. 138.

\* 356. *Ch. bulbosum* L. (T. 1788) an Wegen bei Daffow, auf dem Schweriner Stadtfelde in Gebüsch, bei Ludwigslust im Garten der Villa Gustava, bei Malchin an Feldzäunen eingebürgert.

357. *Conium maculatum* L. (L. Sch. 1777). S. 120. 138.

43. Aralia-  
ceae.

358. *Hedera Helix* L. (L. Sch. 1777) in unseren Wäldern selten blühend, häufiger in den Gärten an alten Mauern. Vergl. S. 34. 41. 76. 80. 138.

44. Corneae.

359. *Cornus sanguinea* L. (T. 1788). Vergl. S. 33.

45. Loranthaceae.

360. *Viscum album* L. (L. Sch. 1777) bei Schwerin, Ludwigslust, Nempin, Schloß Grubenhagen, Neubrandenburg! Prilwitz! u. s. w. Vergl. S. 34. 120.

46. Caprifoliaceae.

\* 361. *Sambucus nigra* L. (L. Sch. 1777) häufig, aber wahrscheinlich nur eingebürgert. S. 120.

Anm. *S. Ebulus* L. (T. 1788) ist wahrscheinlich eine früher cultivirte und verwilderte, jetzt aus M. schon wieder verschwundene Pflanze. Nur Timm und F. Schultz geben einige Standorte an, ersterer Gorschendorf bei Malchin, letzterer Ruhlsauk, Rilsow und Woggersin. Sie fehlt im Gebiete der Floren von Grabow, Ludwigslust, Schwerin, Güstrow, Neubrandenburg, — ich selbst habe sie niemals in M. gefunden, und überhaupt scheint sie in neuerer Zeit keinem unserer Botaniker aufgestoßen zu sein; im J. 1844 will sie Jemand bei Finkenwerder unweit Goldberg in einem Graben gefunden haben, wofür aber der Beweis mir fehlt. Auch in den Floren von Rügen, der Ufermark (wo sie nur bei Boizenburg ver-



wildert! vorkommt), von Berlin (Runth) und Lübeck (Häcker) fehlt sie; aus dem großen Gebiete der Flora Marchica giebt A. Dietrich nur vier Fundorte an. In Neuvorpommern kam sie zu Weigels Zeiten (1769) an einer einzigen Stelle vor, jetzt (1859) hat Zabel sie nicht wieder gefunden. Bei Hamburg selten an Zäunen (!) zwischen Gesträuch (Sonder).

362. *Adoxa Moschatellina* L. (T. 1788).

363. *Viburnum Opulus* L. (L. Sch. 1777). S. 33.

364. *Lonicera Periclymenum* L. (L. Sch. 1777).

Vergl. S. 30. 39. 138.

β. *quercifolium*.

365. *L. Xylosteum* L. (L. Sch. 1777) fehlt nur in der Haideebene und ist im östlichen M. gar nicht selten. Vergl. S. 30. 138.

366. *Linnaea borealis* L. (v. Kamptz 1806) bei Starfow unweit Mirow auf der Schwärzger Landspitze; bei Kamelow unweit Friedland? Neustrelitz bei Glambeck und am Krebssee a. m. St., im Brusdorfer Holz; zw. Malchow und Drewitz; bei Graal in der Ribnitzer Haide; bei Mandelshagen, Krakow, Daffow, und in den Tannen an der Trave.

\* 367. *Sherardia arvensis* L. (T. 1788) auf Meckern <sup>47. Stellatae.</sup> eingebürgert.

\* 368. *Asperula arvensis* L. (T. 1791) ebenso, aber nur selten, z. B. bei Malchin und Mirow; sie soll Kalkboden lieben.

*A. tinctoria* L. (Langm. 1850) bei Neustrelitz im russischen Lager, — wohl nur dahin verirrt.

369. *A. Cynanchica* L. (T. 1791 als *Galium montanum*) an der Müritz bei Waren, Prilwitz auf dem Schloßberge, Hohenzieritz im Schloßgarten; Neustrelitz?

370. *A. odorata* L. (L. Sch. 1777) gemein in allen Laubholz-Waldungen. Vergl. S. 37. 112. 138.

371. *Galium Aparine* L. (L. Sch. 1777) durch ganz Mecklenburg verbreitet. Vergl. S. 40.

β. *spurium*.

372. *G. uliginosum* L. (L. Sch. 1777).

Ann. Link Musc. beschreibt unter dem Namen *G. erectum* Sm. eine mit *uliginosum* und *palustre* verwandte Art, welche er unter Gr. der ersteren gemengt aus Parchim erhalten habe. Seiner Beschreibung nach kann dies nur *G. parisiense* L. gewesen sein, welches dort vielleicht zufällig auf einem Acker eingeschleppt war, aber sich wohl schwerlich eingebürgert hat. Auch bei Stettin, und wahrscheinlich auch in Holstein, ist es schon vorgekommen.

373. *G. palustre* L. (L. Sch. 1777).

374. *G. boreale* L. (T. 1791) bei Ludwigslust häufig, Schwerin bei der Fähre über die Stör, Malchin in der Bielowschen Benz, Neubrandenburg im Brüderruch, Friedland.

375. *G. verum* L. (L. Sch. 1777).

376. *G. Mollugo* L. (T. 1788).

(375 + 376.) *G. vero-Mollugo* Schiede, ein Bastard.

377. *G. sylvaticum* L. (T. 1788).

378. *G. saxatile* L. (Link 1810) im westlichen M. von Daffow bis in die Haideebene hinab; wahrscheinlich auch in dem kleinen nordöstlichen Haidegebiete, da es auf dem Dars und Zingsst nicht selten ist.

48. Valerianeae. 379. *Valeriana officinalis* L. (L. Sch. 1777) S. 120. Hierher gehört als Varietät:

β. *exaltata* Mich. (Betcke 1849).

380. *V. dioica* L. (L. Sch. 1777).

\* 381. *Valerianella olitoria* Mönch. (L. Sch. 1777).

\* 382. *V. carinata* Lois. (Schultz 1828 sec. Deth.) „in Stargardia“, ein speciellerer Standort wird nicht angegeben, und Schultz selbst erwähnt diese Art nirgends, selbst nicht im 2. Nachtrage zu seiner Flora. Im J. 1840 aber fand sie Betcke bei Penzlin im Werderschen Garten oben an der Mauer beim Weinstock in mehrfachen Exemplaren. Andere Fundorte sind mir nicht bekannt.

\* 383. *V. dentata* Poll. (D. 1809).

\* 384. *V. Auricula* DC. (Betcke 1825!) bei Neustadt am Fußsteige nach dem Hagen im Getreide.

385. *Dipsacus Fullonum* L. var. *sylvestris* Mill. <sup>49. Dipsaceae.</sup> (T. 1791) an der Elbe auf den Deichen und durch die ganze Teldau häufig! bei Sternberg, Rostock; bei Ronow verschwunden.

Ann. Linf Misc. sagt: *D. sylvestris* ist gewiß nur eine Abänderung von *D. Fullonum*, denn in dem botanischen Garten zu Rostock bringt der ausgefallene Same des letzteren in der zweiten Generation den *D. sylvestris* hervor.

386. *D. pilosus* L. (T. 1788) bei Daffow und Nienhagen, Schwerin, Grabow, Neustadt, Dütschow, Penzlin, Stargard.

387. *Knautia arvensis* L. sp. (L. Sch. 1777).

β. *integrifolia*.

388. *Succisa pratensis* Mönch; L. sp. (L. Sch. 1777). S. 40. 120.

389. *Scabiosa Columbaria* L. (T. 1788).

390. *S. suaveolens* Desf. (Schultz 1828), weit durch M. verbreitet! und nur im nordwestlichen Landestheile fehlend.

391. *Eupatorium cannabinum* L. (L. Sch. 1777) <sup>50. Compositae.</sup> <sub>a. Corymbiflorae.</sub> gemein; ändert bei Daffow mit weißen Blüthen ab, in

welchem Falle auch die ganze Pflanze ein helleres Grün hat. S. 138.

392. *Tussilago Farfara* L. (L. Sch. 1777) S. 120.

393. *Petasites officinalis* Mönch. L. sp. (L. Sch. 1777).

394. *P. tomentosus* Ehr. sp. (Schmidt 1828) an der Elbe: von Dessau abwärts über Dömitz! bis Blankenese.

395. *Aster Tripolium* L. (T. 1788) Seestrand- und Salinenzpflanze.

*A. salicifolius* Schol. (= *salignus* W.) hin und wieder an Flußuferu verwildert; desgl. *A. novi Belgii* L. bei Grabow am Bachmühlengraben (Schreiber 1853).

*Biotia macrophylla* L. sp., eine Nordamerikanerin, ist nach Schreiber (1853) im Ludwigsfluster Schloßgarten verwildert.

396. *Bellis perennis* L. (L. Sch. 1777).

\* 397. *Erigeron canadensis* L. (T. 1788) aus Canada stammend, hat sich in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts völlig eingebürgert.

398. *E. acer* L. (L. Sch. 1777).

399. *Solidago Virga aurea* L. (L. Sch. 1777) S. 120.

\* 400. *Inula Helenium* L. (L. Sch. 1777) früher als officinelle Pflanze cultivirt, hat sie sich zwar eingebürgert, scheint aber wieder im Aussterben begriffen. Betcke fand sie noch an der Quelle bei Pohnstorf, auf dem Kirchhofe zu Bülow am Malchiner See, bei Gevezin und Zahren.

401. *Inula salicina* L. (D. 1797) sehr zerstreuet in M.: beim Schnatermann unv. Rostock, bei der Wolfowfschen Gypsmühle unv. Dargun, im Kamelower Holz unv. Friedland, und häufig auf einer Wiese bei Sarchow im U. Marnitz. Sie liebt kalkreichen Boden daher auf Jasmund gemein!

402. *Inula britannica* L. (T. 1795) auf feuchten



Wald- und Seestrandswiesen. Sie kommt auch mit 1 Blütenkopfe vor, und schon Schulz warnt, solche Exemplare nicht etwa für *I. hirta* zu halten.

403. *Pulicaria vulgaris* Gärt.; L. sp. (L. Sch. 1777).

404. *P. dysenterica* L. sp. (T. 1788) fehlt in einzelnen Gegenden, wie z. B. um Schwerin und Grabow.

*Galinsoga parviflora* Cav. (Langm. 1841), eine Peruanerin, ist jetzt in der Einbürgerung begriffen, und z. B. in den Ludwigs-lustler Gärten, so wie bei Wandrum unv. Schwerin, schon ein lästiges Unkraut geworden; ebenso bei Hamburg, Berlin (wo sie im 2. Decennium dieses Jahrhunderts dem botanischen Garten entschlüpft ist), Greifswald und in der Prov. Preußen (hier seit 1807 verwildert).

405. *Bidens tripartita* L. (L. Sch. 1777).

406. *B. cernua* L. (T. 1788).

*Rudbeckia laciniata* L. (Broeckm. 1853) aus Nordamerika stammend, wird sich gleichfalls einbürgern, wie sie dies schon bei Eisbeck und Wandsbeck gethan hat; bei Grabow ist sie schon an mehreren Stellen an der Elbe verwildert.

*Helianthus tuberosus* L. (Schmidt vor 1828) am hohen Elbufer bei Boizenburg; desgl. in Gärten und an Zäunen im Kirchdorfe Gressow (Klitzger Ort) fast verwildert.

407. *Filago germanica* L. (L. Sch. 1777).

408. *F. arvensis* L. (L. Sch. 1777).

409. *F. minima* Fr. (T. 1795 als *montana*).

410. *Gnaphalium sylvaticum* L. (L. Sch. 1777).

411. *G. uliginosum* L. (L. Sch. 1777).

412. *G. luteo-album* L. (Link 1810) in der Haideebene, aber nicht häufig, z. B. bei Ronow! Glaisin, Grabow; desgl. auch in dem kleinen nordöstlichen Haidegebiete.

413. *G. dioicum* L. (L. Sch. 1777).

414. *Helichrysum arenarium* L. sp. (T. 1788) S. 120.

\* 415. *Artemisia Absinthium* L. (L. Sch. 1777) wahrscheinlich nur eingebürgert; sie fehlt auf Pöl und der Halbinsel Wustrow, und ist in der Wismarschen Strandgegend sehr selten; im Binnenlande an manchen Orten sehr häufig. S. 41. 112. 121.

416. *Artemisia campestris* L. (L. Sch. 1777).

β. *sericea* Fr. in der Nähe des Meeresstrandes.

417. *A. vulgaris* L. (L. Sch. 1777) S. 121.

418. *A. maritima* L. (Siems. 1808) Seestrandspflanze, häufig z. B. auf Pöl und an d. Wism. Bucht. S. 41.

β. *gallica* W. an der Wism. Bucht (C. Griew.).

γ. *salina* W. bei Wismar, nicht bei Daffow.

*A. pontica* L. (Betsche 1849) bei Penzlin verwildert.

419. *Tanacetum vulgare* L. (L. Sch. 1777). S. 35. 121!

β. *crispum* (v. Kamptz 1806) in Zartwitz bei Mirow.

420. *Achillea Ptarmica* L. (T. 1788).

421. *A. Millefolium* L. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 38. 121.

422. *Anthemis tinctoria* L. (T. 1788) fehlt z. B. bei Ludwigslust.

\* 423. *A. arvensis* L. (L. Sch. 1777) mit der Saat eingebürgert.

\* 424. *A. Cotula* L. (T. 1788). Vergl. S. 34.

\* 425. *Matricaria Chamomilla* L. (L. Sch. 1777) als officinelle Pflanze eingebürgert? S. 121.

426. *Chrysanthemum Leucanthemum* L. (T. 1788). Vergl. S. 37.

\* 427. *Ch. Parthenium* Pers.; L. sp. (L. Sch. 1777); früher als officinelle Pflanze eingebürgert?

\* 428. *Ch. inodorum* L. (T. 1788).

β. *maritimum* L. (T. 1788) am Seestrande.

\* 429. *Ch. segetum* L. (L. Sch. 1777) früher unter der Saat eine wahre Landplage, jetzt aber durch sorgfältigere Ackerwirthschaft in ihrem Vorkommen schon sehr beschränkt.

430. *Arnica montana* L. (T. 1788) bei Grabow, Ludwigslust und Neustadt nicht selten, bei Güstrow in den Röwer Tannen; bei Kummerow; bei Sülz, früher auch bei Krumbek in einem Gehölz nach der Rehberger Gränze zu. Vergl. S. 41. 121.

431. *Senecio campestris* Retz sp. (Thede 1828) sehr selten, nur bei Satow unv. Kröpelin gefunden; ob dahin nur zufällig verirrt?

432. *S. palustris* L. sp. (L. Sch. 1777).

\* 433. *S. vulgaris* L. (L. Sch. 1777). S. 39. 40. 138.

434. *S. viscosus* L. (T. 1788).

435. *S. sylvaticus* L. (T. 1788).

436. *S. erucaefolius* L. (D. 1828) am Elbberge bei Boizenburg, bei Görslow unv. Schwerin, an Wegen und Ackerändern bei Daffow.

437. *S. Jacobaea* L. (T. 1788).

β. *aquaticus* Huds. (Schultz 1806) an der Trave bei Daffow, bei Grabow, Neustadt, Neubrandenburg u. a. D.

γ. *barbaraeifolius* Krock. (Giesebr. 1837) bei Mirow in der Alee.

438. *S. nemorensis* L. (C. Griew. 1839. 1828!) am Elbufer bei Bierhof unv. Boizenburg! auf dem Mittelwerder bei Dömitz weit und breit wuchernd (Fiedler); bei

Rummer unv. Ludwigslust in einem Erlengebüsch! (Madauß), bei Kladow unv. Krivitz! (Willebr.), bei Rostock, Evershagen; zu Neustrelitz am Zierker See verwildert.

Ann. Ueber die Vereinigung des *S. nemorensis* und *saraceniensis* zu einer einzigen Art s. C. Grievant in Archiv VIII. 185 ff. — Uebrigens scheinen wir in *M.* beide Formen zu haben, wenigstens erklärt Detharding in einem Briefe an Betcke die am Elbufer vorkommende Pflanze verschieden von der bei Rostock wachsenden.

439. *S. paludosus* L. (Schmidt 1828) nur an der Elbe! und ihren Nebenflüssen in der Haideebene.

b. *Cynarocephalae.* *Calendula officinalis* L. (T. 1788) im südlichen Europa heimisch, zeigt sich mitunter als Gartenschlingel. S. 33.

*Echinops sphaerocephalus* L. (Link 1810) ist auf der Schöninsel bei Güstrow verwildert, wie auch an anderen Orten in Norddeutschland, z. B. auf Fasmund und am Elbufer (bei Lauenburg und im Geb. der Flora von Hamburg).

440. *Cirsium lanceolatum* L. sp. (L. Sch. 1777).

441. *C. palustre* L. sp. (L. Sch. 1777).

442. *C. acaule* L. sp. (L. Sch. 1777) fehlt z. B. bei Ludwigslust.

443. *C. oleraceum* L. sp. (L. Sch. 1777).

\* 444. *C. arvense* L. sp. (L. Sch. 1777).

(442 + 43.) *C. oleraceo-acale* (Betcke 1857!) zw. Ave und Marien unv. Penzlin an der Chaussee!

(441 + 43.) *C. hybridum* Koch (Betcke 1857!) bei Brunsdorf unv. Penzlin! und auf den Wiesen an der Burg bei Penzlin, zwischen den Stammeltern.

*Silybum marianum* L. sp. (T. 1788) früher unter dem Namen „Stählkührn“ d. i. Stechföner cultivirt, jetzt aber nur noch selten verwildert. S. 39.

\* 445. *Carduus acanthoides* L. (Nolte s. 1823 sec. Betcke!). Bei Ruhrade unv. Ribnitz (Zabel), bei Wismar



(Wüftnei); bei Buchow unv. Pentzlin! und zwischen Gr. und M. Bielen (Betzke). — Ob nur verirrt?

446. *C. crispus* L. (L. Sch. 1777).

447. *C. nutans* L. (T. 1788).

*C. pycnocephalus* Jacq. wurde im Sommer 1855 in einem einzigen Gr. bei Warnemünde an einer Stelle gefunden, wo im voraufgehenden Jahre französischer Ballast ausgeladen war (G. Griewant).

\* 448. *Onopordon Acanthium* L. (T. 1788). Vergl. S. 32.

449. *Lappa communis* Coss. et Germ., *L. sp.* (L. Sch. 1777). S. 35. 121.

α. *major* Gärt.

β. *minor* DC.

γ. *tomentosa* Lam.

450. *Carlina vulgaris* L. (L. Sch. 1777).

451. *Serratula tinctoria* L. (L. Sch. 1777) zerstreuet durch ganz M.!

452. *Jurinea cyanoides* Gärt. sp. (Schmidt 1828) wurde im J. 1811 bei Ramm zwischen Loosen und Lübbtheen in der Haideebene gefunden und ist zwar später dort vergebens gesucht worden, da sie aber in jener Gegend noch in der Karrenziner Haide (zw. Rosin und Neuhaus), aber schon auf hannöverschem Gebiete vorkommt, also dort einen weiteren Verbreitungsbezirk hat, dürfen wir ihr das Bürgerrecht wohl nicht vorenthalten.

453. *Centaurea Jacea* L. (T. 1788).

454. *C. phrygia* L. (G. Brück. 1828) früher am Wege von Hansdorf nach Gorow und an mehreren Orten derselben Gegend in Hecken, — neuerdings aber dort von keinem Botaniker (namentlich nicht von Betzke!) gesehen;

im J. 1859 aber hat Dr. Weidner sie bei Sülz gefunden. Auch im Gebiet der Flora von Hamburg kommt sie vor.

Anm. *C. nigrescens* ist bei Detharding zu streichen.

\* 455. *C. Cyanus* L. (L. Sch. 1777). S. 40. 121.

456. *C. Scabiosa* L. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 35.

457. *C. maculosa* Lam. (T. 1788) nicht selten, namentlich um Neubrandenburg! Pentzlin (Betcke), Güstrow, fehlt aber bei Ludwigslust, Schwerin und im nördlichen Mecklenburg, wie auch in Neuvorpommern und auf Rügen.

Anm. Schon im J. 1810 machte Link in s. Misc. darauf aufmerksam, daß die südeuropäische *C. paniculata* von der in Deutschland bis auf die neueste Zeit so benannten Art sehr wesentlich abweiche.

*C. Calcitrapa* L. (Arndt 1853) wurde ein einziges Mal auf dem Acker bei dem Neuen Krüge vor Neubrandenburg verirrt gefunden! Mehrfach ist aber mit fremdem Luzernesamen schon

*C. solstitialis* L. (Prahl 1837) eingeschleppt worden, z. B. bei Boizenburg, Güstrow, Doberan und Mallin (an letzterem Orte zugleich mit *Helminthia echioides* von Danneel gef.), — aber sie verschwindet nach einjähriger Dauer immer wieder.

c. Cichoria-  
ceae.

458. *Lampsana communis* L. (L. Sch. 1777).

459. *Arnoseris minima* L. sp. (T. 1788).

460. *Cichorium Intybus* L. (L. Sch. 1777).

461. *Thrinicia hirta* Roth. (D. 1809) auf Wiesen bei Totenwinkel, an Ackerändern hinter Sildemow längs der Warnow, bei Wustrow auf dem Fischlande und bei Dierhagen (Zabel), — aber nicht bei Neustrelitz.

462. *Leontodon autumnalis* L. (L. Sch. 1777).

β. *pratensis* Link 1810.

463. *L. hastilis* L. (L. Sch. 1777).

β. *glabratus*.

464. *Picris hieracioides* L. (T. 1788) bei Daffow

an Wegen und Hecken, zwischen Voltenhagen und Wismar an der Küste häufig, desgl. bei Karenz (Griew.), bei Malchin an Ackerrändern, bei Penzlin an der Vieler Mühle und dem Stadthofe, bei Wolbeck an der Wolfshagenschen Gränze. — Bei Schwerin und Güstrow scheint sie zu fehlen.

*Helminthia echioides* L. sp. (D. 1828) wird hin und wieder aus dem südlichen Europa durch Ballast (bei Warnemünde) und durch Luzernesamen (z. B. bei Mallin!) eingeschleppt, verschwindet aber bald wieder.

465. *Tragopogon major* Jacq. (D. 1809) bei Dömitz, Rostock auf dem Stadtwalle, an der Ostseeküste bei Harkensee, Elmenhorst u. a. D.

*T. porrifolius* L. (T. 1788) bei Rostock, Malchin, Gubtow, Ludwigslust, Ankershagen, ist wohl nur ein Gartenflüchtling.

466. *T. pratensis* L. (L. Sch. 1777) stellenweise sehr häufig.

467. *Scorzonera humilis* L. (T. 1788) auf Seestrandswiesen bei Warnemünde, bei Sülz (Weidner), Malchin auf Wiesen am Grammentiuschen Holze, bei Güstrow in den Röwer Tannen, im Gebiete der Flora von Grabow auf dürrem Sandboden, wo sie aber z. B. bei Ludwigslust schon ausgerottet zu sein scheint.

468. *Hypochoeris glabra* L. (Deth. 1810) auf sandigen Aeckern in der Haideebene, bei Schwerin auf dem Kalkwerder und bei Zippendorf, bei Güstrow, Elmenhorst, Dietrichshagen unv. Rostock, und Mirrow.

469. *H. radicata* L. (L. Sch. 1777) weit verbreitet, selbst am Seestrande.

β. *glaberrima* F. Schultz 1837 bei der Zirzower Mühle unv. Neubrandenburg.

470. *Achyrophorus maculatus* L. sp. (T. 1788)

nicht häufig: z. B. bei Neubrandenburg a. m. D.! bei Remplin auf den höchsten Hügeln (Betcke), bei der Wolfow'schen Gypsmühle (Zab.), Sülz (Weidn.), Parchim, Grabow u. a. D. in der Haideebene.

471. *Taraxacum officinale* Wig.; L. sp. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 31. 122.

β. *lividum* Koch auf Seestrandswiesen bei Dassow und Warnemünde häufig, — aber auch im Blumenlande?

472. *Chondrilla juncea* L. (T. 1788).

β. *latifolia* M. B. (= *acanthophylla* Deth.) am sandigen Ostsee-strande häufig, aber auch auf den Hambergen bei Grevismühlen, bei Grabow und Boizenburg.

473. *Lactuca Scariola* L. (T. 1788): Dömitz auf den Festungswällen (Fiedler), Malchin vor dem Mühlen-thore, Pentzlin (Betcke), Güstrow, Schwerin, Cosa-Bromau u. Friedland. S. 138.

474. *L. muralis* L. sp. (L. Sch. 1777).

*L. virosa* L. (T. 1795), im südlichen Europa heimisch, wurde vor mehr als 60 Jahren bei Sternberg verwildert gefunden; ob sie diesen Standort behauptet hat, ist mir nicht bekannt. S. 138.

\* 475. *Sonchus oleraceus* L. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 39.

\* 476. *S. asper* Will. (T. 1788).

Anm. Nach Link (Mser.) unterschiebe sich diese Art von der vorigen, außer durch die in den Floren angegebenen Kennzeichen, auch noch durch die spindelförmige Wurzel, während *S. oler.* eine vielfach zertheilte habe — Ich selbst kann das Geständniß nicht unterdrücken, daß es mir überhaupt mit der specifischen Trennung beider Arten noch etwas mißlich vorkommt.

477. *S. arvensis* L. (L. Sch. 1777).



*β. intermedius* Brückn. mit kahlen Blütenstielen und Hauptkelchen, z. B. bei Neubrandenburg.

*γ. maritimus* caule 1-2 floro, simplici, 1-pedali, foliis integerrimis, acute denticulatis (Deth.) auf salzhaltigen Strandwiesen. 230

478. *S. palustris* L. (Link 1808) wurde bisher nur im nördlichen M. gefunden: am Daffower See, am Ufer der Stepenitz und der Warnow (bei Marienehe), am Torfgraben bei Markgrafenhaide und in sumpfigen Gräben bei Tottenwinkel.

479. *Crepis biennis* L. (T. 1788) soll im nördlichen M. seltner vorkommen, als im südlichen, doch ist sie auch dort an einzelnen Orten häufig, wie z. B. bei Wismar am Wege nach Pöl (C. Griew.).

480. *C. tectorum* L. (T. 1788).

*β. integrifolia* Link 1810 = *stricta* Schultz.

481. *C. virens* Will. (Link 1810).

*β. pinnatifida* W.

482. *C. paludosa* L. sp. (T. 1788).

483. *Hieracium pilosella* L. (L. Sch. 1777).

*β.?* *stoloniflorum* W. K.? (Madauss 1841) nach Langmann von Madauß bei Lutheran unv. Lübz gefunden.

Ann. Die Var. *pilosissimum* bei Deth. ist zu streichen, s. Griew. krit. Studien S. 31.

484. *H. Auricula* L. (T. 1788) häufiger im östlichen M., westlich von Schwerin noch nicht gefunden.

(483 + 84.) *H. Pilosello-Auricula* G. Griew. 1856, krit. Studien S. 33, hin und wieder zw. den Stammeltern.

485. *H. praealtum* Will. (Betzke 1828) in einer Bachschlucht bei Daffow, selten; bei Malchin auf dem

neuen Rücken, um Penzlin nicht selten; Neubrandenburg vor dem Trollenhägener Holze rechts nach Neverin zu, im Schloßgarten zu Hohenzieritz.

486. *H. Rothianum* Wallr. (Betzke 1828 als *echioides*) bei Malchin (nicht Penzlin) auf dem neuen Kirchhofe und an der Stadtmauer.

487. *H. pratense* Tausch. (Schultz 1806) bei Neubrandenburg auf den Birkbuschwiesen, bei Schwerin an der Wismarschen Chaussee auf der Wadewiese, im Gebiete der Flora von Grabow, bei Glüstraw auf dem Rosiner Torfmoor, bei Malchin, Burg Schütz, Mollensdorf, Penzlin.

488. *H. murorum* L. (L. Sch. 1777).

β. *sylvaticum* Koch.

γ. *polyphyllum* Neilr. = *vulgatum* Fr.

489. *H. sabaudum* L. Neilr. (T. 1788).

α. *boreale* Fr.

β. *rigidum* Hartm.

490. *H. umbellatum* L. (T. 1788).

Ann. In keiner andern Familie geschieht das Verwildern und Einbürgern so leicht, wie in dieser, weil die meist mit einer Federkrone versehenen Früchtchen durch den Wind fortgeführt und weit verstreuet werden. Daher ist auch in keiner Familie der ursprüngliche Bestand der Flora so schwierig fest zu stellen, weil manche als einheimische Pflanzen erscheinende, wohl nur eingebürgerte, früher zu verschiedenen Zwecken cultivirte Pflanzen sind, die jetzt freilich schon lange nicht mehr angebauet werden. Sollten daher anderen Botanikern der von mir gebrauchten Sterne zu viele oder zu wenige scheinen, so will ich darüber nicht streiten.

51. Ambrosi-  
aceae

\* 491. *Xanthium Strumarium* L. (T. 1788), früher häufig in M. eingebürgert, jetzt aber hier, wie auch in andern deutschen Ländern (z. B. in Württemberg) immer

mehr verschwindend, in Schweden (nach Fries) sogar schon ganz ausgestorben. Ich habe es lange auf meinen Excursionen nicht gesehen, bis ich es im J. 1856 bei Kl. Nemerow, wo Schulz es schon vor mehr als fünfzig Jahren sammelte, wieder fand. Als anderweitige Standorte werden genannt: Warnemünde, Malchin häufig (L. 1788), Neubrandenburg an der Stadtmauer (Schulz 1806, — verschwunden?), Pleetz (! 1835), Güstrow in der Schnoien Vorstadt (Pr. 1837), Lübkow bei Penzlin, Boizenburg auf Sanddünen häufig (1828 C. Griew.). Bei Dömitz (Fiedler) und Ludwigslust (G. Brück.) ist es verschwunden, und scheint im Gebiete der Floren von Grabow und Schwerin ganz zu fehlen.

492. *Lobelia Dortmanna* L. (Nolte c. 1823) im <sup>52. Lobelia-</sup> Mechower See im Ratzburgischen; sie ist zwar später von <sup>ceae.</sup> keinem meßb. Botaniker weiter gesehen, und namentlich von C. Griewank und Willebrand dort im J. 1837 vergeblich gesucht worden; da aber ihr Fund auf guter Autorität beruhet und sie in dem angrenzenden Holstein einen weiteren Verbreitungsbezirk hat, darf ihr das Bürgerrecht wohl nicht vorenthalten werden.

493. *Jasione montana* L. (L. Sch. 1777).

53. *Campanulaceae.*

β. *major* = *perennis* Deth.

γ. *litoralis* Fr.

494. *Phyteuma spicatum* L. (T. 1788).

495. *Campanula rotundifolia* L. (L. Sch. 1777).

496. *C. patula* L. (L. Sch. 1777).

\* 497. *C. Rapunculus* L. (Link 1795) in der Haldeebene nicht selten, bei Wustrow (am Salzhaß?); im öst-

lichen M. nur in dem Raume zwischen Wendorf, Ankershagen und Zahren unweit Pentzlin. — Eingebürgert?

498. *C. persicifolia* L. (T. 1788).

499. *C. bononiensis* L. (Schultz 1819) in der nördlichen Hälfte von M. Strelitz nicht selten, besonders um die Tolense herum auf Hügeln und in Schluchten! außerdem bei Pentzlin, Rargow unweit Waren, Rostock u. a. D., — fehlt aber im Haide- und Sandgebiet, wie auch bei Güstrow und Schwerin.

\* 500. *C. rapunculoides* L. (L. Sch. 1777).

501. *C. Trachelium* L. (L. Sch. 1777).

502. *C. latifolia* L. (Schultz 1806) bei Neubrandenburg a. m. D.! Ribnitz, Kröpelin, A. Karin, Daffow in vielen Gehölzen, namentlich in einem Bruche zwischen Harkensee und Rosenhagen (C. Griew.).

503. *C. Cervicaria* L. (Schultz 1806) sehr selten in M., — ich selbst habe sie nie gefunden und ich kann auch nur einen einzigen Fundort angeben, wo sie gewiß vorkommt, nämlich ein Gehölz zwischen Jägerhof, Karlsruhe und Schmachtenhagen unweit Waren, wo Hr. Drewes in Güstrow (in dessen Herbarium ich ein dieser Localität entstammendes Exemplar gesehen haben,) sie im J. 1842 gesammelt hat; nach einer neueren Mittheilung des Herrn Pastor Neuter in Jabel (gest. 1860) käme sie in jenem Gehölze an der Landstraße von Waren nach Gr. Giewitz sogar in großer Menge vor.

Anm. Alle anderen von früheren Floristen angegebenen Fundorte werden zu streichen sein, indem die Pflanze an manchen ausgerottet sein mag, an anderen aber mit der folgenden Art verwechselt worden ist. — Schultz will sie bei Ballin unv. Stargard gefunden



haben, — es fehlte aber (nach Einl. Mscr.) der Beweis dafür in seinem Herbarium.

504. *C. glomerata* L. (L. Sch. 1777) fehlt in der Haideebene und im Klüger Ort; bei Wismar kommt sie schon vor und ist im östlichen M. weit verbreitet!

*Specularia Speculum* L. sp. (Schreiber 1853) wurde bei Grabow und Daffow mit der Saat eingeschleppt; an letzterem Orte bemerkte C. Griewank sie zuerst im J. 1839, und auch im vorigen Jahre fand er sie dort und auch auf der Feldmark von Rosenhagen in großer Menge unter dem Raps.

505. *Vaccinium Myrtillus* L. (L. Sch. 1777). <sup>54. Vaccinicae.</sup>  
Vergl. S. 30. 31. 111. 122.

506. *V. uliginosum* L. (L. Sch. 1777) besonders häufig in der Haideebene! aber auch in anderen Landestheilen vorkommend. — Vergl. Bulgraven S. 31.

507. *V. Vitis Idaea* L. (T. 1791) in den Haide- und Sandgegenden weit verbreitet und stellenweise sehr häufig; — Vergl. S. 30. 35. 111.

508. *V. Oxycoccus* L. (L. Sch. 1777). S. 35.

509. *Arctostaphylos Uva ursi* L. sp. (Weigel 1828) <sup>55. Ericineae.</sup>  
auf dem Fischlande; in der Dobertiner Haide am Wege von Schwinz nach Sandhof; zwischen Picher und Kraak, bei Grabow in den Tannen zwischen der Stadtziegelei und Gr. Laasch. Fehlt in M. Strelitz.

510. *Andromeda polifolia* L. (L. Sch. 1777).

511. *Calluna vulgaris* L. sp. (L. Sch. 1777).

512. *Erica Tetralix* L. (T. 1791) häufig in den Haidegegenden! auch bei Warnemünde, Markgrafenhaide und Sülz; fehlt in M. Strelitz.

513. *Ledum palustre* L. (L. Sch. 1777). — Vergl. Porst S. 37, ein Name der wahrscheinlich slavischen Ur-

sprungs ist, denn im Russischen bezeichnet Porosst Strauchwerk auf Wiesen. S. 122. 138.

514. *Pyrola rotundifolia* L. (L. Sch. 1777) bei Neubrandenburg im Brüderbruch! von Nolte häufig bei der Ziegelei nördlich vom Blauer See im Moor gefunden, — von Wüßtnei auch im Steinfeld der Holz bei Schwerin. Von den älteren einheimischen Botanikern ist sie meist mit der folgenden verwechselt worden.

515. *P. chlorantha* Sw. (Link 1810).

516. *P. minor* L. (T. 1788), sogar in den Dünenkesseln bei Warnemünde.

517. *P. secunda* L. (T. 1788).

518. *P. uniflora* L. (T. 1788).

519. *P. umbellata* L. (T. 1788) im Gebiete der Sandflora nicht selten! aber auch in den Tannen bei Bafedow (Betsche) und Rothenmoor! bei Brudersdorf.

Ann. *P. media* Sw., mit welcher uns die Floristen beschenken, ist zu streichen, denn Betsches Vermuthung (Archiv V. 212), daß die von Detharding, Link u. a. angeführte *P. media* nichts anderes als *P. chlorantha* sei, wird durch eine anscheinend von Blandows Hand in Timms Exemplar seines Prodrömus hineingeschriebene Diagnose bestätigt, woraus hervorgeht, daß unsere älteren Botaniker der *P. chlorantha* jenen Namen beilegt. Auch Detharding selbst hat später brieflich gegen Betsche seine Angabe im *Conspectus* zurückgenommen.

56. Monotropeae.

520. *Monotropa Hypopithys* L. (T. 1788).

β. *hirsuta* z. B. bei Ankershagen (Betsche).

57. Aquifoliaceae.

521. *Ilex Aquifolium* L. (T. 1788) in der Heideebene! nicht selten, bei Loosen z. B. mindestens 16' hoch; bei Güstrow im Primer; in den Wäldern bei Ribnitz und auf dem Fischlande (Zabel). Vergl. Hülsbusch S. 34.

522. *Fraxinus excelsior* L. (L. Sch. 1777). S. 29. 58. Oleaceae.

*Ligustrum vulgare* L. (L. Sch. 1777) cultivirt und verwildert  
3. B. auf dem Windmühlenberge bei Kemplin (Zabel).

523. *Cynanchum Vincetoxicum* L. sp. (L. Sch. 59. Asclepiadeae. 1777) auf der Insel Buchwerder im Daffower See, auf Pöl, bei Boizenburg, Neubrandenburg häufig! Scheint im Gebiete der Floren von Schwerin, Grabow, Ludwigslust, Güstrow und Malchin zu fehlen. S. 138.

524. *Vinca minor* L. (T. 1788) bei Boizenburg am 60. Apocynae. Schloßberge, Ludwigslust zwischen Warlow und Picher, Malchin auf dem Stadtwalle, im Kempliner Laubwalde unweit des Saatenberges, im Schwandter Buchholz nach Lüdershof hin, in der Mildenitzer Haide; bei Neubrandenburg hinter dem hohen Ufer, wo ich die Pflanze vor etwa 20 Jahren häufig fand, habe ich sie neuerdings vergebens gesucht, ohne daß diese Localität anderweitige Veränderungen erlitten hätte. (S. 41.)

525. *Menyanthes trifoliata* L. (L. Sch. 1777). S. 32. 122. 61. Gentianeae.

526. *Limnanthemum nymphaeoides* L. sp. (Crome 1809) bei Dömitz in der Elde beim Brodaer Hafen und im schwarzen Wasser bei Polz; bei Boizenburg in Wassergräben und in der Sude häufig; früher auch im Schweriner See, wo sie aber nicht mehr vorhanden zu sein scheint. Fehlt in M. Strelitz.

527. *Sweertia perennis* L. (T. 1788) bei Parchim auf den Slater Wiesen, Sternberg, Wankow, Barkow unweit Plau; auf den Recknitz- und Trebelwiesen; bei Malchin, Neubrandenburg auf den Birkbuschwiesen! Galenbeck unv. Friedland bei der Teufelsbrücke.

528. *Gentiana cruciata* L. (T. 1788) bei Malchin,

Nemplin und Faulenrost; Neubrandenburg am Datzberge! und zwischen den Bergen am Wege nach Neverin! am Britwitzer und Weisdiner Schloßberge.

529. *Gentiana Pneumonanthe* L. (Blandow 1806) in der Haideebene häufig! aber auch bei Schwerin, Goldberg, Mirow und im Häschenborfer Holz bei Rostock.

530. *Gentiana campestris* L. (L. Sch. 1777). S. 40. 122.

531. *Gentiana Amarella* L. (A. Brück. 1803) und zwar die Form *uliginosa* W. bei Neubrandenburg auf dem alten Turnplatze! im Brüderbruch und auf den Wiesen bei der Krappmühle; bei Pleetz (unweit Friedland) auf der Pferdewiese! Malchin auf den Wiesen am Basesdower Scheidegraben; bei Markgrafenhaide; bei Dassow auf Salzwiesen und benarbten Stellen der Döseeküste.

Anm. Eine Vereinigung unserer Art mit der mittel- und süddeutschen, von ihr habituell so verschiedenen *G. germanica* W. kann ich nicht für gerechtfertigt halten, zumal bei der weiten Verbreitung der *Amarella* in Mecklenburg und der Mark, sie sich immer gleich bleibt und niemals eine *G. germanica* daraus wird. — An meinen Exemplaren aus der Umgegend von Neubrandenburg und Berlin sind die linear-lanzettförmigen Kelchzipfel ungemein lang, fast von der Länge der Blumenkrone selbst. — Sie wird nie so üppig als die schöne *G. germanica*, welche ich in den baierischen Alpen in 6. von 1' Höhe und mit 90, zum Theil 1" langen Blüthen gesammelt habe.

532. *Cicendia filiformis* L. sp. (Crome 1828) in der ganzen Haideebene in feuchten Gräben auf Moorboden! aber auch bei Marnitz und auf feuchten, sandigen Wiesen bei Schwan.

533. *Erythraea Centaurium* L. sp. (L. Sch. 1777) häufig durch ganz M. — Vergl. S. 40. 122.



534. *Erythraea linariaefolia* Pers. (Link 1808) auf Salzwiesen am Seestrande bei Warnemünde und Daffow.

535. *Erythraea ramosissima* Pers. (Link 1806) durch ganz Mecklenburg zerstreuet, aber nicht häufig.

β. *pulchella* Sw. sp., caule subsimplici, plerumque unifloro (Link 1806) auf Salzwiesen am See-  
strande, bei Sülz (Weidner).

536. *Polemonium coeruleum* L. (Schreib. 1853), <sup>62. Polemoniaceae.</sup> bei Grabow verwildert, im Trebelthale an mehreren Orten in Erlebrüchern ziemlich häufig, z. B. bei Wasdow, Tangrim, Karlsthal bis Eichenthal, anscheinend wild (Weidner).

*Collomia grandiflora* Dougl., nicht *linearis* Nutt. (F. Timm 1851) eine im nordwestlichen Amerika heimische Pflanze, kommt bei den Basedower Tannen in großer Menge vor, wahrscheinlich dem Basedower Schloßgarten entflohen, und scheint Lust zu haben sich in M. einzubürgern.

537. *Convolvulus sepium* L. (L. Sch. 1777). S. 40. <sup>63 Convolvulaceae.</sup>

538. *Convolvulus arvensis* L. (L. Sch. 1777). S. 41.

Ann. *C. Soldanella* L., mit welcher uns einige deutsche Floren beschenken, ist zu streichen. — Dagegen wird ohne Zweifel der aus Sibirien stammende *C. davuricus* Siems., welchen man unter dem Namen der perennirenden Winde seit etwa 10 Jahren allgemeiner in den Gärten zieht, sich in unserer Flora noch vollständig einbürgern. Schon in den Gärten wuchert er fast ärger als der Hopfen, so daß er dort nur mit großer Aufmerksamkeit und nach jahrelangem Kampfe wieder zu vertilgen ist; wie wird er dann erst, wenn es ihm einmal dem Garten zu ent schlüpfen gelingt, im Freien um sich greifen, wo Niemand ihn in Schranken zu halten oder auszurotten strebt?

539. *Cuscuta europaea* L. (L. Sch. 1777). S. 40.

540. *Cuscuta Epithymum* L. = *C. Trifolii* Babing. (Siems. 1828) nur im westlichen und südwestlichen M.

bis jetzt gefunden: auf Aescfeldern bei Daffow, wo sie besonders zur Zeit der Nachnacht ganze Felder überzieht und zerstört; auf Wiesen bei Grabow, Ludwigslust, Jasiniz, Schwerin und Sternberg.

\* 541. *Cuscuta Epilinum* Weihe (D. 1828) bei Grabow, Güstrow, Malchin u. a. D. auf Flachsfeldern, mit Leinsamen eingeführt.

542. *Cuscuta monogyna* Vahl. (Griew. 1839. 1828!) wurde zwar nur einmal bei Altenhof unv. Boizenburg auf *Salix viminalis* gefunden, da sie aber von dort abwärts an der Elbe bis in das Gebiet der Flora von Hamburg vorkommt, dürfen wir ihr die Ausnahme unter die Bürger der Flora wohl nicht weigern.

Ann. Die *Cuscutina suaveolens* Ser. (*hassiacica* Pfeif), welche sich seit 1843 im mittleren Deutschland, besonders unter der Luzerne, an vielen Orten zu Zeiten massenweise eingefunden hat, ist in Mecklenburg noch nicht gesehen worden. Sie stammt aus dem südlichen Amerika und ihre Ueberstiedlung nach Deutschland ist den Botanikern sehr räthselhaft gewesen. Vielleicht bin ich im Stande etwas zur Lösung dieses Räthfels beitragen zu können. Zwischen den J. 1830 und 40, etwa um die Mitte jenes Decenniums, wurden den deutschen Landwirthen vielfältig in den öffentlichen Blättern einige neue südamerikanische Futterkräuter als ganz vorzüglich angepriesen, welche auch zum Anbau in Deutschland geeignet seien. Darunter befand sich auch eins, welches den Namen Alfalfa führte, und welches ein mir verwandter meßb. Landmann sich in Folge jener Anpreisungen zusammen mit *Paspalum stoloniferum* und einem *Tripsacum*, aus Balparaiso kommen ließ. Als besagte Alfalfa angelangte, erwies es sich aber, daß sie nichts anderes sei, als die längst bekannte — Luzerne, welche in Folge dieser Entdeckung, wenn ich nicht irre, nun gar nicht ausgefäet wurde. Vielleicht haben andere mitteldeutsche Landwirthe sich auf gleiche Weise täuschen lassen und Alfalfa aus Süd-Amerika bezogen, welche ihnen dann wahrscheinlich die *C. sua-*

veolens als ein der Luzerne dort beigefelltes Unkraut mitgebracht haben wird.

543. *Asperugo procumbens* L. (L. Sch. 1777). <sup>61</sup> Boragi-  
 neae.  
 Ruderalpflanze, z. B. bei Neubrandenburg am Stadthofe  
 sehr häufig! desgl. bei Pentzlin und Malchin (Betzke),  
 Dargun (Struck), Medow unweit Goldberg, selten bei  
 Schwerin. — In der Haideebene scheint diese Pflanze zu  
 fehlen.

544. *Echinosperrnum Lappula* L. sp. (T. 1795)  
 Malchin zwischen den Schennen vor dem Steintore, an  
 der Friedländer Stadtmauer (1803), bei Mildenitz unv.  
 Woldeck an der Wolfsh. Gränze auf der Mauer bei dem  
 alten Thurne (1806); früher auch auf der Ballaststelle  
 bei Warnemünde.

Ann. Ich habe diese Pflanze in M. noch niemals lebend beob-  
 achtet, auch ist sie in neuerer Zeit von keinem unserer Botaniker  
 wieder erwähnt worden. Ob sie an jenen Standorten noch vorhanden  
 sein mag? Da sie auf Arkona, bei Demmin und Prenzlau, so wie  
 auch auf den Müldersdorfer Kalkbergen (wo ich sie selbst gesammelt,  
 vorkommt, — also weit im nordöstlichen Deutschland verbreitet ist,  
 halte ich sie für eine wirklich hier heimische Art.

545. *Cynoglossum officinale* L. (L. Sch. 1777).  
 S. 122. 137.

*Omphalodes verna* Mönch. (Wredow 1809) hin und wieder  
 verwildert, z. B. bei Wittenburg, im Ludwigslust Schloßgarten.

*Borago officinalis* L. auf Schuttstellen verwildert, soll aus dem  
 Oriente stammen.

546. *Anchusa officinalis* L. (L. Sch. 1777); sie  
 variiert mit etwas größeren, weißen Blumen.

\* 547. *Anchusa arvensis* L. sp. (L. Sch. 1777) eingeb.

*Nonnea pulla* L. sp. (O. Danneel 1849) bei Dargun auf der  
 Feldmark des alten Bauhofes am Rande einer Mergelgrube; in der

Ludwigsluster Baumschule, aber nur einmal gefunden. Wahrscheinlich ist diese Pflanze nur zufällig eingeschleppt worden.

548. *Symphytum officinale* L. (L. Sch. 1777). S. 112.

549. *Echium vulgare* L. (L. Sch. 1777).

550. *Pulmonaria officinalis* L. (L. Sch. 1777) häufig in M., nur in der Haideebene selten. S. 122.

Anm. *P. oblongata* Schrad., von Langmann auf Wetde's Autorität aufgeführt, ist zu streichen, da letzterer bei weiterer Beobachtung gefunden hat, daß die anfänglich für *oblongata* gehaltenen Pflanzen sich zur *P. officinalis* herausbildeten. — Ob Dethardings *P. officinalis*  $\beta$  (*omnibus partibus quadruplo minor et multo hirsutior, foliis immaculatis, radicalibus ovato-lanceolatis in petiolum productis, nec cordatis, vix unciam longis*) wirklich *P. angustifolia* L. sei, weiß ich nicht, da sie mir noch nicht zu Gesichte gekommen ist; sie soll bei Lüßow (im Predigerholz) und Striesdorf unv. Güstrow wachsen.

\* 551. *Lithospermum officinale* L. (L. Sch. 1777) fehlt im Gebiete der Floren von Grabow, Ludwigslust und Güstrow? eingebürgert?

\* 552. *Lithospermum arvense* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert.

553. *Myosotis palustris* With. (L. Sch. 1777).

$\beta$ . *caespitosa* Schultz (1819) kann ich mit Döll nur für eine Varietät der sehr veränderlichen Stammform halten; sie findet sich sogar am Seeufer bei Warnemünde und Dassel.

554. *Myosotis sylvatica* Hoffm. (D. 1828).

555. *Myosotis intermedia* (Link 1808).

556. *Myosotis hispida* Schlecht. (T. 1788?)

557. *Myosotis versicolor* Pers. (D. 1828).

558. *Myosotis stricta* Link (Schultz 1819).

559. *Myosotis sparsiflora* Mik. (Schultz 1837) bis-



her nur in M. Strelitz gefunden: bei Friedrichshof und bei Neustrelitz in der Schloßkoppel. — Ihr anderweitiger nächster Standort ist im Geb. der Flora von Hamburg.

\* 560. *Solanum nigrum* L. (L. Sch. 1777) allgemein <sup>65. Solanaceae.</sup> eingebürgert. S. 138.

β. *miniatum* Bernh. (Schultz 1837) bei Neustrelitz und bei Daffow am Traveufer; beim Sandkrug zw. Wismar und Rütz (Weidner).

γ. *humile* Bernh. (John 1837) bei Güstrow und häufig im Predigergarten zu Kladow bei Krivitz, wo die Stammform gänzlich fehlt (Willebrand 1856).

561. *Solanum Dulcamara* L. (L. Sch. 1777). S. 30. 122. 138.

*Physalis Alkekengi* L. (T. 1795), *Nicandra physaloides* Gärt. (C. Griew. 1829!) und *Atropa Belladonna* L. (Anon. 1783) cult. und verwildert; dasselbe ist mit *Lycium barbarum* L. (Lgm. 1841) der Fall.

\* 562. *Hyoscyamus niger* L. (L. Sch. 1777) ist wohl nur eingebürgert. Vergl. Dull Bitterfrut S. 32. 122. 136.

β. *agrestis* Kit.

\* 563. *Datura Stramonium* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert auf Schuttstellen, aber in seinem Vorkommen sehr unbeständig. — Vergl. Stählehn S. 39. 123. 129. 136.

564. *Verbascum Thapsus* L. (L. Sch. 1777). S. 123. <sup>66. Scrophulariaceae.</sup>

565. *V. phlomoides* L., G. Meyer, Neilrich (Schultz 1819) bei Neubrandenburg hinter Belvedere, Roga unv. Friedland, im Prilwitzer Schloßgarten, Grabow auf dem Kirchhofe und beim Schießhause, W. Wehningen, Boizenburg am Schlosse und Elbberge. <sup>a. Verbasceae.</sup>

β. *thapsiforme* Schrad. (Schultz 1819) in

manchen Gegenden, z. B. bei Neubrandenburg, sehr gemein, viel häufiger als die Stammform und *Thapsus*.

566. *V. Lychnitis* L. (Brück. 1803) bei Neubrandenburg auf dem Walle und bei der Papiermühle, bei Neustrelitz, Wittenhagen (unw. Feldberg) am Wege nach Tornowhof, Grabow u. s. w.

β. *album* Link 1810 = *V. Moenchii* Schultz 1819, bei Stargard am Schloßberge sehr häufig, wo es schon im J. 1810 beobachtet wurde und ich es auch noch in den J. 1838 und 1855 fand, und zwar ausschließlich diese Var., nicht aber die gelbblühende Stammart; Link fand sie auch bei Neustrelitz und im Kempliner Park.

567. *Verbascum nigrum* L. (L. Sch. 1777) sehr gemein, — z. B. auch auf dem Starg. Schloßberge.

β. *bracteatum* G. Meyer, und zwar *flor. albis*.

Anm. Diese schöne Var. fand ich am 30. Juli 1855 an der Chaussee bei Moltow in zwei Exemplaren inmitten zahlreicher Exemplare der Stammform, welche dort in der ganzen Gegend südlich vom Malchiner See auf dem mergelhaltigen Boden unter den *Verbascis* vorherrscht, während auf dem sandigen Boden in der Nähe von Waren *V. thapsiforme* entschieden das Uebergewicht bekommt.

(565 + 566.) *V. thapsiforme - Lychnitis* Schiede (*ramigerum* Schr. Link 1810) bei Stargard auf dem Schloßberge von Schultz in einem einzigen Ex. gefunden; bei Pentzlin, bei Klink a. d. Müritz.

(564 + 567.) *V. Thapso-nigrum* Schiede (*collinum* Schr. Schultz 1819) bei Neubrandenburg a. m. O.! im Dorfe Bafedow; bei Grabow a. m. O.; auf der Insel Buchwerder im Daffower See.

(565 + 567.) *V. thapsiforme-nigrum* Schiede (*adulterinum* Koch. Brockm. 1853) bei Grabow unw. des

Bahnhofes in 1 Gr. zwischen den Stammeltern; auch bei Grabow fand es Willebrand 1854 in einem Exemplare.

(565 + 567.) *V. nigro-phlomoides* Brockm. 1855 (*collino-nigrum* Brockm. im Archiv VII. S. 257) auf dem Grabower Kirchhofe zwischen den Stammeltern. — Vergl. Brockmüller in den Archives de la Flore de France et d'Allemagne 1855 p. 35.

(566 + 567) *V. nigro-Lychnitis* Schiede (Schultz 1819 S. 15) bei Stargard am Schloßberge.

Anm. Einzelne Localitäten, wie der Starg. Schloßberg und einige Orte bei Grabow, begünstigen die Bastardbildungen sehr, da die Stammeltern dort auf einem kleinen Raume zusammengedrängt vorkommen.

*V. speciosum* Schrad. (Schreib. 1853) wurde im Ludwigsfluster Schloßgarten verwildert gefunden, desgleichen

*V. Blattaria* L. (Brock. 1852) bei der Dömitzer Ziegelei, wohin der Same, nach Dr. Fiedlers Urtheil, durch eine Elb-Ueberschwemmung gelangt war.

568. *Scrophularia nodosa* L. (L. Sch. 1777). b. Antirrhine.

569. *Scrophularia aquatica* L. var. *Ehrharti* Stev. (T. 1788).

*Ser. vernalis* L. (Danneel 1849) verwildert bei Teterow, Grabow und Ludwigsflust.

570. *Gratiola officinalis* L. (T. 1788) häufig auf den Wiesen der Haideebene, aber auch bei Schwerin, Warnemünde und Schlage unv. Rostock. S. 138.

571. *Digitalis ambigua* Murr. (Schmidt! 1836) in einem Walde zwischen Brechen und Schönhof unv. Feldberg; im Wildpark bei Neustrelitz (Weidner); in einem Buchenwalde am Kölpin-See; auf einer Waldwiese zw. dem Primer und Ruhner Berg bei Marnitz; im Poiten-

derjer Holz bei Grabow; im Steinfelder Holz bei Schwerin. S. 138.

\* 572. *Antirrhinum Orontium* L. (Thede 1809) auf sandigen Aekern bei Daffow, Warin und in der Haideebene eingebürgert.

\* 573. *Linaria minor* L. sp. (T. 1788) an dem steinigen Seestrande bei dem h. Damme nach Rethwisch zu; auch als Unkraut in Gärten und auf Aekern eingebürgert, obgleich nicht häufig, z. B. bei Kemplin auf Aekern (Betsche), zu Neubrandenburg in Gärten!

\* 574. *Linaria Elatine* L. sp. (Thede 1806) bei Schöffin und Daffow nach der Ernte auf den Feldern; eingebürgert.

*L. arvensis* L. sp. (Drewes 1841) bei Wredenhagen und Besow, ist wahrscheinlich nur zufällig mit der Saat eingeschleppt.

\* 575. *Linaria vulgaris* Mill. L. sp. (L. Sch. 1777) halte ich gleichfalls nur für eine eingebürgerte Pflanze. S. 123.

Anm. *L. Loeselii* kommt in M. nicht vor; vergl. Archiv V. S. 166.

576. *Veronica scutellata* L. (T. 1788); auch bei Warnemünde.

577. *Veronica Anagallis* L. (T. 1788).

578. *Veronica Beccabunga* L. (L. Sch. 1777) S. 36. 123.

579. *Veronica Chamaedrys* L. (L. Sch. 1777).

580. *Veronica montana* L. (Thede 1806) bei Grabow im Werker und Beckentiner Holz, Schwerin auf dem Werder, in der Zickhuser Forst, im Primer bei Güstrow, im Kempliner und Kalenschen Holz bei Malchin, in der Bürgerhorst bei Neustrelitz.

581. *Veronica officinalis* L. (L. Sch. 1777). S. 123.



582. *Veronica latifolia* L. (T. 1788) im östlichen M. nicht selten, (um Malchin und Neubrandenburg! sehr häufig,) scheint im Gebiete der Floren von Güstrow und Schwerin zu fehlen und auch in der Grabower Flora (wie Schreiber dies Gebiet abgegränzt hat,) nur an einer einzigen Stelle, nämlich bei Ludwigslust, vorzukommen.

Ann. Ob auch die var. *prostrata* L. (Sach 1841) auf der Schäferwiese bei der Uferiner Mühle vorkommt, bedarf noch der Bestätigung; in der Mark im Gebiete der Berliner Flora gemeinschaftlich mit *Potentilla verna* (cinerea) und *Euphorbia Cyparissias* auftretend, deren Verbreitungsbezirk sich bis in das südliche sandige M. Strelitz herein erstreckt, dürften wir sie auch hier erwarten.

583. *Veronica longifolia* L. (Brück. 1803) Neubrandenburg auf den Birkenbuschwiesen am Tolenseufer! Neustrelitz am Wege nach Gr. Quassow im Graben beim Torfbruch, bei Süß (Roch), am Ufer der Elbe! und ihrer Nebenflüsse in der Haideebene.

584. *Veronica spicata* L. (T. 1788) namentlich im östlichen M. (z. B. bei Neubrandenburg!) nicht selten.

β. *laxiflora* (E. Boll 1855) mit lockerblütiger Traube, deren übereinander stehende Blumen durch ansehnliche Zwischenräume getrennt sind; der Stengel ist nach oben zu etwas kantig. Im Remerower Holz bei Neubrandenburg unweit des hohen Ufers; Juni 1855.

585. *Veronica serpyllifolia* L. (L. Sch. 1777).

586. *Veronica arvensis* L. (L. Sch. 1777).

587. *Veronica verna* L. (L. Sch. 1777).

588. *Veronica triphyllos* L. (L. Sch. 1777).

Ann. *V. praecox* All. will A. Brückner 1817 bei Pleetz am Grabenrande des Knüppelbannes gefunden haben, was nicht unmöglich wäre, da sie in Norddeutschland ziemlich weit hinaufreicht

(Berlin, Prenzlau und Stettin); es fehlt aber der Beweis für diesen Fund.

\* 589. *Veronica agrestis* L. (L. Sch. 1777) allgemein auf cult. Boden eingebürgert. Nur für Varietäten dieser Species kann ich halten:

β. *opaca* Fr. (Griew. 1847).

γ. *polita* Fr. (Schultz 1837).

\* 590. *Veronica Buxbaumii* Ten. (D. 1828) bei Ronow, Ludwigslust, Schwerin, Rostock, Madow und bei der Gielower Mühle (Zabel) in Gärten als Unkraut, mit ausländischen Sämereien eingebürgert.

\* 591. *Veronica hederaefolia* L. (L. Sch. 1777) auf cult. Boden eingebürgert.

592. *Limosella aquatica* L. (T. 1791) z. B. bei Neubrandenburg! Sponholz! Wulfenzin (Betsche), Allersdorf unnt. Marlow (Zab.), Boizenburg, in der Teldau u. a. D.

c. Rhinanthaeae.

593. *Melampyrum cristatum* L. (T. 1795) in der Haldeebene und in dem kleinen nordöstlichen Haldegebiete häufig, aber auch an der Trave bei Daffow.

\* 594. *Melampyrum arvense* L. (L. Sch. 1777) mit dem Getreide eingebürgert.

595. *Melampyrum nemorosum* L. (L. Sch. 1777). S. 31.

596. *Melampyrum pratense* L. (L. Sch. 1777).

Anm. *M. sylvaticum* L. ist in M. noch nicht gefunden worden, denn Timms *M. sylv.* ist nichts anderes als *M. pratense*. Vint nennt es zwar 1795, später in j. Mscr. 1810 fehlt es.

597. *Pedicularis sylvatica* L. (L. Sch. 1777). S. 138.

598. *Pedicularis palustris* L. (L. Sch. 1777). S. 35. 36. 138.

599. *Pedicularis Sceptrum Carolinum* L. (T. 1788)

früher bei Neubrandenburg auf den Tolense-Wiesen! jetzt durch Torfstich ausgerottet, ebenso auch bei Gülz; auf den Beenewiesen bei Malchin ist sie noch vorhanden! bei Runow östlich von Krivitz soll diese schöne Pflanze gleichfalls vorkommen. S. 138.

600. *Rhinanthus minor* Ehr. (D. 1828) auf den Wiesen der Haideebene häufig; bei Dammwalde am Wentower See? (Struck).

601. *Rhinanthus major* Ehr. (L. Sch. 1777). S. 35.

602. *Euphrasia officinalis* L. (L. Sch. 1777).

β. *pratensis* = *Rostkowiana* Auct.

603. *Odontites rubra* Pers. = *Euphr. Odontites* L. (L. Sch. 1777) bildet nach Zabel drei in einander übergehende Formenreihen:

α. *latifolia*, (*O. verna* Reich.)

β. *angustifolia* (*O. serotina* Reich?)

γ. *littoralis* Fr. (*O. verna* Drej.),

letztere nur auf Strandwiesen; vergl. C. Griewants abweichendes Urtheil im Archiv 8, 181, welcher die letztere zuerst in M. (1846) beobachtet hat.

604. *Orobanche rubens* Wallr. (Meyer 1841) zw. Gädebehn und Kobande bei Krivitz. 67. *Orobanchaeae*.

605. *Orobanche coerulea* Vill. (Blandow? 1828. 1802!) an der Müritz bei Waren! Fleetz im hohen Holz! nicht bei Kemplin (Betcke).

606. *Orobanche arenaria* Bork. (T. 1788 als *major*) bei Kemplin! am Grafenwerder bei Pentzlin und am Windmühlenberge bei Waren (Betcke), bei Feldberg (Gerhardt).

\* 607. *Orobanche ramosa* L. (Schultz 1819) bei Warlin unv. Neubrandenburg häufig! mit Taback, Hanf

und Kaps eingeführt, und von Schultz vor 1819 und von Dr. A. Müller 1835 dort gefunden, also dort eingebürgert.

Anm. Dieser Gattung ist in M. noch sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden und die Angaben unserer älteren Botaniker über die einzelnen Arten sind sehr unzuverlässig. Ich habe daher nur dasjenige hier aufgenommen, was sich noch mit Sicherheit ermitteln ließ.

608. *Lathraea Squamaria* L. (L. Sch. 1777).

68. Labiatae.

609. *Mentha sylvestris* L. (Brück. 1803).

α. *viridis* Schultz 1806. S. 41.

β. *nemorosa* W. (Schultz 1819).

γ. *gratissima* (Schultz 1810 bei Link).

610. *Mentha aquatica* L. (L. Sch. 1777).

β. *parviflora* (Schultz 1819.)

γ. *sativa* L. (T. 1795)

(609 + 610.) *M. aquatica-sylvestris* = *nepetoides* Lej. (C. Griew. 1851. 1849!) an der Trave unweit Daffow häufig, wo weder *sylvestris* noch *aquatica* in der Nähe wachsen.

Anm. C. Griewank erklärt diese Pflanze für eine gute, selbstständige Art, Wirtgen aber, der sich sehr eifrig mit den Menthen beschäftigt hat, hält die *M. nepetoides* nur für einen Bastard. — In Bezug auf die ganze Gattung sagt er in seiner Flora der preuß. Rheinprovinz (Bonn 1857) S. 347: „diese, durch ihre zahlreichen Formen und durch die Menge ihrer Bastarde ausgezeichnete Gattung, gehört zu den schwierigsten der Flora, wenn man sich eine genaue Kenntniß derselben verschaffen, und nicht die abweichendsten Formen unter einer Art vereinigen will. Ihre Neigung zu feuchten Wohnplätzen und die Zeit ihrer ganzen Entwicklung, die von den Sommerregen abhängt, bewirkt die außerordentliche Mannichfaltigkeit: die Formen mit ungestielten Blättern erhalten bei anhaltendem Regen längere oder kürzere Blattstiele, bei andauernder Trockenheit erhalten die kahlen und drühsigen Formen eine dicke Behaarung, die behaarten



einen weißen oder grauen Filz u. s. w.; die ährenblüthigen Formen werden durch Verfilmmung kopfig während die quirlblüthigen statt des endständigen Blattbüschels oft auch einen Kopf bilden, so wie nicht selten die kopfigen Formen bei bedeutender Laubentwicklung am Ende des Stengels einen Blattbüschel treiben; Bastardbildungen heben die Gränzen in dem Blütenstande gänzlich auf. Das Vorhandensein oder der Mangel der Blattstiele giebt gar keinen Halt, da z. B. *M. sylvestris* an nassen Standorten häufig Blattstiele erhält.“

611. *Mentha arvensis* L. (L. Sch. 1777).

β. *angustifolia* Deth.

612. *Mentha Pulegium* L. (Schmidt 1828) am Elbufer häufig!

*Elsholtzia Patrini* Lep. = *cristata* W. (Boll 1841) aus Sibirien stammend, als Unkraut auf Höfen und in Gärten verwildert, z. B. bei Neubrandenburg (seit 22 J. beobachtet!), Neustrelitz und Grabow, — und sich wahrscheinlich einbürgernd.

613. *Lycopus europaeus* L. (L. Sch. 1777).

614. *Salvia pratensis* L. (T. 1791) in einigen Gegenden, z. B. Neubrandenburg, Ankershagen und Waren, sehr häufig, bei der Wolfowischen Gypsmühle unv. Dargum (Zabel), bei der Randendorfer Mühle unv. Krivitz (G. Brückner); in anderen (Grabow, im ganzen nördlichen M.?) gänzlich fehlend.

615. *Origanum vulgare* L. (L. Sch. 1777) S. 123.

616. *Thymus Serpyllum* L. (L. Sch. 1777) S. 123.

β. *Chamaedrys* Fr. (Schultz 1837).

γ. *angustifolius* Pers. (Schultz 1819).

617. *Calamintha Acinos* L. sp. (L. Sch. 1777).

618. *Clinopodium vulgare* L. (L. Sch. 1777).

\* 619. *Nepeta Cataria* L. (L. Sch. 1777).

620. *Glechoma hederacea* L. (L. Sch. 1777). Vergl.

Suder S. 34. 123.

\* 621. *Lamium amplexicaule* L. (L. Sch. 1777).

\* 622. *Lamium purpureum* L. (L. Sch. 1777).

β. *incisum* W. (D. 1828) bei Rostock, Sülz (Zabel), Schwerin beim Laufower See, Pentzlin.

(621 + 622.) *L. amplexicaule-purpureum* Mey. (intermedium Fr. D. 1828) bei Daffow, Schwerin u. a. D.; ein fruchtbarer Bastard.

623. *Lamium maculatum* L. (Link 1795) in der Haideebene sehr häufig! auch bei Rostock und Neustrelitz. Bei Daffow in zwei Formen: α. *rugosum* Reich. mit eiförmigen Blättern und grünen Kelchen (kommt auch weißblühend vor), β. *nemorale* Reich. mit fast dreieckig-herzförmigen Blättern und rothbraun gefärbten Kelchen (C. Griew.).

(622 + 623.) *L. purpureo-maculatum* Boll. — Vinf sagt in s. diss. bot. 1795: in silvis et ad sepes vicorum prope silvas sitorum non raro plantam legi inter *L. purpureum* et *maculatum* intermediam, foliis inferioribus ovalis, crenatis, longissime petiolatis ut in *L. purpureo*, superioribus floribusque *L. maculato* simillimis.“

624. *Lamium album* L. (L. Sch. 1777).

625. *Galeobdolon luteum* L. sp. (L. Sch. 1777).

\* 626. *Galeopsis Ladanum* L. (L. Sch. 1777) unter der Saat durch fast ganz M. eingebürgert.

\* 627. *Galeopsis ochroleuca* Lam. (Thede 1806) in der Haideebene weit verbreitet! außerdem nur noch bei Schwerin gefunden.

Anm. Die Verschiedenheit in der geographischen Verbreitung scheint die Vereinigung der beiden vorausgehenden, allerdings kaum durch charakteristische Merkmale getrennten Arten unzulässig zu machen;

für mich wenigstens ist dieser Grund der einzige, welcher mich von der Vereinigung beider abhält. Ueber die zwischen ihnen stattfindenden verwandtschaftlichen Beziehungen s. Wirtgen in den Verhandl. d. naturhist. Vereins d. preuß. Rheinlande XI S. 437 ff.

628. *Galeopsis Tetrahit* L. (L. Sch. 1777).

β. *versicolor* Curt. (Schultz 1806).

γ. *bifida* Böning. (Schreib. 1853) soll im Gebiete der Flora von Grabow ebenso häufig wie die Stammform sein; auch an der Trave bei Daffow zusammen mit der Stammform; auf dem Werder bei Schwerin.

δ. *pubescens* Bess. (Lang. 1841) bei Schwerin, Rrickow unv. Neustrelitz? aber nicht bei Pentzlin (Betzke).

629. *Stachys germanica* L. (Brück. 1803) in der Umgegend von Neubrandenburg a. m. D.! (bei dem Neuen Krüge, bei Broda am Hahnenberge, im Nemerower Holz), besonders häufig aber bei Kl. Nemerow auf den Aekern hinter dem Hofe nach der Tolense zu! desgl. zw. Kl. Nemerow und Nonnenhof! bei Usadel; sodann bei Bülow am Malchiner See und wahrscheinlich im meißl. Kreidegebiete weit verbreitet, da sie kalkhaltigen Boden liebt.

630. *Stachys sylvatica* L. (L. Sch. 1777).

631. *Stachys palustris* L. (T. 1788).

(630 + 631). *St. sylvatica-palustris* (ambigua Sm. Flörke 1828) am Pfaffenteich bei Rostock, bei Tessenow unv. Marnitz, bei Pleetz; nach Nolte ein unfruchtbarer Bastard.

\* 632. *Stachys arvensis* L. (T. 1791) häufig auf Aekern eingebürgert, z. B. bei Malchin und Pentzlin.

\* 633. *Stachys annua* L. (Betzke 1841) bei Siehdichum auf dem Acker an den Rehser Birken, und bei Mallin unv. Pentzlin eingebürgert.

634. *Stachys recta* L. (T. 1788) fehlt nur im Sandgebiete und der Haideebene (wo sie nur am Elbufer vorkommt), da sie kalkhaltigen Boden liebt.

635. *Betonica officinalis* L. (L. Sch. 1777) wie die vor.

\* 636. *Marrubium vulgare* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert? S. 123.

637. *Ballota nigra* L. (L. Sch. 1777).

α. *ruderalis* Sw. (*vulgaris* Lk.) im Binnenlande allgemein verbreitet.

β. *borealis* Schweig. (*foetida* Deth. 1809) an der Ostseeküste bei Dietrichshagen, bei Rostock vor dem Kröpeliner Thore, in Zäunen bei Warnemünde, — und bei Grabow? (Schreiber). Auch Sonder gesteht die Vereinigung beider Formen zu, da er bei Hamburg deutliche Uebergänge zwischen ihnen fand.

\* 638. *Leonurus Cardiaca* L. (L. Sch. 1777).

\* 639. *Leonurus Marrubiastrum* L. (C. Griew. 1839. 28!) in der Haideebene bei Gothmann, der Dömitzer Stadtziegelei und Neese; häufiger im Geb. d. Fl. von Hamburg.

640. *Scutellaria galericulata* L. (L. Sch. 1777).

641. *Scutellaria hastifolia* L. (G. Brück. 1828) an der Elbe und Elde bei Dömitz seltener, häufiger bei Boizenburg und im Gebiete der Flora von Hamburg.

642. *Prunella vulgaris* L. (L. Sch. 1777).

643. *Prunella grandiflora* Jacq. (T. 1788) häufig bei Kemplin, auch bei der Praelanker Ziegelei unv. Neustrelitz; liebt kalkhaltigen Boden.

644. *Ajuga reptans* L. (L. Sch. 1777).

645. *Ajuga genevensis* L. (L. Sch. 1777 fälschlich als *pyramidalis*).



646. *A. pyramidalis* L. (Giesebr. 1837) bei Mirow in der Allee; ich habe selbst ein von dorthier stammendes Ex. in Betkes Herbarium gesehen. Auch im Gebiete der Flora von Berlin kommt diese Art vor.

647. *Teucrium Scordium* L. (L. Sch. 1777) häufig auf den Wiesen der Haideebene und auch durch das übrige M. verstreuet, aber selten.

*T. Scorodonia* L. (im holsteinischen Elbgebiete und auf Mügen) soll nach Link (1795) in Wäldern bei Rostock wachsen, wird aber von keinem anderen einheimischen Botaniker weiter erwähnt, weshalb es wohl mit Recht ausgeschlossen bleibt.

648. *Verbena officinalis* L. (L. Sch. 1777).

69. Verbena-  
ceae.

649. *Pinguicula vulgaris* L. (L. Sch. 1777); häufig durch ganz M., sogar auf Seefrandswiesen.

70. Lentibulariaceae.

650. *Utricularia vulgaris* L. (L. Sch. 1777).

651. *Utricularia neglecta* Lehm. (Landt 1837) im Torfmoor bei Mirow.

652. *Utricularia intermedia* Hayne (Beuthe 1828) bei Neustrelitz am Zierker See und auf den sumpfigen Wiesen am Serran-See bei dem Schweizerhause; Schwerrin in Torfgruben auf dem Werder; Ludwigslust?

653. *Utricularia minor* L. (L. Sch. 1777) weit durch M. verbreitet, obgleich seltener als *vulgaris*.

Ann. Die Utricularien haben eben denselben veränderlichen Character, welchen so viele Wasserpflanzen besitzen, und ihre Arten bedürfen in M. noch einer genauen Revision. Wahrscheinlich besitzen wir deren noch mehr, als die vier vorstehend genannten, aber über die spezifische Selbstständigkeit der *U. spectabilis* Madauss und *U. macroptera* G. Brück. (bei Schreiber 1853) aus dem Gebiete der Grabower Flora möchten doch noch sorgfältigere Untersuchungen nöthig sein, bevor wir ihnen das Speciesrecht zuertheilen dürfen. Nach einem Briefe von Detharding stimmte ein Ex. der *U. macroptera*,

welches Brückner ihm geschickt, so genau mit der in der Flora Danica t. 128 dargestellten *Utricularia* überein, als wenn die Abbildung nach jenem Gr. gemacht wäre. Zu welcher Art aber die dargestellte Pflanze zu ziehen sei, darüber herrschen unter den Botanikern Meinungsverschiedenheiten.

71. *Primula*  
*ceae.*

654. *Trientalis europaea* L. (T. 1788) in der Haideebene sehr häufig! ebenso auch im nördlichen Haidegebiete bei Ribnitz; außerdem durch M. zerstreuet (Glüstraw, Döberau, Tessin, Dargun! u. a. D.), am seltensten in M. Strelitz, wo sie bisher nur bei Neustrelitz! von Langmann gefunden wurde. (S. 41.)

655. *Lysimachia thyrsoflora* L. (T. 1788).

656. *Lysimachia vulgaris* L. (L. Sch. 1777).

657. *Lysimachia Nummularia* L. (L. Sch. 1777).

658. *Lysimachia nemorum* L. (T. 1791) Kostock im Mönchweiden, Lübbsee unv. Daffow, Schwerin auf dem Werder, Grabow im Neeser Holz bei Marienhof; fehlt in M. Strelitz.

\* 659. *Anagallis arvensis* L. (L. Sch. 1777) auf cult. Boden allgemein eingebürgert. S. 32. 37. 138.

β. *coerulea* Schreb. (v. Kamptz 1806) bei Mirow und A. Karin; diese Var. soll kalkhaltigen Boden lieben.

660. *Centunculus minimus* L. (T. 1788) häufig in M., auch bei Warnemünde.

661. *Primula farinosa* L. (Flörke 1795) auf den Wiesen rings um den Neubrandenburger Werder herum! im Bruch bei der Neubrandenburger Papiermühle! auf der großen Friedländer Wiese; bei Galenbeck unv. Friedland überzieht sie die Wiesen mit einem rothen Flor! auf den Peenewiesen bei Zettchenhof unv. Malchin; auf den Neck-

nitzwiesen; auf den Wiesen bei Warnemünde nach Markgrafenheide zu.

662. *Primula officinalis* L. (L. Sch. 1777). S. 123.

663. *Primula elatior* Jacq. (D. 1809) bei Rammin unv. Wittenburg häufig; in Wäldern und Wiesen der Daffower Gegend häufiger als die vorige.

*P. acaulis*, angeblich von Detharding bei Petschow und Neuburg unv. Wismar gefunden, wo aber Wülfnei sie in neuerer Zeit vergebens gesucht hat, ist ohne Zweifel zu streichen, da D. wahrscheinlich nur verkümmerte Ex. der *P. elatior* vor sich gehabt hat; s. Griewank in Archiv VIII. S. 179.

664. *Hottonia palustris* L. (L. Sch. 1777).

665. *Samolus Valerandi* L. (T. 1791) eine See-  
strands- und Salinenpflanze, auch bei Rühn. S. 96.

666. *Glaux maritima* L. (T. 1788) Seestrands- und Salinenpflanze, aber auch (von C. Arndt) zw. Menkendorf und Breselgard in der Haldeebene an Gräben gefunden, wodurch auch dort ein Salzgehalt des Bodens (der  $\frac{1}{2}$  M. weiter südlich bei Ronow schon gefunden ist,) angezeigt wird.

667. *Armeria vulgaris* W., L. sp. (L. Sch. 1777). S. 33. <sup>72. Plumbagineae.</sup>

$\beta$ . *maritima* Wild. (Deth. 1809) am Seestrand  
z. B. auf Pöl, bei St. Jacob an der Wismarschen Bucht und bei Warnemünde.

Ann. Vergl. über diese Art C. Griewank im Archiv VIII. S. 180 wo derselbe ihr Speciesrechte vindicirt. Auch noch später (im J. 1855) schreibt mir derselbe: „ich habe sie neuerdings sorgfältig untersucht, und sie constant von der vorigen unterschieden gefunden: Wurzel vielköpfig, Wuchs rasenartig, Blätter kurz, schmal-linealisch, stumpf, Schaft behaart, Hüllblättchen stumpf, mit kurzer Stachelspitze, Kelche zottig, Höhe der Pflanze 4 bis 6“. Es ist dies wirklich die in den Gärten zur Einfassung der Beete benutzte „Grasnelke.“ C. Griewank scheint sie dagegen auch als Var. der *vulgaris* zu betrachten.

668. *Sticte Limonium* L. (T. 1795) am Seeſtrande bei Markgrafenheide, am Binnenwaſſer bei Buſtrow und auf der Inſel Bül! aber auch auf Salzwieſen bei Sülten unv. Brühl.

73. *Plantagineae.*

669. *Littorella lacustris* L. (T. 1791) am Langwitzer See unweit Baſedow, Grabow im Moor an der Ludwigsluſter Chauſſee, Neuſtadt am See, am Mechower See im Raſeburgifchen.

670. *Plantago major* L. (T. 1788). S. 36.

671. *Plantago media* L. (T. 1788) weit durch M. verbreitet, aber „ſelten in der Haideebene. Ich ſah ſie hier noch nicht“ (G. Brückner).

672. *Plantago lanceolata* L. (T. 1788).

β. *sericea* W. (D. 1809) an ſandigen Stellen des Meeresufers.

673. *Plantago maritima* L. (T. 1788) Seeſtrandspflanze, auch noch am Daſſower Binnenſee auf Wieſen und Niederungen. S. 39.

β. *dentata* K.

674. *Plantago Coronopus* L. (T. 1788) Seeſtrandspflanze.

675. *Plantago arenaria* W. K. (Treviranus 1828) in ſandigen Gegenden der Haideebene (z. B. bei der Dömitzer Kalkbrennerei) und auch bei Mirow auf d. Weinberge.

*Amaranthaceae.*

*Amaranthus Blitum* Koch (T. 1788) und *retroflexus* L. (Schreib. 1853) hin und wieder als Gartenunkraut verwildert.

74. *Chenopodeae.*

676. *Chenopodium maritima* L. sp. (T. 1788) häufig am Seeſtrande und auch bei der Sülzer Saline (Zab.).

677. *Salsola Kali* L. (T. 1788) am Seeſtrande, und am Elbufer! häufig.



678. *Salicornia herbacea* L. (T. 1788) Seefrands- und Salinepflanze.

679. *Polycnemum arvense* L. (Meyer 1828) Grabow auf dem Krohusberge, bei Wanzig und auf dem Karstädter Berge; am Dstorfer Berge bei Schwerin; bei Güstrow? am Hahnenberge bei Broda unv. Neubrandenburg sehr selten!

*Echinopsilon hirsutus* L. sp. will Detharding einmal bei Warnemünde zwischen *Chenopodium maritima* gefunden haben, in neuerer Zeit aber hat man dort vergebens darnach gesucht (C. Griewant).

\* 680. *Chenopodium hybridum* L. (T. 1788).

\* 681. *Chenopodium urbicum* L. (T. 1795).

\* 682. *Chenopodium murale* L. (T. 1788).

\* 683. *Chenopodium album* L. (L. Sch. 1777).

β. *opulifolium* Schrad. (Neuendorf 1828 in litt. ap. Dethard.) bei Rostock.

\* 684. *Chenopodium glaucum* L. (T. 1788).

\* 685. *Chenopodium polyspermum* L. (T. 1788).

\* 686. *Ch. Vulvaria* L. (T. 1788) bei Rostock, Malchin (am Steinhore) und Mirow als Gartenunkraut eingebürgert. S. 32.

*Ch. Botrys* L. (Brockm. 1853) seit dem J. 1844 mit fremden Sämereien in einigen Ludwigslust Gärten als Unkraut eingeschleppt.

*Blitum virgatum* L. (A. Brückn. 1817) hin und wieder verwildert, z. B. bei Neustrelitz und Käbelsch.

\* 687. *Blitum bonus Henricus* L. sp. (L. Sch. 1777).

\* 688. *Blitum rubrum* L. sp. (L. Sch. 1777).

Ann. Alle Arten der Gattungen *Chenopodium* und *Blitum* sind im Geseite der Kulturpflanzen eingebürgert.

*Obione portulacoides* L. sp. (T. 1791) Seefrandspflanze, früher bei Warnemünde, ist nach C. Griewants Versicherung dort in vielen

Jahren nicht mehr gesehen worden, und scheint an unserer Küste verschwunden zu sein.

689. *Obione pedunculata* L. sp. (Link 1808) See-  
strandspflanze, häufig bei Warnemünde und Rörvershagen.

*Atriplex hortense* L. (Brück. 1803) Gartenflüchtling.

690. *Atriplex litorale* L. (T. 1791).

β. *marinum* (D. 1828) — beide Formen nur  
am Seefernde.

691. *Atriplex angustifolium* Sm. (L. Sch. 1777)  
eingebürgert?

692. *Atriplex latifolium* Wahlb. (L. Sch. 1777)  
eingebürgert? Diese Art ist reich an Formen:

α. *vulgare*.

β. *validum, robustius*.

γ. *prostratum* am Seefernde.

δ. *oppositifolium* (A. Sackii R. S.) am See-  
fernde und um Salzquellen z. B. bei Sülten unt. Brül  
(Griew.)

ε. *microspermum*.

ζ. *laciniatum* Schk. ! non L. (Link 1810) am  
Seefernde bei Warnemünde und um die Saline bei Sülz.

\* 693. *Atriplex roseum* L. (Brück. 1803) auf Schutt  
in Zabel im N. Dömitz, und auf Salzboden bei Warne-  
münde eingebürgert.

Ann. Vergl. über diese Gattung Hengel in den Arbeiten des  
naturforsch. Ver. in Riga Bd. I. S. 257 ff.

75. Polygo-  
neae.

694. *Rumex maritimus* L. (T. 1788) am Seefernde  
und im Binnenlande häufig.

β. *palustris* Sm. (D. 1828) mit der Stamm-  
art, von welcher diese Var. sich durch keine beständigen Merk-  
male trennen läßt; s. C. Griew. im Archiv I. S. 22.

695. *Rumex conglomeratus* Murr. (L. Sch. 1777) <sup>409</sup>  
als *acutus*). S. 124.

696. *Rumex obtusifolius* L. (T. 1791).

697. *Rumex crispus* L. (L. Sch. 1777).

698. *Rumex Hydrolapathum* L. (T. 1795).

699 *Rumex aquaticus* L. (L. Sch. 1777) bei Neu-  
brandenburg häufig im Brüderbruch! bei Malchin am  
Furth! an der Peene bei Grubenhagen u. s. w.

(698 + 699.) *R. aquatico-Hydrolapathum* Mey. (he-  
terophyllus Schultz 1819) bei Neubrandenburg im Brüder-  
bruch, bei Neustrelitz und bei Malchin am Furth gefunden.

700. *Rumex sanguineus* L. (D. 1828 *nemorosus* Schr.).

701. *Rumex Acetosa* L. (L. Sch. 1777).

702. *Rumex Acetosella* L. (L. Sch. 1777). „Rohde  
Süßrhen“ (S. 40), Anzeichen eines saueren, unfruchtbaren  
Bodens, den es mitunter wie mit einem bräunlich-rothen  
Fler überzieht, dem Kalk aber so abhold, daß es nach  
dem Mergeln sogleich völlig verschwindet.

703. *Polygonum Bistorta* L. (T. 1788).

704. *Polygonum amphibium* L. (L. Sch. 1777).

β. *maritimum* Deth. „caule prostrato, foliis  
lanceolatis, acuminatis, undulatis strigosis, subcordatis  
sessilibus, spicis subgeminatis terminalibus erectis.“  
Am sandigen Meeresufer.

705. *Polygonum lapathifolium* L. (Ditmar 1809)  
vielleicht nur (wie auch die folgenden beiden Arten) einge-  
eingebürgert?

β. *nodosum* Pers. (Prahl 1837).

γ. *incanum* Link 1810.

706. *Polygonum Hydropiper* L. (T. 1788).

707. *Polygonum Persicaria* L. (L. Sch. 1777).

β. mite Schrk. (Beuthe 1841) nur erst bei Neustrelitz und Grabow beachtet, aber wahrscheinlich viel weiter durch M. verbreitet; nach Wimmer Fl. v. Schlesien ein Bastard der beiden vorigen, worauf zu achten!

γ. minus Huds. (Schultz 1806).

708. *Polygonum aviculare* L. (L. Sch. 1777). S. 40.

β. litorale Link 1810, aufrecht und wenig ästig.

γ. salinum, foliis crassiusculis, Link 1810 am Strande und um Salinen.

\* 709. *Polygonum Convolvulus* L. (L. Sch. 1777). eingebürgert.

\* 710. *Polygonum dumetorum* L. (T. 1788) eingebürgert.

*P. Tataricum* L. hin und wieder zwischen dem cultivirten *P. Fagopyrum* L. (Buchweizen).

Thymeleae. *Daphne Mezereum* L. (Brockm. 1852) verwildert im Park zu Neese unweit Grabow in einem Erlenbruche. S. 138.

76. Santalaceae. 711. *Thesium ebracteatum* Hayne. (Wredow 1809) scheint durch die ganze Haideebene, wenn auch nur sparsam, verbreitet zu sein.

712. *Thesium intermedium* Schr. (Thede 1808) wurde bisher nur einmal bei Wittenburg gefunden; auch Link mscr. citirt diesen Fund und C. Griewank besitzt aus der Wredowschen Doubletten-Sammlung ein angeblich bei Wittenburg gesammeltes Exemplar. Da sich nun dieser Fundort sehr gut an das häufigere Vorkommen dieser Art im Gebiete der Hamburger Flora anschließt, so dürfen wir dieser Species das Bürgerrecht wohl nicht vorenthalten.

77. Eleagreae. 713. *Hippophaë rhamnoides* L. (Becker 1805) an



der Ostseeküste, besonders auf den hohen Lehmufern des Klützer Orts! liebt, ohne auf salzhaltigen Boden angewiesen zu sein, dennoch die Meeresküste, und ist an derselben auch durch Rügen, Pommern und Preußen weit verbreitet. (S. 33.)

\* 714. *Aristolochia Clematitis* L. (T. 1788) früher <sup>78. Aristolochiaceae.</sup> als officinell cult., jetzt verwildert und eingebürgert, besonders im westlichen und südwestlichen M. (z. B. bei Boizenburg! Redefin, Ludwigslust, Grabow, Parchim), aber auch bei Mummendorf unv. Dassow, Sternberg, Güstrow, Dobertin und Malchow; Malchin? S. 138.

*Asarum europaeum* L. soll von Wredow 1809 bei Redefin in der Haideebene gef. sein, bleibt aber, da sichere Beweise für diesen Fund fehlen, noch zweifelhaft, obgleich es dort wohl vorkommen könnte, da es im Geb. d. Fl. von Hamburg wächst.

715. *Empetrum nigrum* L. (T. 1791) auf dem <sup>79. Empetreae.</sup> Sukower Torfmoor bei Crivitz, in der Wooster Haide bei Goldberg, im Torfmoor bei Ikendorf, Sülz und Gölde-  
nitz; bei Warnemünde.

\* 716. *Euphorbia helioscopia* L. (L. Sch. 1777) ein- <sup>80. Euphorbiaceae</sup> gebürgert. S. 138.

717. *Euphorbia palustris* L. (L. Sch. 1777) auf den Wiesen der Haideebene, auch bei Markgrafenheide und dem Schnatermann unv. Rostock, und am Landgraben bei Friedland.

718. *Euphorbia Cyparissias* L. (T. 1791) in den sandigen Gegenden des südl. M. häufig, in M. Strelitz die Nordgränze ihres Vorkommens bei Neustrelitz, und in den angränzenden Theilen von M. Schwerin bei Ankershagen (Betsche) erreichend.

719. *Euphorbia Esula* L. (Hahn 1809) an Acker-

rändern und Wegen in der Heideebene ziemlich häufig! fehlt in M. Strelitz.

\* 720. *Euphorbia Peplus* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert.

\* 721. *Euphorbia exigua* L. (D. 1809) im Gebiete der Ostseeküste zw. dem Dassower Binnensee und dem Breitling nicht selten; aber auch bei Penzlin an dem Mäuberberge und bei Mirow; unter der Saat eingebürgert.

722. *Mercurialis perennis* L. (L. Sch. 1777). S. 138.

\* 723. *Mercurialis annua* L. (T. 1788) nur als Gartenunkraut eingebürgert; fehlt im südöstlichen Heidegebiete und im Gebiete der Schweriner Flora; der südwestlichste bekannte Standort ist Marnitz. S. 138.

81. Urticeae. \* 724. *Urtica urens* L. (L. Sch. 1777). S. 33. 124.

\* 725. *Urtica dioica* L. (L. Sch. 1777). S. 32. 124.

\* 726. *Parietaria officinalis* L. (L. Sch. 1777) Penzlin, Malchin, Parchim, Rostock (an den Mauern des Klostergartens), Wismar auf der Meiserbahn. S. 31.

*Cannabis sativa* L. (T. 1788) cultivirt und verwildert.

\* 727. *Humulus Lupulus* L. (L. Sch. 1777) cultivirt, und verwildert eingebürgert? S. 124.

728. *Ulmus campestris* L. (L. Sch. 1777). S. 34. 39. 124.

β. *suberosa* Ehr.

729. *Ulmus effusa* W. (Flörke 1793) häufig angepflanzt, — ob ursprünglich einheimisch?

82. Cupuliferac. 730. *Fagus sylvatica* L. (L. Sch. 1777). S. 36. 75.

731. *Quercus Robur* L. (L. Sch. 1777).

732. *Q. sessiliflora* Sm. (T. 1788). S. 29. 75. 124.

733. *Corylus avellana* L. (L. Sch. 1777).

734. *Carpinus Betulus* L. (L. Sch. 1777). S. 33.

Ann. Ueber d. merkwl. Weiß-Buche b. Burg Schütz s. Archiv V. 221.

735. *Salix pentandra* L. (L. Sch. 1777). S. 31. 124. <sup>83. Salici-</sup>

736. *S. fragilis* L. (L. Sch. 1777). S. 39. 124. <sup>neae.</sup>

(735 + 736.) *S. pentandra-fragilis* Wim. (*cuspidata* Schultz 1819).

Ann. Ueber die Weiden-Bastarde s. Wimmer in der Denkschrift der Schlesischen Gesell. für vaterländ. Cultur 1853.

737. *S. alba* L. (T. 1788). S. 36. 124.

β. *vitellina* L. (T. 1788). S. 32.

(736 + 737.) *S. fragilis-alba* Wim. (*Russeliana* Sm. Schultz 1819).

738. *S. amygdalina* L. (T. 1788). Vergl. *S. triandra* S. 31. 124.

739. *S. viminalis* L. (T. 1788). S. 30.

(738 + 739.) *S. triandra-viminalis* Wim. (*undulata* Ehr. Lk. 1810) selten: bei Pentslin, im Rasnitzer Garten unv. Ludwigslust. Ein unfruchtbarer Bastard.

740. *S. holosericea* W.? (Willebr. 1852) im westl. M., in einer alten Sandgrube links am Wege von Granzin nach Stolpe. Ich habe sie nicht gesehen.

741. *S. acutifolia* W. (C. Griew. 1847. 41!) in den Hambergen bei Grevismühlen, Hagenow auf dem Hagen, Zirzow bei Grabow.

742. *S. purpurea* L. (T. 1788) S. 124.

743. *S. cinerea* L. (Becker 1805). S. 31.

β. *aquatica* Sm.

744. *S. Caprea* L. (T. 1788). S. 34. 38.

(739 + 744.) *S. viminali-Caprea* Wim. = *Smithiana* Willd. (Betzke 1840!) auf der Wiese zw. Tolense und Lieps.

745. *S. aurita* L. (T. 1788).

*β. uliginosa* Willd. (Schultz 1819).

746. *S. repens* L. (L. Sch. 1777).

*α. repens* L. (*depressa* T. 1791).

*β. fusca* Sm.

*γ. argentea* Sm. (*arenaria* T. 1791) auf sandigem Boden am Seestrand und im Binnenlande.

*δ. rosmarinifolia* L. (L. Sch. 1777).

*ε. vitellina* (*laeta* Schultz 1819).

(739 + 746.) *S. viminalis-repens* Wim. (*angustifolia* Fr., Zabel 1859!) in den Dünen des Binnenstrandes bei Dierhagen.

(745 + 746.) *S. repens-aurita* Wim. (*ambigua* Ehr. und *spathulata* Schultz 1819) ein unfruchtbarer Bastard.

747. *Populus tremula* L. (L. Sch. 1777). S. 29.

*P. alba* L. (L. Sch. 1777) wird angepflanzt und bildet mit der vorhergehenden den Bastard:

*P. alba-tremula* Wim. (*canescens* Sm. Lk. 1810).

*P. pyramidalis* Roz. (Langm. 1841) allgemein angepflanzt an den Landstraßen u. s. w., in neuester Zeit jedoch (wie auch in anderen deutschen Ländern) weniger, weil sie durch ihren Schatten und die weitgreifenden Wurzeln den Acker benachtheiligt, und sie außerdem auch noch der Kaupenzucht Vorshub leisten soll. Wie weit dieser letztere Vorwurf begründet ist, darüber kann ich nicht entscheiden, nur glaube ich bemerkt zu haben, daß hier bei Neubrandenburg die Gärten vor dem Treptower Thore, an denen eine Pappelallee entlang führt, häufiger von den Kaupen heimgesucht sind, als unsere anderen Gärten. — Das größte Ex. dieses Baumes, welches ich in M. gesehen, stand früher neben dem großherzogl. Schlosse in Ludwigs Lust, und erreichte mit seinem Wipfel gerade die Höhe der Plattform dieses Gebäudes, die, wenn ich nicht irre, 100' hoch liegt. Diese schöne Pappel wurde durch den Novembersturm 1836 umgestürzt.

*P. balsamifera* L. kommt nur angepflanzt vor.



748. *Populus nigra* L. (T. 1788). S. 29. 124.

749. *Betula alba* L. (L. Sch. 1777) = *verrucosa* <sup>84. Betuli-</sup>  
 Ehr. S. 112. neae.

β. *pendula*. γ. *laciniata* Wahlb.

750. *B. pubescens* Ehr. (Brück. 1803) bleibt z. B. bei Neubrandenburg auf den Birkbuschwiesen immer strauchartig und ihre Blätter sind an der Basis herzförmig oder gerade abgestutzt. Eine Vereinigung mit der vorigen halte ich für unmöglich.

751. *B. humilis* Schrk. (Brück. 1793) auf den Tolense- und Recknitz-Wiesen (bei Schulenburg und Zarnowanz) häufig.

Anm. Auch *B. odorata* Bech. soll in M. vorkommen, doch fehlt mir ein sicherer Nachweis dafür.

752. *Alnus glutinosa* L. sp. (L. Sch. 1777). S. 32.

Anm. *A. incana* DC. wird nur hin und wieder angepflanzt.

753. *Myrica Gale* L. (T. 1791) zwischen dem Breitling und Ribnitz in großer Menge; auch auf den Recknitzwiesen und auf dem Fischlande. S. 138. <sup>85. Myri-</sup>  
ceae.

\* \* \*

754. *Taxus baccata* L. (Lk. 1810) hin und wieder <sup>86. Conife-</sup>  
 in der Rostocker Haide, scheint sich aber immer mehr zu rae.  
 verlieren, wie dies auch in der Stubnitz auf Rügen der Fall sein soll. S. 34.

755. *Juniperus communis* L. (L. Sch. 1777). S. 32. 112. 124.

756. *Pinus sylvestris* L. (L. Sch. 1777). S. 124.

Anm. *P. Abies* L., *Larix* L., *Picea* L. und *Strobus* L. kommen nur angepflanzt vor.

## II. Monocotyledoneae.

87 Hydrocharideae.

1. *Stratiotes aloides* L. (L. Sch. 1777) häufig. S. 29.
2. *Hydrocharis Morsus Ranae* L. (L. Sch. 1777).

88. Alismaceae.

3. *Alisma Plantago* L. (L. Sch. 1777). S. 138.  
 $\beta$ . *lanceolatum* With.

$\gamma$ . *graminifolium* Wahl. (Deth. 1828) im Daffower See (C. Griew.).

4. *Alisma parnassifolium* L. (T. 1828 bei Deth.) in und am See bei dem Basedower Theerosen! und im Langwitzer See unv. Basedow.

5. *Alisma natans* L. (T. 1788) nicht häufig, z. B. bei Neubrandenburg, Duchow unv. Malchin (Zab.), Neustadt und Ludwigslust (Betcke).

$\beta$ . *lanceolatum* G. Brückn. (foliis ovato-lanceolatis, acutis) bei Neubrandenburg.

6. *Alisma ranunculoides* L. (T. 1795) bei Rossow unv. Lage auf dem Moor, bei Toitenwinkel, bei Rostock rechts von der Fähre, bei Schwerin am Dstorfer See!

7. *Sagittaria sagittaefolia* L. (L. Sch. 1777).

89. Butomeae.

8. *Butomus umbellatus* L. (L. Sch. 1777).

90. Juncagineae.

9. *Scheuchzeria palustris* L. (T. 1788).

10. *Triglochin maritimum* L. (T. 1788) häufig auf salzhaltigen und nicht-salzhaltigen Wiesen. S. 38.

11. *Triglochin palustre* L. (L. Sch. 1777). S. 32.

91. Potamoae.

12. *Potamogeton natans* L. (T. 1788). S. 33. 39.

$\beta$ . *fluitans* Roth. (D. 1809) selten, nach Prahl bei Güstrow in den Gräben an der Nebel nach der Primer Burg zu, — der einzige, speciell namhaft gemachte Stand-

ort. — Die bei Hamburg vorkommende Var. *γ. oblongus* Viv. ist in M. noch nicht bemerkt.

13. *Potamogeton rufescens* Schrad. (T. 1791 serratus).

14. *Potamogeton gramineus* L. (L. Sch. 1777).

*β. nitens* Web. (Schultz 1837) im Weissdiner See unv. Neustrelitz, Güstrow im Gutower See, Schwerin auf der Wiese bei dem neuen Pulvermagazin, im Neustädter See (und zwar die Form *curvifolius* Hartm.).

15. *Potamogeton lucens* L. (T. 1788.)

*β. decipiens* Nolte im Schaalsee (sec. Garcke).

Ann. Betcke fand diese Art in der Elbe (nicht im Neustädter See,) mit Blättern von mehr als 1' Länge; die größten, welche ich gesehen, hatten Gr., die ich im J. 1859 im Herthasee auf Fasmund sammelte; sie maßen 9" Par. in der Länge und 1½" in der Breite.

16. *Potamogeton praelongus* Wulf. (Thede 1809). im Barnimischen See des Auntes Crivitz; im Geveziner See; in der Toleuse!

17. *Potamogeton perfoliatus* L. (T. 1788).

18. *Potamogeton crispus* L. (L. Sch. 1777).

19. *Potamogeton compressus* L. (T. 1788? *complanatus*).

*β. acutifolius* Link 1828 z. B. bei Pentzlin und Zippelow (an der Rieps) in einem Wasserloch auf dem Felde (Betcke).

20. *Potamogeton obtusifolius* M. K. (Schultz 1806 *compressus*!)

21. *Potamogeton mucronatus* Schr. (Boll 1859) sehr häufig im Tolenesfluß bei Neubrandenburg (zw. der Bierradenmühle und dem See!).

22. *Potamogeton pulsillus* L. (L. Sch. 1777).

β. *tenuissimus* (Beuthe 1837) im Weißdiner See unweit Neustrelitz.

23. *Potamogeton pectinatus* L. (T. 1788).

β. *marinus auctor. non L.!* (T. 1791) in der Ostsee bei Wismar, Daffow, Travemünde.

24. *Potamogeton filiformis* Pers. = *marinus* L. (Schultz 1806) in der Tolense bei Broda! und Meiershof! im Ziegelsee bei Schwerin vor der Ziegelei auf dem Werder; aber auch im Salzwasser des Kl. Jasmunder Boddens im J. 1857 und 59 von mir gefunden.

Anm. Das Vorkommen dieser Art im Salzwasser ist mehrfach in Abrede gestellt worden, aber mit Unrecht. Die Ex. aus dem Jasmunder Bodden zeigen auch nicht die geringsten Unterschiede von denen aus der Tolense, beide aber weichen so erheblich von *P. pectinatus* β. ab, daß schon F. Schultz im sup. I. meint, wenn *marinus auctor.* und *pectinatus* nach Smiths Vorgang zusammengezogen würden, müßten die Tolense-Ex. wenigstens als *var. lacustris* davon getrennt werden. Der echte *P. pectinatus* kommt übrigens gleichfalls in der Tolense vor, und zwar an demselben Standorte, wo *filiformis* bei Meiershof wächst. Beide sind auf den ersten Blick von einander zu unterscheiden.

25. *Potamogeton densus* L. (Langm. 1841) in der tiefen Kuhle auf den Bahler Weideköpeln unweit Boizenburg. Häufig im Gebiete d. Flora von Hamburg.

26. *Ruppia maritima* L. (C. Griew. 1839) im Daffower Binnensee und in der Wismarschen Bucht.

27. *R. rostellata* Koch (T. 1797) im Breitling hinter dem Pinnengraben häufig und auch auf der Wiese bei Warnemünde; an der Wismarschen Bucht; bei Daffow; in Gräben bei Wustrow auf dem Fischlande (Zabel).



28. *Zannichellia palustris* L. (T. 1788) bei Güstrow im Sumpffsee.

β. *pedicellata* Wahlb. (C. Griew. 1839) in der Ostsee, und in Salzlachen an deren Ufer bei Rosenhagen, Harkensee und Warnemünde; in Gräben bei Wustrow auf dem Fischlande (Zabel).

29. *Najas marina* L. (major Roth, D. 1808) im Breitling an den Warnemünder Wiesen und überhaupt um Rostock herum häufig; im Daffower See; im Neumühler See bei Schwerin; im Rahneufelder See bei Pentzlin; in der Tolense dicht bei der Neher Landzunge, und zwar hier viel ästiger und dabei zarter im Bau, wie an den übrigen Standorten (Betzke). 92. Naja-  
deae.

Ann. Ueber diese letztere etwas abweichende Form schreibt De-tharding 1830 an Betzke: „Ihre *Najas* ist nichts anderes als *N. marina*. Die Pflanze ist diöcistisch, und demgemäß sind bei verschiedenen Exemplaren, je nachdem männliche oder weibliche vorliegen, auch die Blüthentheile verschieden gebildet. In tiefen Gewässern, wie bei Warnemünde und im Daffower Binnensee, wird sie viel länger und treibt keine Gelenkwurzeln, im seichten Wasser aber legt sie sich nieder und treibt fast aus jedem Gelenk lange Wurzelfasern.“ Außer dem tieferen und seichteren Wasser, ist auch ohne Zweifel der vorhandene oder mangelnde Salzgehalt desselben auf die Ausbildung der Pflanze von Einfluß.

30. *Zostera marina* L. (T. 1788) am ganzen Ostsee-strande. S. 128.

31. *Lemna trisulca* L. (L. Sch. 1777).

93. Lemna-  
ceae.

32. *Lemna polyrrhiza* L. (T. 1788).

33. *Lemna minor* L. (L. Sch. 1777). S. 30.

34. *Lemna gibba* L. (T. 1788).

35. *Typha latifolia* L. (L. Sch. 1777). S. 31. 36. 94. Typha-  
ceae.

36. *Typha angustifolia* L. (T. 1788).

37. *Sparganium ramosum* Huds. (Brück. 1803).

38. *Sparganium simplex* Huds. (L. Sch. 1777).

39. *Sparganium minimum* Fr. (T. 1788 *natans*).

95. *Aroidese.*

40. *Arum maculatum* L. (T. 1788) in feuchten Gehölzen des Klützer Orts, am Wallgraben bei Rostock, im Ludwigslust und Remplin'schen Park. An den drei letztgenannten Orten wohl nur verwildert; der erstere reihet sich an die Standorte im Lauenburgischen und Hamburgischen an. S. 138.

41. *Calla palustris* L. (T. 1788) bei Ludwigslust in der Gegend der Lipe! bei Grabow am Eldenfer u. a. D., bei Schwerin a. m. D., in der Mildnitz bei Goldberg, bei Neustrelitz, in einem Bruche auf dem Wanzkaer Felde! bei Prilwitz in einem Bruche nach Hohenzieritz zu, bei Kl. Nemerow und bei der Kotelower Mühle. S. 138.

\* 42. *Acorus Calamus* L. (L. Sch. 1777) soll erst im 15. Jahrhunderte als Arzeneimittel aus Asien nach Europa verpflanzt sein, — jetzt allgemein eingebürgert. S. 30. 125.

96. *Orchideae.*

43. *Orchis militaris* L. (L. Sch. 1777 fälschlich als *mascula*) auf kleinen Feldwiesen zw. Bromsa, Schönbeck und Matthey unweit Friedland! am Gehölze bei Remplin; auf den Reethwiesen bei Boizenburg? S. 125.

Ann. Ich vereinige unter vorstehendem Namen *O. purpurea* Huds. und Rivini Gouan.

44. *Orchis Morio* L. (L. Sch. 1777) im östlichen M. (z. B. bei Neubrandenburg!) nicht selten, auch am See-Strande bei Warnemünde häufig; selten auf Pfl. S. 125.

45. *Orchis mascula* L. (T. 1791) in Gehölzen bei Daffow, im Steinfeld'schen Holz bei Schwerin, im Niendorfer

Holz zw. Basdorf und Brunschaupten, bei Steinhagen südlich vom Malchiner See. S. 125.

46. *Orchis laxiflora* Lam. (C. Griew. 1839. 30!) in einem Torfmoore bei Pötenitz am Priwal und auf einer Wiese bei Rosenhagen; bei Markgrafenheide (Brinkmann); bei Malchin auf der Wiese vor dem Mühlenthore, rechts; in 1 Ex. bei Penzlin 1856 gef. (Betsche). — Fehlt in M. Strelitz, namentlich bei Jatzke, wo Schulz sup. 2 sie angiebt. S. 125.

Anm. Ein im J. 1812 bei Demmin im Eichholz von A. F. Brückner gesammeltes Ex. besitze ich in meinem Herbarium; dieser Standort fehlt bei Zabel.

47. *Orchis maculata* L. (L. Sch. 1777).

48. *Orchis latifolia* L. (L. Sch. 1777).

49. *Orchis incarnata* L. = *angustifolia* Wim. (Prahel 1837) durch ganz M. verbreitet.

*β. ochroleuca* (Wüsten. 1854) Kronen weißlich-gelb, die Mitte der Unterlippe rein-gelb, ohne alle Spur einer durch dunklere Punkte und Linien hervorgebrachten Zeichnung, wie die Stammart eine solche zeigt; der Stengel meist etwas kürzer, als bei dieser, und sehr dick (bei einem vorliegenden Ex. beträgt sein oberer Durchmesser, unmittelbar unter der Blütenähre, 7<sup>mm</sup>). — Auf Wiesen bei Sternberg, Cölsin unv. Crivitz, Rodenwalde unv. Wittenburg, Krakow, Neubrandenburg im Wolfswinkel (hier am 27. Juni 1857 von mir gefunden).

Anm. *O. sambucina* im Archiv VIII. 96 ist zu streichen; die als solche beanspruchten Ex. gehören dieser Varietät der *incarnata* an.

50. *Gymnadenia conopsea* L. sp. (T. 1788).

51. *Platanthera bifolia* L. sp. (T. 1788). In der

Umgegend von Neubrandenburg früher häufig, in den letzten 10 Jahren aber viel seltener geworden (S. 78). In anderen Gegenden Mecklenburgs noch sehr häufig.

*β. montana* Reichb. (Schmidt Wismariens. 1850) auf dem Potreniser Torfmoor unvw. Rostock, bei Hagenow, Quast und in Gehölzen bei Daffow.

Ann. „Ich habe mich völlig überzeugt (schreibt mir G. Brückner), daß die *P. montana* (*chlorantha*) nur eine Abart der *bifolia*, — und das kaum, — ist. Alle angegebenen Zeichen sind unstät, und finden sich fast nur mehr an den größeren, stärkeren Exemplaren.“

52. *Ophrys muscifera* Huds. (C. v. Oertzen 1828) bei Brunn unvw. Neubrandenburg; bei Neubrandenburg auf den Wiesen hinter der Ruhweide! bei Galenbeck unweit Friedland an der Teufelsbrücke, — also nur in der nördlichen Hälfte von M. Strelitz.

53. *Herminium Monorchis* L. sp. (T. 1788) bei Malchin auf dem Bornberge, — andere Standorte sind mir nicht bekannt.

54. *Anacamptis pyramidalis* L. sp. (Danneel 1843) bei Remplin, sehr selten.

55. *Epipogon aphyllus* (Sw.) L. sp. (Meyer 1836) bei Schwerin auf dem Werder auf Buchenwurzeln.

56. *Cephalanthera pallens* Sw. sp. (T. 1788) bei Ratzeburg, Schwerin hinter Wickendorf im Gehölz, Dobe- ran am Buchenberge, im Rempliner Holz am Saatenberge, Neustrelitz in der Kalkhorst.

57. *Cephalanthera Xiphophyllum* L. fil. sp. (T. 1788) im Rempliner Holz selten, bei Brudersdorf unvw. Demmin am Fußsteige nach Levin, bei Sülz (Weidner).

58. *Cephalanthera rubra* L. sp. (Thede 1828) zu



Wendorf unv. Güstrow auf der Bullenhorst und auch noch a. a. O. daselbst, Holzendorf unv. Sternberg, Wamfow, Schwerin, Neustrelitz in der Bürgerhorst und im Holze beim Schweizerhause.

59. *Epipactis Helleborine* Crtz. (L. Sch. 1777).

β. *viridiflora* Hoffm.

60. *Epipactis palustris* Crtz. (L. Sch. 1777).

61. *Listera ovata* L. sp. (T. 1788).

62. *Neottia Nidus avis* L. sp. (L. Sch. 1777).

63. *Goodyera repens* L. sp. (T. 1788) in den Nadelholzwaldungen des östlichen und mittleren M. sehr häufig! scheint aber im westlichen M. zu fehlen.

64. *Spiranthes autumnalis* L. sp. (T. 1788) auf trockenen Hügeln bei der Sildemower Viep unv. Rostock; bei Neubrandenburg im Brüderbruche sehr selten! angeblich auch auf dem Werder im Wentower See 1 Ex. (Struck).

65. *Corallorrhiza innata* L. sp. (Bleeschmidt 1828) bei Neustrelitz in der Ralkhorst sehr selten!

66. *Liparis Loeselii* L. sp. (Thede 1806).

67. *Malaxis paludosa* L. sp. (T. 1788).

68. *Iris Pseud-Acorus* L. (L. Sch. 1777). S. 29. 36. <sup>97. Iridea.</sup>

69. *Iris sibirica* L. (Brockmann 1828) in der Sassenitzer Wildbahn unv. Ludwigslust, und bei Grabow auf den Elbewiesen.

70. *Galanthus nivalis* L. (Vollbr. 1837) bei Neubrandenburg im Starz. Bruch an einer Stelle dicht am Seeufer sehr häufig! <sup>98. Anaryllideae</sup>

*Narcissus Pseudo-Narcissus* L., *Leucojum vernalis* L., *aestivum* L. (S. 138) finden sich mitunter verwildert.

71. *Asparagus officinalis* L. (T. 1788) am Ostsee- <sup>99. Asparagene.</sup>

strande bei Warnemünde und Daffow, aber auch im Binnenlande, z. B. auf dem Datzberge bei Neubrandenburg! wo diese Pflanze schon seit 60 Jahren beobachtet ist; bei Grabow, Boizenburg.

72. *Paris quadrifolia* L. (L. Sch. 1777): S. 138.

73. *Convallaria Polygonatum* L. (T. 1788) durch ganz M. verstreuet, aber viel seltener als die folgende; hier bei Neubrandenburg, wo ich sie früher im Remerower Holz fand, habe ich sie jetzt schon seit Jahren vergebens gesucht. Sie duftet noch schöner als *C. majalis*. — Vergl. Salomonsfägel S. 38.

74. *C. multiflora* L. (L. Sch. 1777).

75. *C. majalis* L. (L. Sch. 1777). Vergl. Siljenconfälgen S. 36. 78. 125.

Ann. *C. verticillata* ist bei den früheren meklenb. Floristen zu streichen.

76. *Smilacina bifolia* L. sp. (L. Sch. 1777).

100. Liliaceae. *Tulipa silvestris* L. hin und wieder verwildert, z. B. in Obstgärten bei Daffow und im Park bei Rostock; sie soll aus Taurien stammen und erst seit der Mitte des 16. Jahrh. sich im übrigen Europa verbreitet haben.

77. *Anthericum Liliago* L. (T. 1788) in der Haideebene a. m. O., aber auch im östlichen M. bei Kemplin, Weltin und Wulfenzin.

78. *Anthericum ramosum* L. (T. 1791) durch ganz M., aber nicht häufig z. B. bei Ludwigslust, Goldberg, Güstrow, Tessin, Malchin, am Reiterberge bei Feldberg, bei der Wolkowschen Gypsmühle (Zabel), in der Strelitzer Haide (Bette), Friedland im Namelower Holz.

\* 79. *Ornithogalum nutans* L. (Schultz 1819) als lästiges Unkraut in Gärten und auf Stadtwällen einge-

Bürgert; es soll erst im J. 1570 nach dem europäischen Continent gekommen sein.

*Ornithogalum umbellatum* L. (Deth. 1809) wird hin und wieder mit Dung aus den Gärten auf die Acker verschleppt.

80. *Gagea pratensis* Wahlb. sp. (L. Sch. 1777).

81. *Gagea arvensis* Wahlb. sp. (T. 1788).

82. *Gagea spathacea* Hayne sp. (Thede 1806) durch ganz M. Schwerin, in M. Strelitz wohl nur übersehen.

83. *Gagea minima* L. sp. (Röper 1844) in Buchenwäldern bei Doberan.

84. *Gagea lutea* L. sp. (D. 1809).

85. *Allium ursinum* L. (Vortisch 1849) im Gelbenfander Forst unweit Ribnitz. S. 38. 70.

86. *Allium acutangulum* Schrad. var. *fallax* Don. (Schmidt 1828) auf den Wiesen an der Elbe und deren Nebenflüssen in der Haideebene nicht selten; auch bei der Wolkowschen Gypsmühle (Zabel).

87. *Allium vineale* L. (T. 1788) nicht häufig, z. B. bei Grabow, Warnemünde, Neustrelitz, Neubrandenburg!

88. *Allium Scorodoprasum* L. (T. 1788): im Gebiete der Rostocker Flora an mehreren Orten, bei Malchin, Pentzlin, Hl. Nemerow! u. s. w.

89. *Allium oleraceum* L. (Link 1806).

*Allium carinatum* L., von unseren Botanikern schon so oft erkannt, wird neuerdings von Schreiber (1853) aus dem Gebiete der Grabower Flora angeführt, wo es bei Ludwigslust dicht vor dem Grabower Thore an einer Gartenhecke gefunden wurde, ist aber dorthin (nach Brockmüllers gewiß richtigem Urtheil) aus dem nahen Garten der Villa Gustava gelangt, wo es in großer Menge cultivirt wird. — *A. carinatum* in Schultz Fl. Starg. ist *A. Scorodoprasum*! — Bei Lauenburg und unweit Hamburg kommt es vor.

*Allium Schoenoprasum* L. hin und wieder verwildert, besonders am Elbstrande.

\* 90. *Muscari botryoides* L. sp. (D. 1828) auf Aekern bei Grabow und in der Umgegend häufig eingebürgert, durch Garten-Dung dorthin verschleppt.

91. *Narthecium ossifragum* L. sp. (Nolte c. 1823) im Geb. d. Fl. von Hamburg häufig auf Torfmooren, ist von Nolte (nach Ausweis eines von diesem herstammenden Exemplares, welches Betke durch Detharding erhielt,) auch in Mecklenburg schon gefunden worden, der Fundort ist aber nicht näher bekannt, und es ist daher später von den einheimischen Botanikern vergebens gesucht worden.

Colchica- *Colchicum autumnale* L. (Rose 1853) wurde in einigen ver-  
ceae. wilberten Ex. bei Grabow gefunden; zur einheimischen Wiesenflora, wie im südlichen Deutschland, gehört es ganz gewiß nicht!

101. Junca- *Juncus maritimus* L. (Link 1808) am See-  
ceae. strande, z. B. bei Wustrow auf dem Fischlande (Zabel), zwischen Warnemünde und Dierichshagen, bei Weitendorf auf Pöl, und bei der Pötenitzer Ziegelei unv. Dassow (C. Griem.).

93. *Juncus communis* E. Meyer.

α. *conglomeratus* L. (L. Sch. 1777).

β. *effusus* L. (T. 1788).

94. *Juncus glaucus* Ehr. (T. 1791).

95. *Juncus balticus* Willd. (D. 1809) am See-  
strande: in den Dünenkesseln bei Warnemünde.

96. *Juncus filiformis* L. (D. 1828) auf salzhaltigen  
Wiesen am See-  
strande und im Binnenlande.

97. *Juncus capitatus* Weig. (T. 1788) z. B. bei  
Dierhagen auf dem Fischlande (Z.), und in der großen  
Haideebene a. m. D.



98. *Juncus lamprocarpus* Ehr. (L. Sch. 1777).  
 α. *lamprocarpus* Ehr. (Schultz 1819).  
 β. *silvaticus* auct. non Reich. (T. 1788).  
 γ. *alpinus* Vill. (D. 1828) bei Ludwigslust, Weisbin  
 am langen See.
99. *Juncus obtusiflorus* Ehr. (T. 1788) auch auf  
 Strandwiesen bei Warnemünde und Daffow.
100. *Juncus supinus* Mönch. (T. 1795).  
 β. *uliginosus* Roth. (Schultz 1806).
101. *Juncus squarrosus* L. (T. 1788;) auch bei War-  
 nemünde am Strande.
102. *Juncus compressus* Jacq. (T. 1788).  
 β. *Gerardi* Lois. (D. 1828) auf salzhaltigen  
 Wiesen am Strande und um Salinen.
103. *Juncus Tenageia* Ehr. (T. 1788).
104. *Juncus bufonius* L. (L. Sch. 1777).
105. *Luzula pilosa* L. sp. (L. Sch. 1777).
106. *Luzula campestris* L. sp. (L. Sch. 1777).  
 β. *multiflora* Lej. (Schultz 1837).  
 γ. *pallescens* (Blandow 1828, albida) bei Waren.  
 δ. *congesta* Lej. im Torfmoor bei Ballin unv.  
 Stargard.
107. *Cyperus flavescens* L. (T. 1788) beim Base-  
 dower Theerofen und am Nahnenfelder See (Betsche), bei <sup>102. Cyper-</sup>  
 Mirow und Fleeth; im Geb. d. Flora von Grabow an <sup>raceae.</sup>  
 mehreren Stellen.
108. *Cyperus fuscus* L. (T. 1788).  
 β. *virescens* Hoffm.
109. *Schoenus nigricans* L. (T. 1788) auf den Kemp-  
 linschen Wiesen an der Peene, auf den Wiesen des Cum-

merower Sees von Alsbude bis Neufalen (Zabel)! bei Friedland, Brunn! und Galenbeck.

110. *Schoenus ferrugineus* L. (Schultz 1837) bei Neubrandenburg auf den Wiesen hinter der Ruhweide, bei Brunn! auf der großen Friedländer Wiese, auf den Galenbecker Wiesen; bei Gr. Niendorf am Saume der Hofwiese nach Wankow zu, Peenewiesen bei Alsbude! Trebelwiesen bei Kl. Methling (Zabel); die anderen Standorte sind zweifelhaft.

111. *Cladium Mariscus* L. sp. (T. 1788) bei Friedland, Brunn, Galenbeck, Neustrelitz; Malchin, auf den Wiesen am Cummerower See, auf den Trebel- und Recknitzwiesen (Zabel), Leppin bei Zabel, Wankow, im Bruch der Rostocker Heide hinter Marktgrafenheide, bei Schwerin auf dem Werder beim Schelfvogtsteich.

112. *Rhynchospora alba* L. sp. (T. 1791).

113. *Rhynchospora fusca* L. sp. (Thede 1809) bei Warin, Pustohl und in der Haideebene a. m. D.

114. *Heleocharis palustris* L. sp. (L. Sch. 1777).

β. *uniglumis* Link 1810 auf Torfwiesen bei Warnemünde und Daffow.

115. *Heleocharis ovata* Roth. sp. (Crome 1828) früher am Lankower See bei Schwerin, in neuerer Zeit nicht wieder gefunden, im Geb. der Flora von Hamburg aber a. m. Stellen; ihr Verbreitungsbezirk scheint also dort ein weiterer zu sein, weshalb wir ihr die Aufnahme in die Flora wohl nicht weigern dürfen.

116. *Heleocharis acicularis* L. sp. (T. 1788).

β. *sluitans* Döll. im Bahler Torfmoor unweit Boizenburg.

117. *Scirpus caespitosus* L. (L. Sch. 1777); auch am Strande bei Warnemünde.

118. *Scirpus pauciflorus* Light. (T. 1788); desgl.

119. *Scirpus parvulus* R. S. (Röper 1850) bei Wustrow auf dem Fischlande in den flachen Buchten des Saaler Boddens in Menge (Zabel).

120. *Scirpus fluitans* L. (Crome 1828) im Bruch bei Krebsförde unv. Schwerin.

121. *Scirpus setaceus* L. (T. 1788).

122. *Scirpus lacustris* L. (T. 1788).

β. *Tabernaemontani* Gm. (D. 1828) auf Salzwiesen bei Soltow in der Teldau, im Graben an der Salzquelle bei Konow, auf Torfwiesen bei Daffow und Warnemünde.

123. *Scirpus maritimus* L. (T. 1788) auf Wiesen am Seestrande, aber auch bei Daffow, Dömitz und Boizenburg. S. 125.

124. *Scirpus silvaticus* L. (L. Sch. 1777).

125. *Scirpus compressus* Pers. (T. 1788).

126. *Scirpus rufus* Schrad. (D. 1809) auf Strandwiesen häufig.

127. *Eriophorum alpinum* L. (Blandow 1809) bei Pustohl, Brüel, Süß, Waren! Zabel, Neustrelitz am See beim Schweizerhause und auf sumpfigen Wiesen in den Serranschen Bergen (Beuthe)!

128. *Eriophorum vaginatum* L. (L. Sch. 1777).

129. *Eriophorum polystachyum* L. (T. 1795 als *angustifolium*).

130. *Eriophorum latifolium* Hoppe (L. Sch. 1777).

131. *Eriophorum gracile* Koch (Schultz 1819 tri-

quetrum) bei Jagke unv. Friedland in einem Bruche neben der Eichhorster Pfarrwiese, Weisdin, Quassow, Grabow auf den Thorwiesen, Torfwiesen bei Daffow, Sülz u. a. D.

132. *Carex dioica* L. (T. 1788). Vergl. S. 39.

133. *Carex Davalliana* Sm. (Neuendf. 1828) auf Wiesen hinter der Fähre bei Rostock.

134. *Carex pulicaris* L. (T. 1788) auf Wiesen bei Neubrandenburg, Malchin, Grabow und am Privat.

135. *Carex chordorrhiza* L. (D. 1811) bei Rostock auf der sumpfigen Wiese an der Ob. Warnow bei dem Pulvermagazin; am Weisdiner See (unv. Neustrelitz) rechts vom Abhange des Schloßberges.

136. *Carex disticha* Huds. (T. 1795) = *intermedia* Good. S. 125.

137. *Carex arenaria* L. (L. Sch. 1777) S. 125.

138. *Carex vulpina* L. (L. Sch. 1777).

β. *nemorosa* W. auf feuchten Wiesen bei Daffow.

139. *Carex muricata* L. (T. 1788).

β. *divulsa* Good. (Schultz 1819).

140. *Carex teretiuscula* Good. (D. 1828).

141. *Carex paniculata* L. (T. 1788).

142. *Carex paradoxa* Willd. (D. 1809).

143. *Carex brizoides* L. und zwar die Form

α. *campestris* (C. Schreberi Schrk. D. 1809)

bei Neubrandenburg auf Tillys Schanze, bei der Wolkow-  
schen Gypsmühle (Zabel), bei Grabow a. m. D., und auf  
der Bleiche in einem Dorfgarten zu Bahlen unv. Boizenburg.

144. *Carex remota* L. (T. 1788).

145. *Carex stellulata* Good. (Schultz 1806).

146. *Carex leporina* L. (T. 1788).



147. *Carex elongata* L. (T. 1788).
148. *Carex canescens* L. (Schultz 1806).
149. *Carex caespitosa* L.! (*C. pacifica* Drej. Zabel 1860!) auf den Recknitz-, Trebel- und Peenewiesen.
150. *Carex vulgaris* Fr. (L. Sch. 1777 als *caespitosa*).
151. *Carex stricta* Good. (Schultz 1819) S. 31.
152. *Carex acuta* Good. (L. Sch. 1777).
153. *Carex Buxbaumii* Wahlb. (Zabel 1860! in litt.)  
auf den Peene-Wiesen bei Alsbude!
154. *Carex limosa* L. (T. 1788).
155. *Carex pilulifera* L. (Schultz 1806).
156. *Carex montana* L. (T. 1788).  
β. *ericetorum* Poll. (Link 1795).
157. *Carex praecox* Jacq. (T. 1788).
158. *Carex digitata* L. (T. 1788) Malchin im Hainholz, Schwerin im Steinfeld Holz und auf dem Werder, Neubrandenburg im Nemerower Holz in der Schlucht vor dem hohen Ufer!
159. *Carex panicea* L. (L. Sch. 1777).
160. *Carex glauca* Scop. (T. 1788).
161. *Carex strigosa* Huds. (*C. Griew. 1845*) im Holz bei Lübbsee unv. Daffow! im Gehölz am heil. Damme.
162. *Carex pallescens* L. (T. 1788).
163. *Carex flava* L. (T. 1788) häufig, auch auf Strandwiesen.  
β. *Oederi* Ehr. (Schultz 1806).
164. *Carex distans* L. (T. 1788).
165. *Carex Hornschuchiana* Hoppe (*C. Griew. 1847*) auf der Torfwiese am Prival! bei Penzlin am See und im Mewenort, auf den Recknitz-, Trebel- und Peenewiesen (Zabel).

Anm. *C. binervis* auf Pfl ist zu streichen, worüber zu vergl. Archiv VIII. S. 184; fehlt wahrscheinlich auch in Helstein.

166. *Carex extensa* Good. (Röp. 1841) bei Warnemünde und an der Wismarschen Bucht auf Salzwiesen; auf der Wiese am Priwal (C. Griew.)!

167. *Carex silvatica* Huds. (T. 1788).

168. *Carex Pseudo-Cyperus* L. (T. 1788).

169. *Carex ampullacea* Good. (Schultz 1806).

170. *Carex vesicaria* L. (T. 1788).

171. *Carex paludosa* Good. (Schultz 1806).

172. *Carex riparia* Curt. (Link 1795).

173. *Carex filiformis* L. (L. Sch. 1806).

174. *Carex hirta* L. (T. 1788).

103. Grami-  
neae. \* 175. *Panicum sanguinale* L. (Brück. 1803 nicht Timm!) früher cult., jetzt völlig eingebürgert.

\* 176. *Panicum filiforme* Koel. sp. (Deth. 1809) eingebürgert.

\* 177. *Panicum Crus galli* L. (L. Sch. 1777) desgl.

\* 178. *Setaria verticillata* L. sp. (Beuthe 1841) bei Neufirelitg und Mostock in Gemüsegärten und auf Hecken eingebürgert.

\* 179. *Setaria viridis* L. sp. (Brück. 1803) in Gärten und zwischen Getreide eingebürgert.

\* 180. *Setaria glauca* L. sp. (T. 1788) desgleichen, fehlt bei Ludwigslust.

181. *Phalaris arundinacea* L. (L. Sch. 1777).

*Ph. canariensis* L. hin und wieder verwildert, aber sich nicht fortpflanzend, weil der Same nicht reif wird (C. Griew.).

182. *Hierochloa odorata* L. sp. (T. 1795) auf Wiesen bei Markgrafenheide und Daffow, wahrscheinlich auch

an der Elbe, da es häufig auf dem Elbwerder bei Lenzen und im Gebiete der Flora von Hamburg bis Blankenese hinab gefunden wird.

183. *Anthoxanthum odoratum* L. (L. Sch. 1777).

184. *Alopecurus pratensis* L. (L. Sch. 1777).

β. *nigricans* Sonder nicht Hornem.; (Prahl 1837)

b. Güstrow, später von Drewes dort vergebens gesucht. S. 191.

\* 185. *Alopecurus agrestis* L. (T. 1791) eingebürgert  
z. B. bei Krizow, Grabow u. a. D.

186. *Alopecurus geniculatus* L. (L. Sch. 1777).

β. *fulvus* Sm. (D. 1828) auch am Strande bei Warnemünde.

γ. *bulbosus* (Prahl 1837) bei Güstrow.

187. *Phleum arenarium* L. (T. 1795) im Fluglande der Dünen am Seestrande.

188. *Phleum Boehmeri* L. sp. (T. 1788).

189. *Phleum pratense* L. (L. Sch. 1777).

β. *nodosum* L. (T. 1788).

\* 190. *Leersia oryzoides* L. sp. (Prahl 1837) ursprünglich ein Unkraut der Reisfelder, jetzt zufällig in M. a. m. D. eingebürgert (Rostock, Güstrow [von Drewes später dort vergebens gesucht], Ludwigslust, Kaltenhof an der Elbe); in M. Strelitz noch nicht gefunden, namentlich nicht bei Neustrelitz.

191. *Agrostis alba* L. (T. 1795).

β. *gigantea* Roth.

192. *Agrostis vulgaris* With. (L. Sch. 1777 *rubra*).

193. *Agrostis canina* L. (T. 1791).

\* 194. *Apera Spica venti* L. sp. (L. Sch. 1777)  
wahrscheinlich mit dem Getreide eingebürgert.

*Polypogon monspeliensis* Desf. wurde im Sommer 1855 bei Warnemünde an einer Stelle gefunden, wo im vorausgehenden Winter französischer Ballast ausgeladen war (Oriwanf crit. Studien S. 8).

195. *Calamagrostis lanceolata* Roth. L. sp. (T. 1788).

*C. litorea* Schr. sp. (Röper 1844) früher (im J. 1818) bei Warnemünde, ist in neuerer Zeit nicht wieder gesehen; sie ward auch im Geb. der Lübecker Flora bei Falkenhausen a. d. Wacknitz, so wie in Preußen an 2 Stellen im Weichselgeb. gefunden, und soll auch in Litthauen bei Polangen und an den Dünen wachsen.

196. *C. Epigeios* L. sp. (T. 1788) im Binnenlande und auch am Strande bei Warnemünde und Daffow.

197. *C. Halleriana* DC. (Neuendorf 1828).

198. *C. neglecta* Ehr. sp. (T. 1795).

199. *C. varia* Schr. sp. (Beuthe 1837 ap. Schultz sup. 2) unweit Neustrelitz bei Torwitz nach Prelant zu.

200. *C. sylvatica* Schr. sp. (T. 1788).

201. *Ammophila arenaria* L. sp. (T. 1788) auf Dünen und Flugsandfeldern des Binnenlandes.

(196 + 201.) *A. baltica* Flügge sp. (T. 1793) auf Dünen bei Warnemünde und Daffow in Gesellschaft der Stammeltern.

202. *Milium effusum* L. (L. Sch. 1777).

Anm. *Stipa pennata* L. (Lgm. 1850) soll am Ostseeufer bei Doberan in Menge wachsen, was mir aber nicht glaublich erscheint, da vor dem J. 1850 schon so viele aufmerksame Botaniker jene Dertlichkeit besucht haben, ohne dieses Gras dort zu finden. Bei Neubrandenburg, wo Dr. Sach es gefunden haben will, kommt es nicht vor; auch auf Pöbel will man es gefunden haben.

203. *Phragmites communis* L. (L. Sch. 1777) durch ganz M., selbst auf Salzwiesen am Ostseestrande. S. 38.

204. *Koeleria cristata* L. sp. (T. 1788).

β. *glauca* DC. (Lgm. 1841).



205. *Aira caespitosa* L. (T. 1788).

β. *Wibeliana* Sond. soll bei Dömitz und Boizenburg gefunden sein, was indeß nach Röpers Meinung noch zweifelhaft bleibt.

206. *Aira flexuosa* L. (L. Sch. 1777 *montana*).

Ann. Die dem NW. Deutschlands angehörige Var. *uliginosa* Weihe möchte vielleicht in der Haideebene aufzufinden sein.

207. *Corynephorus canescens* L. sp. (T. 1788).

208. *Holcus lanatus* L. (L. Sch. 1777).

209. *Holcus mollis* L. (T. 1788).

210. *Arrhenatherum elatius* L. sp. (T. 1788).

*Avena brevis* Roth. (Schultz 1837) hin und wieder unter der Saat eingeschleppt.

\* 211. *Avena strigosa* Schreb. (T. 1788) unter *A. sativa* eingebürgert.

\* 212. *Avena fatua* L. (T. 1788) zwischen Getreide eingebürgert, besonders unter Roggen.

213. *Avena pubescens* L. (T. 1795).

214. *Avena pratensis* L. (L. Sch. 1777).

215. *Avena tenuis* Moench. (Trevir. 1828) auf dünnen, sonnigen Hügeln bei Doberan und Schwerin (an letzterem Orte in neuerer Zeit aber nicht wieder gefunden).

*Avena flavescens* L. (Prahl 1837) cult. und verwildert z. B. bei Glüstraw, Schwerin, Doberan.

216. *Avena caryophyllea* L. sp. (T. 1788).

217. *Avena praecox* L. sp. (T. 1788).

218. *Triodia decumbens* L. sp. (T. 1795).

219. *Melica uniflora* Retz. (T. 1788).

220. *Melica nutans* L. (T. 1788).

221. *Briza media* L. (L. Sch. 1777). S. 31.

*Poa procumbens* Curt. (Rüper 1850) bei Warnemünde mit Ballasterbe aus südlichen Gegenden eingeschleppt.

222. *Poa annua* L. (T. 1788).

223. *Poa bulbosa* L. (Schultz 1819) bei der Krappmühle unweit Neubrandenburg, rechts am Wege, wo es besonders in der forma *vivipara* vorkommt. Bei Warnemünde? (T. 1795).

224. *Poa nemoralis* L. (T. 1788).

β. *fertilis* Host. (T. 1795 *palustris*).

225. *Poa sudetica* Haenke (Flörke 1803) am Gafenbecker See untw. Friedland, in Buchenwäldern bei Doberan.

226. *Poa trivialis* L. (T. 1788).

227. *Poa pratensis* L. (T. 1788).

β. *angustifolia* (T. 1788).

228. *Poa compressa* L. (T. 1788).

229. *Glyceria spectabilis* M. K. L. sp. (T. 1788.)

230. *Glyceria fluitans* L. sp. (L. Sch. 1777). Vergl. Schwadengrütze S. 39. 111.

231. *Glyceria distans* L. sp. (T. 1795) auf salzhaltigen Wiesen am Seestrande und im Binnenlande.

232. *Glyceria maritima* Huds. sp. (Link 1808) auf Strandwiesen z. B. bei Wustrow auf dem Fischlande (Zabel), Warnemünde, Daffow.

233. *Glyceria aquatica* L. sp. (L. Sch. 1777) auch auf salzhaltigen Wiesen bei Daffow.

234. *Molinia coerulea* L. sp. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 36, wo statt *Melica* „*Molinia*“ zu lesen.

235. *Dactylis glomerata* L. (L. Sch. 1777).

236. *Cynosurus cristatus* L. (L. Sch. 1777).

237. *Festuca myuros* Ehr. var. *sciuroides* Roth.  
(Trevir. 1828) auf Hügeln bei Doberan.

238. *Festuca ovina* L. (L. Sch. 1777).

β. *duriuscula* L. sp. pl. (T. 1795).

? γ. *heterophylla* Lam. (D. 1828) nach Röper  
für M. noch zweifelhaft.

239. *Festuca rubra* L. (T. 1788).

β. *heterophylla* Röper im meßenb. Quarto Ka-  
lender 1841 Nr. 69; vergl. Röper z. Flora Meßenburgs  
II. S. 238 oben.

240. *Festuca silvatica* Vill. (Prah 1837) in feuchten  
Laubwäldern bei Güstrow, Rostock, Crivitz und auf der  
hohen Burg bei Schlemmin; im Rempliner Walde in  
Menge (Zabel), bei Sülz (Weidner).

241. *Festuca gigantea* L. sp. (T. 1788).

242. *F. borealis* M. K. (Zabel 1858) in der Heene  
bei Upost unweit Dargun.

243. *Festuca arundinacea* Schreb. (T. 1791).

244. *Festuca elatior* L. (L. Sch. 1777).

(244 + 263). *F. loliacea* Huds. (Röp. 1844) ein Bastard  
von *F. elatior* und *Lolium perenne* L. (Röp.) bei Rostock  
(zwischen den Stammeltern) und bei Neustrelitz auf der  
Wiese am Zierker See gefunden.

245. *Brachypodium sylvaticum* Mönch. sp. (Brück.  
1803).

246. *Brachypodium pinnatum* L. sp. (T. 1788).

\* 247. *Bromus secalinus* L. (L. Sch. 1777) unter dem  
Getreide eingebürgert.

\* 248. *Bromus mollis* (L.) Babington. (T. 1788) wahr-  
scheinlich nur eingebürgert.

*β. racemosus* L. (D. 1828).

*γ. commutatus* Schrad. (Schultz 1819).

\* 249. *Bromus arvensis* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert.  
*β. patulus* Wimm. M. K. für M. noch sehr zweifelhaft (Röper).

250. *Bromus asper* Murr. (T. 1795) z. B. bei Malchin im Pinnower und Kempliner Walde (Zab.).

251. *Bromus erectus* Huds. (D. 1828) bei Mechow unweit Ratzburg.

252. *Bromus inermis* Leys. (Schmidt 1828) bei Kessin unv. Rostock, auf der Insel Buchwerder im Daffower See, am Elbufer bei Dömitz und Boizenburg.

253. *Bromus sterilis* L. (T. 1788).

254. *Bromus tectorum* L. (L. Sch. 1777) häufig, im Haidegebiet aber nur am hohen Elbufer bei Wend. Wehningen (G. Brück.).

\* 255. *Gaudinia fragilis* L. sp. (Griew. 1847) auf einer Wiese bei Daffow mit fremdem Grassamen eingeschleppt und dort seit 1835 beobachtet; desgl. im Geb. d. Flora von Hamburg.

256. *Triticum junceum* L. (T. 1791) auf der See- seite der Dünen; selten auf Bül, häufig bei Warnemünde und Daffow; auf dem Fischlande (Zabel).

257. *Triticum repens* L. (L. Sch. 1777) S. 38. 125.

*β. glaucum* Desf. (Röp. 1844).

(256 + 57.) *T. acutum* DC. (D. 1828) in Gemeinschaft der Stammeltern am sandigen Meeresstrande.

(256. 57 + 59.) *T. strictum* Deth. 1828, wahrscheinlich ein Abkömmling des voraufgehenden Bastards und des *Elymus arenarius* (Röper); auf niedrigen, im Winter und



bei starken Stürmen von der See bespülten Stellen der Dünen bei Warnemünde, zwischen den Stammelstern.

Ann. Wenn Garcke (ed. 4.) meint, *T. strictum* sei vielleicht nur eine Abart von *T. repens*, so hat er wahrscheinlich nie authentische Ex. davon gesehen! Es gleicht (wie schon Röper z. Fl. N. II, 269 bemerkt,) vielmehr einem schlanken *Elymus arenarius*.

258. *Triticum caninum* L. (Link 1795).

259. *Elymus arenarius* L. (T. 1788) auf den Dünen und auf Flugsandfeldern im Binnenlande z. B. bei Ludwigslust, Neustrelitz und in der Rostocker Haide.

260. *Elymus europaeus* L. (Prahl 1837) in feuchten, sumpfigen Laubhölzern (besonders auf Kalkboden): am h. Damn, bei Güstrow im Töpferkuhlenbruch (von Drewes dort aber vergebens gesucht), bei Teterow.

\* 261. *Hordeum murinum* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert. S. 32.

262. *Hordeum secalinum* Schreb. (T. 1795) auf Wiesen b. Warnemünde und an d. Wisnarschen Bucht häufig.

*Hordeum maritimum* L. (Rathsack bei Röper 1846) an der neuen Ballaststelle bei Warnemünde, wohl von der Nordseeküste durch Ballasterde dorthin verschleppt.

\* 263. *Lolium perenne* L. (L. Sch. 1777) eingebürgert?

*Lolium italicum* A. Br. (Röp. 1844) cult. und hin und wieder verwildert z. B. bei Rostock, Grabow und Daffow.

\* 264. *Lolium temulentum* L. (L. Sch. 1777) zw. dem Sommergetreide eingebürgert. S. 138.

\* 265. *Lolium arvense* Schrad. (A. Br. 1803) zw. Weizen eingebürgert. S. 36.

266. *Lepturus incurvatus* L. sp. (Häcker 1844! 47) auf dem Prival in großer Menge, zw. der Pötenitzer Wief und der Dfsee, auch bei Flimstorf an der Wisn. Bucht.

Ann. Vergl. über diese Art C. Griewank im Archiv V. 159 und VIII. 178. In einer neueren brieflichen Mittheilung meint Gr., daß an den Klüften der Nord- und Ostsee nur diese Art vorkomme, nicht aber der echte *L. filiformis* Trin. Ich glaube daß Gr., wenigstens was die deutsche Ostseeküste betrifft, Recht hat, denn Gr. des angeblichen *L. filiformis* von Mönchgut, die ich kürzlich durch Herrn Zabel erhielt, sind dem mir von Griewank mitgetheilten *L. incurvatus* völlig gleich! Beide unterscheiden sich aber auf den ersten Blick in ihrem ganzen Habitus von dem echten *L. filiformis* Trin., den ich aus dem Gebiete der Flora von Rom besitze: bei diesem ist der Stalm in der That dünn wie ein Faden, und die Aehre bleibt auch im trockenen Zustande ganz gerade gestreckt; die ganze Pflanze ist viel zarter und schlanker, und bildet keine solche nach allen Seiten hin ausgebreitete rasenförmige Büschel, wie *L. incurvatus*.

267. *Nardus stricta* L. (T. 1788).

### III. Filicoideae.

(Vergl. Röper 1843.)

104. Polypodiaceae.

1. *Pteris aquilina* L. (L. Sch. 1777) Röper S. 64.
2. *Blechnum Spicant* L. sp. (v. Kamptz 1806) Röper 67: bei Loißow unweit Mirrow in der Haide; in der großen Haideebene an m. D. (Grabow, Neu-Karstädt, Bofup).
3. *Asplenium septentrionale* L. sp. (Schultz 1819) Röper 69, mit dem folgenden, und auch bei Neu-Brandenburg bei der hintersten Mühle sehr selten (wo ich diese Art bis jetzt noch nicht habe auffinden können).
4. *Asplenium Breynii* Retz. (Schultz 1819) Röper 73; bei Beseitz an der Steinmauer im Holz am Wege nach Friedland.
5. *Asplenium Ruta muraria* L. (L. Sch. 1777) Röper 74; an alten Stadt- und Kirchhofsmauern nicht eben selten!

6. *Asplenium Filix femina* L. sp. (L. Sch. 1777) Röp. 73.

7. *Asplenium Trichomanes* L. (T. 1788) Röp. 74, durch ganz M., aber immer nur auf kleine Räume beschränkt: bei Neubrandenburg nur bei der hintersten Mühle! bei Hirschshagen an den Ruinen der rothen Kirche, an der Kirchhofsmauer in Zachow unv. Stargard! zwischen Ulrichshufen und Sagel in einem Hohlwege! desgl. im Hainholz bei Malchin; an der Kirchhofsmauer zu Dempsin und zu Gresse (im Klützer Ort); auch im Geb. der Fl. von Grabow a. m. D.

8. *Cystopteris fragilis* L. sp. (L. Sch. 1777) Röp. 78, an aus Gerösten aufgeführten Kirchhofsmauern der Dörfer nicht selten.

9. *Polystichum cristatum* L. sp. *Callipteris* Ehr. (T. 1788).

10. *Polystichum spinulosum* Sw. sp. (T. 1788) Röp. 82.  
β. *dilatatum* Hoff. sp. (Schultz 1819).

11. *Polystichum Filix mas* L. sp. (L. Sch. 1777).  
Vergl. S. 125.

12. *Polystichum Oreopteris* Sw. sp. (Brück. 1803) Röp. 81, in den Tannen am Wege von Neubrandenburg nach Nowa; im Hufen bei Pentzlin.

13. *Polystichum Thelypteris* L. sp. (T. 1788) Röp. 80.

14. *Aspidium aculeatum* Sw. (Röp. 1843 p. 97) in einem kleinen Tannengehäß; bei Nestock; bei Sülz in 2 Ex. von Dr. Weidner gefunden; Glüströw in den Röver Tannen?

15. *Polypodium Dryopteris* L. (T. 1788) Röp. 63.

Anm. Nach dem ähnlichen, kalkliebenden *P. Robertianum* Hoff. (*calcareum* Sm.) habe ich sowohl im mecklenburgischen als auch im

rügianischen Kreidegebiete vergebens gesucht; es kommt dort nur immer *Dryopteris* vor.

16. *Polypodium Phegopteris* L. (Thede 1806) Röp. 62: Neubrandenburg im Brodaschen Holz; Neustrelitz beim Schweizerhause; Malchin im Kalenschen Holz u. s. w., im Geb. der Fl. von Güstrow und Grabow aber noch nicht gefunden.

17. *Polypodium vulgare* L. (L. Sch. 1777). S. 125.

105. Osmundaceae. 18. *Osmunda regalis* L. (T. 1788) Röp. 103; bei Ribnitz zw. Körlwitz und Neuhufen (Zabel), bei Malchin im Kalenschen Holz am Moor hinter der Ziegelei; am Torfgraben hinter Markgrafensheide nicht selten; bei Woldeck in der Nähe der Wolfshagenschen Ziegelei, bei Neustrelitz in der Kalkhorst (ausgerottet?); — im Geb. der Flora von Grabow a. m. D.

106. Ophioglosseae. 19. *Ophioglossum vulgatum* L. (T. 1788) Röp. 123; Neubrandenburg auf den Wiesen hinter der Ruhweide! Malchin auf den Kemplischen Wiesen nahe an der Peene; Sülz auf den Recknitzwiesen; bei Warnemünde; Grabow b. d. Sehmkuhlen; Ludwigslust nur auf G. Brückners Wiese gefunden.

20. *Botrychium Lunaria* Sw. (L. Sch. 1777), weit durch M. verbreitet, auch in den Dünenkesseln bei Warnemünde.

21. *B. simplex* Hitchk. (Roep. 1859) auf sandigem, mit spärlicher Grasdecke bewachsenem Boden am nördlichen Rande der Barnsdorfer Tannen,  $\frac{1}{4}$  M. von Rostock, zusammen mit *B. Lunaria* und *matricariaefolium* in einem einzigen Ex. ein einziges Mal gefunden am 22. Juni 1847.

22. *B. matricariaefolium* A. Braun (Roep. 1850) in den Barnsdorfer Tannen mit den beiden vorigen; in den



Dünenfesseln bei Warnemünde sparsam, häufiger aber in den Dünen bei Dierhagen auf dem Fischlande, — an letzteren beiden Orten mit *B. Lunaria* und *rutaefolium*.

23. *B. rutaefolium* Al. Br. (T. 1788) bei Malchin an zwei Stellen im J. 1847 gefunden, bei Dargun (Zabel); in den Dünenfesseln bei Warnemünde, Dierhagen und Neuhufen auf dem Fischlande (Zabel).

Num. Nur Röpers gewichtige Autorität (s. dessen Abhandlung in der bot. Zeitung 1859 No. 2) veranlaßt mich diese vier zusammen und durcheinander vorkommenden Botrychien als ebenso viele Species aufzuführen.

24. *Lycopodium complanatum* L. (T. 1788) Röp. 130. <sup>107. Lycopodiaceae.</sup>

β. *Chamaecyparissus* A. Br. (G. Brück. 1849) früher bei Quast unweit Ludwigslust, jetzt soll es dort wieder ausgerottet sein.

25. *Lycopodium clavatum* L. (L. Sch. 1777). S. 125.

26. *Lycopodium inundatum* L. (Brück. 1803) Röp. 129; auf dem Wulfenzinschen Felde in einem Bruch nach dem Brodaer Holz zu; bei Sülz in der Haideebene an vielen Orten.

27. *Lycopodium annotinum* L. (T. 1788) Röp. 137; nicht selten in M., in der Haideebene aber nur erst bei Hagenow gefunden.

28. *Lycopodium Selago* L. (T. 1788) Röp. 128.

29. *Pilularia globulifera* L. (T. 1791) Röp. S. 155; <sup>108. Marsileaceae.</sup> am See bei dem Basedower Theerosen; auf dem Görries'er Moor bei Schwerin.

30. *Equisetum hiemale* L. (L. Sch. 1777) Röp. <sup>109. Equisetaceae.</sup> S. 150; durch ganz M., wenn auch an den einzelnen Orten nicht häufig, — bei Neubrandenburg z. B. am

Ufer des Teiches bei der hintersten Mühle! und im Memerower Holz am Seeufer! Malchin, Rothenmoor! u. s. w. (S. 39 und 126).

31. *Equisetum limosum* L. (T. 1788) Röp. S. 149.

32. *Equisetum palustre* L. (T. 1788) Röp. S. 149.

33. *Equisetum pratense* Ehrh. (Schultz 1819 als *umbrosum*) Röp. S. 147. in den Wäldern um Neubrandenburg nicht selten! Neustrelitz in der Bürgerhorst; in der Wolkowschen Haide (Zabel), bei Güstrow in den Hasenhöfen, — gewiß auch noch weiter verbreitet, aber nicht beachtet.

34. *Equisetum silvaticum* L. (L. Sch. 1777) Röp. 146.

35. *Equisetum Telmateja* Ehr. (Röp. 1843 S. 146) bei Klocksin und Grubenhagen am Malchiner See und zwar die var. *serotina*; am Ufer der Trave und des Daffower Sees; in der Römmitz bei Ratzburg. — In M. Strelitz (namentlich bei Neubrandenburg), wo es nach Schultz 2. Nachtrag wachsen soll, noch nicht gefunden.

36. *Equisetum arvense* L. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 32 und 126.

β. *serotinum* Mey. = *E. campestre* Schultz sup. 1, vergl. Wilde in der Denkschrift d. Schlesischen Gesell. u. s. w. 1853 S. 186.

#### IV. Musci frondosi.

(Nach Fiedler 1844, mit einigen Emendationen.)

110. Sphag-  
neae.

1. *Sphagnum cymbifolium* Dill. (L. Sch. 1777).

β. *compactum* Brid.

2. *Sphagnum squarrosum* Pers. (Bland. 1804).

3. *Sph. subsecundum* N. E. (Schultz 1819).  
 β. *contortum* Schultz bei Sayfe unv. Friedland!
4. *Sph. acutifolium* Ehr. (T. 1788).
5. *Sph. cuspidatum* Ehr. (Crome 1803).  
 β. *plumosum* Brid. (Schultz 1828) = *Sph. laxifolium* C. Müll.
6. *Splachnum ampullaceum* L. (T. 1788). 111. Splachnaceae.
7. *Physcomitrium pyriforme* Brid. (T. 1788). 112. Funariaceae.
8. *Ph. sphaericum* Schwäg. sp. (Schultz 1819) bei  
 Neubrandenburg am fl. Zhenpohl.
9. *Ph. fasciculare* Hedw. sp. (Bl. 1804).
10. *Funaria hibernica* Hook. (Crome 1805) selten,  
 z. B. an den Zippendorfer Anhöhen bei Schwerin.
11. *F. hygrometrica* Hedw. (L. Sch. 1777).
12. *Phascum serratum* Schreb. (T. 1788). 113. Phasceae.
13. *Ph. muticum* Schr. (T. 1788).
14. *Ph. Floerkeanum* W. M. (Flörke nach 1816) bei  
 Rostock.
15. *Ph. patens* Hedw. (Sch. 1806) auf feuchtem Lehms-  
 und Thonboden ziemlich selten.
16. *Ph. cuspidatum* Schr. (T. 1788).
17. *Ph. bryoides* Dick. (Sch. 1806) auf sandigem,  
 nacktem Boden ziemlich selten.
18. *Ph. curvicolium* Hedw. (Fied. 1844) in hoch-  
 gelegenen Wäldern an Grabenrändern selten.
19. *Ph. nitidum* Hedw. (T. 1788).
20. *Ph. crispum* Hedw. (Sch. 1806) ziemlich selten.
21. *Ph. subulatum* L. (T. 1788).
22. *Pottia cavifolia* Ehr. (T. 1788). 114. Pottiaceae.
23. *P. minutula* Fürn. (Sch. 1806).

24. *Pottia truncata* Hedw. sp. (T. 1788).

β. *intermedia* Schwägr. sp.

25. *Anacalypta lanceolata* Hedw. sp. (T. 1788).

β. *aciphylla* Wahlb. (Bl. 1809).

115. Trichostomeae.

26. *Barbula unguiculata* Hedw. (T. 1788). — Hierher gehören als Var.: *B. cuspidata*, *apiculata*, *microcarpa*, *obtusifolia* Schultz.

27. *B. fallax* Hedw. (Bl. 1804).

28. *B. brevicaulis* Schwäg. (Sch. 1823) „in praeruptis sylvestribus Duc. Megap. Starg.“, fehlt bei Fiedler.

29. *B. gracilis* Schwäg. (F. 1844) selten auf thonig-sandigen Feldern.

30. *B. Hornschuchiana* Schultz (1819 als *revoluta*) Neubrandenburg bei der Brandmühle.

31. *B. convoluta* Hedw. (T. 1788).

32. *B. muralis* L. sp. (L. Sch. 1777).

33. *B. subulata* L. sp. (T. 1788).

34. *B. laevipila* Br. Sch. (Wüst. 1844) bei Schwerin am alten Wege nach Ludwigslust an Weiden.

35. *B. latifolia* Br. Sch. (F. 1844) bei Schwerin an alten Bäumen in der Pappelallee am faulen See.

36. *B. ruralis* L. sp. (L. Sch. 1777).

37. *Trichostomum rigidulum* Hedw. sp. (Bl. 1809) selten.

38. *Tr. tortile* Schr. (T. 1788) nicht häufig.

39. *Tr. homomallum* Hedw. sp. (Sch. 1806) in Wäldern an Hohlwegen nicht häufig.

40. *Tr. pallidum* Hedw. (Bl. 1803) im Brodaer Holz bei Neubrandenburg; Malchin am Fuchsberge.

41. *Distichium capillaceum* Hedw. sp. (Sch. 1806) Fiedler No. 46.



42. *Gymnostomum rutilans* Hedw. (Sch. 1828) selten an schattigen, sandigen, nackten Anhöhen und Grabenrändern (in M. Strelitz, — nach Schultz). 116. Weisia-  
ceae.
43. *Hymenostomum microstomum* Hedw. sp. (Bl. 1803).  
 β. *obliquum* N. H. (Sch. 1828).
44. *Weisia controversa* Hedw. (T. 1788).
45. *W. cirrhata* L. sp. (T. 1788).
46. *W. recurvirostra* Hedw. (T. 1788).
47. *Trematodon ambiguus* Horn. (G. Brück. 1818), nur bei Ludwigslust gefunden, wo es aber in neuerer Zeit vergebens gesucht ist.
48. *Ceratodon cylindricus* Hedw. sp. (Sch. 1819) auf sandigen Anhöhen bei Neubrandenburg.
49. *C. purpureus* L. sp. (T. 1788).
50. *Dicranum cerviculatum* Hedw. (Bl. 1804).  
 β. *pusillum* Hedw. (Sch. 1806).
51. *D. pellucidum* L. sp. (T. 1788).
52. *D. strumiferum* Hedw. sp. (Sch. 1806) selten auf schwammigen, bewaldeten Wiesen an alten Wurzelstöcken.
53. *D. flexuosum* L. sp. (T. 1788).
54. *D. Schreberi* Sw. (Sch. 1806).
55. *D. varium* Hedw. (T. 1788).  
 β. *rigidulum* Sw. (Sch. 1819).
56. *D. rufescens* Sm. (Sch. 1806) nicht häufig.
57. *D. crispum* Hedw. (F. 1844) auf feuchtem Sandboden am Rande der Wege und Gräben nicht häufig.
58. *D. heteromallum* L. sp. (T. 1788).
59. *D. subulatum* Hedw. (Sch. 1819) seltener.
60. *D. longifolium* Ehr. (Bl. 1804) im Mühlenholz bei Neubrandenburg am Fußsteige nach der h. Mühle an Steinen.

61. *Dicranum flagellare* Timm! (1791) in Wäldern auf verfaultem, an der Erde liegendem Holz: bei Malchin, Ballin (unw. Stargard), Müldenitz.

62. *D. scoparium* L. sp. (L. Sch. 1777).

β. *orthophyllum* Brid. (Sch. 1819).

63. *D. majus* Sm. (Sch. 1806 als *recurvatum*, welches hierher, und nicht zur vorhergehenden Art gehört, vergl. Archiv VIII. 95); bei Neubrandenburg, Malchin, Sternberg.

64. *D. undulatum* Ehr. (T. 1788).

65. *D. Schraderi* W. M. (Bl. 1804) ziemlich selten.

66. *D. spurium* Hedw. (T. 1788) am Wege von Malchin nach Schwinkendorf auf den Hügeln in den Tannen; in den Hufentannen bei Stargard.

67. *D. glaucum* L. sp. (T. 1788).

68. *Thysanomitrium pyriforme* Schultz sp. (1819) Fiedler Nr. 45; bei Ballin unw. Stargard im Holz hinter dem Hofgarten.

69. *Mnium stygium* Sw. sp. (Bl. 1808) bei Neubrandenburg im Brüderbruch, unweit Kratzburg am Wege nach Neustrelitz, Waren, Rövershagen, Schwerin.

70. *M. punctatum* Schreb. sp. (T. 1788).

71. *M. undulatum* Hedw. (T. 1788).

72. *M. hornum* L. sp. (T. 1788).

73. *M. serratum* Brid. (Bl. 1804) Neubrandenburg am Starg. Berge.

β. *orthorrhynchum* Blandow sec. Schultz 1828.

74. *M. rostratum* Schwäg. (Bl. 1804) Neubrandenburg am hohen Ufer auf Steinen, Voitz unw. Stargard.

75. *M. cuspidatum* Schreb. sp. (T. 1788).

76. *M. affine* Blandow (1804).

77. *Mnium stellare* Dill. sp. (T. 1788) Malchin im Kalenschen Holz im ersten Hohlwege; Neubrandenburg im Mühlenholz, bei Loitz in dem Holz an der Balliner Gränze an dem Ufer eines Wasserlaufes.

78. *Bryum cernuum* Br. Sch. (Fiedl. 1860!) auf dem Kalkwerder bei Schwerin auf ausgeschütteten Kalkfelsen.

79. *B. lacustre* Blandow (1804) bei Waren; auch am Wentower See an der Südgränze von W. Strelitz durch Struck entdeckt.

80. *B. inclinatum* Sw. sp. (Bl. 1804) selten in Wäldern an feuchter Erde.

81. *B. strictum* Schultz (1828) an feuchten, grasigen und übersandeten Orten bei Neubrandenburg.

82. *B. Warneum* Blandow (1806) bei Waren.

83. *B. latifolium* Br. Sch. (Bland. 1809?) sehr selten, fehlt bei Fiedler!

Anm. Diese Art wurde von Bl. in Mecklenburg gefunden und ohne nähere Angabe des Standortes an Bridel mitgetheilt, der sie als *Weisia fornicata* bestimmte; vergl. C. Müller Synopsis Muscorum II. p. 571. (Mittheilung von Hrn. Struck).

84. *B. nutans* Schreb. (T. 1788).

85. *B. elongatum* Hedw. sp. (Bl. 1809) seltener.

86. *B. crudum* L. sp. (T. 1788).

87. *B. annotinum* L. sp. (T. 1791).

88. *B. carneum* L. (T. 1788) nicht häufig.

89. *B. pyriforme* L. sp. (L. Sch. 1777).

90. *B. intermedium* Brid. (Sch. 1806) nicht häufig.

91. *B. bimum* Schreb. (Schultz 1806).

92. *B. pseudo-triquetrum* Hedw. sp. (T. 1788).

93. *B. Duvalii* Voith. (Sch. 1828).

94. *Bryum roseum* Schreb. (T. 1788).

95. *B. turbinatum* Hedw. (Crome 1803) Schwerin am Dstorfer See beim Galgenberge.

96. *B. capillare* L. sp. (T. 1788).

97. *B. pallens* Sw. (Bl. 1817) bisher nur bei Neubrandenburg, Waren und Schwerin (auf dem Ralkwerder, von Fiedler!) gefunden.

98. *B. caespiticium* L. (T. 1788).

99. *B. erythrocarpon* Schwäg. (Sch. 1806) bei Mildenitz an der Wolfshagener Gränze bei dem alten Thurme (nicht bei Stargard!).

100. *B. atropurpureum* W. M. (Bl. 1808) nicht häufig.

101. *B. argenteum* L. (T. 1788).

102. *Timmia megapolitana* Hedw. (T. 1788) nur bei Malchin am Salärberge gefunden.

103. *Aulacomnion palustre* Schreb. sp. (T. 1788).

104. *A. androgynum* L. sp. (T. 1788).

118. Meesia-  
ceae.

105. *Paludella squarrosa* L. sp. (T. 1788).

106. *Meesia uliginosa* Hedw. sp. (T. 1788).

107. *M. longiseta* Hedw. sp. (T. 1788).

108. *M. Albertini* Br. Sch. (Beuthe! ap. Sch. 1828) bei Neustrelitz (nicht: Neubrandenburg!) und Schwerin.

109. *M. tristicha* Br. Sch. (Sch. 1828).

110. *Amblyodon dealbatus* Hedw. sp. (Bl. 1804).

119. Bartramia-  
miceae.

111. *Bartramia ithyphylla* Brid. (Sch. 1806).

112. *B. pomiformis* L. sp. (T. 1788).

β. *crispa* Sw. (Sch. 1806).

113. *B. marchica* Brid. (Bl. 1806 in b. N. B.) bei Woldeck am Todtensee, bei Ludwigsflust auf den Teuchentiner Wiesen.



114. *Bartramia fontana* L. sp. (T. 1788).
115. *Schistidium ciliatum* Hedw. sp. (T. 1788). 120. Grim-  
mieae.
116. *Grimmia apocarpa* L. sp. (T. 1788).
117. *G. pulvinata* L. sp. (T. 1788).
118. *G. trichophylla* Grev. (Sch. 1819) bei Gevezin  
(nicht: Neubrandenburg!) an Granitblöcken.
119. *Gümbelia crinita* Brid. sp. (Struck 1860!) bei  
Wismar vor dem Alt-Wismar. Thore zwischen dem Schutt  
der abgebrochenen Wassermühle.
120. *Racomitrium lanuginosum* Hedw. sp. (T. 1788)  
selten an Granitblöcken.
121. *R. heterostichum* Hedw. sp. (T. 1788).
122. *R. canescens* Weis sp. (T. 1788).
123. *R. ericoides* Schrad. (Sch. 1819).
124. *Orthotrichum cupulatum* Hoffm. (Sch. 1806, 121. Ortho-  
trichaceae.  
Crome?).
125. *O. anomalum* Hedw. (T. 1788).
126. *O. Ludwigii* Schwäg. (Fied. 1844) Schwerin  
im Steinfelder Holz.
127. *O. obtusifolium* Schrad. (Bl. 1804).
128. *O. pumilum* Schwägr. (Bl. 1804).
129. *O. tenellum* Bruch (Fied. 1844) an Pappeln  
am faulen See bei Schwerin.
130. *O. fallax* Bruch (Fied. 1844).
131. *O. affine* Schr. (Sch. 1806).
132. *O. fastigiatum* Bruch (Fied. 1844) an alten  
Bäumen am faulen See bei Schwerin.
133. *O. speciosum* N. E. (Fied. 1844).
134. *O. coarctatum* P. B. (Fied. 1844).
135. *O. crispum* Hedw. (T. 1788).

136. *Orthotrichum crispulum* Horn. (Fied. 1844) selten.  
 137. *O. stramineum* Horn. (Fied. 1844).  
 138. *O. diaphanum* Sch. (Bl. 1803).  
 139. *O. Lyellii* Hook. (Fied. 1844).  
 140. *O. leiocarpum* Br. Sch. (T. 1788).  
 122. Encalyptae. 141. *Encalypta vulgaris* Hedw. (T. 1788).  
 142. *E. streptocarpa* Hedw. (Sch. 1819).  
 123. Buxbaumieae. 143. *Diphyscium foliosum* L. sp. (T. 1788).  
 144. *Buxbaumia aphylla* Hall. (T. 1788).  
 124. Tetraphideae. 145. *Tetraphis pellucida* L. sp. (T. 1788).  
 125. Polytrichaceae. 146. *Polytrichum undulatum* L. sp. (T. 1788).  
 147. *P. tenellum* Röhl. (T. 1788 undul.  $\beta$ ).  
 148. *P. angustatum* Brid. (Sch. 1819) Neubrandenburg vor dem Burgholze und bei der hintersten Mühle.  
 149. *P. nanum* Dill. (T. 1788).  
 150. *P. aloides* Hedw. (T. 1788).  
 151. *P. urnigerum* L. (T. 1788).  
 152. *P. gracile* Menz. (Sch. 1806).  
 153. *P. juniperinum* W. (T. 1788).  
 154. *P. strictum* Menz. (Bl. 1804 junip. var. affine).  
 155. *P. piliferum* Schreb. (T. 1788).  
 156. *P. formosum* Hedw. (Sch. 1806).  
 157. *P. commune* L. (L. Sch. 1777). Vergl. S. 126.  
 126. Fontinalae. 158. *Fontinalis antipyretica* L. (T. 1788).  
 159. *F. squamosa* L. (Sch. 1806) Neubrandenburg im Bach bei der Zirzow'schen Mühle unter der Freiarche.  
 127. Ripariaceae. 160. *Cinclidotus fontinaloides* P. B. (Fied. 1844) an Steinen in einem Waldbach im Wahrholze bei Schwerin.  
 128. Hypnaceae. 161. *Leucodon sciuroides* L. sp. (T. 1788).  
 162. *Leptohymenium filiforme* Timm sp. (1788).

163. *Anomodon viticulosus* L. sp. (T. 1788 p. 221).
164. *A. curtispendus* L. sp. (T. 1788).
165. *Neckera pennata* Hedw. (Sch. 1806).
166. *N. crispa* L. (T. 1788).
167. *Leskea trichomanoides* Schreb. (T. 1788).
168. *L. complanata* L. sp. (L. Sch. 1777).
169. *L. sericea* L. sp. (T. 1788).
170. *L. subtilis* Hedw. (Sch. 1819) bei Stolpe unweit Stargard im Holz am See.
171. *L. polyantha* Schreb. (T. 1789).
172. *L. paludosa* Hedw. (Bl. 1806).
173. *L. polycarpa* Ehr. (Bl. 1808) nicht häufig.
174. *L. attenuata* Schreb. (T. 1788).
175. *Climacium dendroides* L. sp. (T. 1788).
176. *Hypnum exiguum* Blandow (1804).

Anm. — Nach Treviranus eine gute, selbstständige Art, die auch auf den Ruinen der Burg Godesberg bei Bonn wächst. Trev. sagt über dieselbe: „Dies Moos wird in Weber und Mohrs Flora Deutschlands mit *H. serpens* verbunden, von dem es sich durch den Standort sehr unterscheidet, sowie durch die lineal-pfriemenförmigen, ziemlich gedrängt stehenden Blätter, deren Nerv bis zur Spitze läuft, die kleinere, heller gefärbte Frucht, vor Allem aber durch den Deckel, der sich mit einer langen, aufwärts gebogenen Spitze endigt. Schwägrichen vereinigt dasselbe mit *H. tenellum* Dicks., aber Beschreibung und Abbildung desselben entsprechen dem Godesberger Moose so wenig, als Exemplare des *H. tenellum*, welche ich Hrn. Dr. Hooker verdanke. Dagegen stimmt dasselbe mit der Beschreibung und Abbildung des *H. exiguum* von Blandow in Sturms Flora, so wie mit einem Ex. der auf der Stadtmauer von Neubrandenburg (hinter dem Schauspielhause!) aufgenommenen Pflanze, welches ich von Hrn. Dr. A. F. Brückner daselbst habe, aufs vollkommenste überein.“ (Verhandl. des naturhist. Ver. der preuß. Rheinlande III. S. 18 f.). Auch bei Mosock entdeckte Blandow dies Laubmoos.

177. *Hypnum serpens* L. (T. 1788).  
 178. *H. velutinum* L. (T. 1788).  
 179. *H. Starkii* Brid. (Bl. 181?) selten.  
 180. *H. piliferum* L. (Crome 1803).  
 181. *H. incurvatum* Schr. (Bl. 1806) bei der Strzowschen Mühle unv. Neubrandenburg vor der Freitarche.  
 182. *H. albicans* Neck. (Sch. 1806. Crome?)  
 183. *H. glareosum* Br. Sch. (Fied. 1844) bei Schwerin nicht selten.  
 184. *H. salebrosum* Hoffm. (Crome 1803).  
 185. *H. nitens* Schreb. (T. 1788).  
 186. *H. lutescens* Huds. (T. 1788).  
 187. *H. populeum* Hedw. (Bl. 1804).  
 188. *H. plumosum* L. (Sch. 1806) selten.  
 189. *H. rutabulum* L. (T. 1788).  
 190. *H. cordifolium* Hedw. (Bl. 1804).  
 191. *H. cuspidatum* L. (T. 1788).  
 192. *H. Schreberi* W. (T. 1788).  
 193. *H. purum* L. (T. 1788).  
 194. *H. trifarium* W. M. (Sch. 1806) selten: bei Wolbeck am Todten See, Jagke im Bruch an der Eichhorster Gränze, Schwerin a. m. D.  
 195. *H. stramineum* Dicks. (Bl. 1808).  
 196. *H. myurum* Poll. (T. 1788).  
 197. *H. myosuroides* L. (Sch. 1828) feltener als das vorige und mit diesem zusammen.  
 198. *H. alopecurum* L. (Sch. 1806) selten.  
 199. *H. abietinum* L. (T. 1788).  
 200. *H. Blandowii* W. M. (Bl. 1807 ap. W. M.).  
 201. *H. tamariscinum* Hedw. (L. Sch. 1777).



202. *Hypnum splendens* Hedw. (L. Sch. 1777).  
 203. *H. sylvaticum* L. (Crome 1803).  
 204. *H. denticulatum* L. (T. 1788).  
 205. *H. undulatum* L. (Häcker 1848 ap. Rabh.) an  
 d. mecklenb. Gränze bei Lübeck, im Ludwigsfluster Schloß-  
 garten bei dem Mausoleum (Dr. N. Brüch. jun.).  
 206. *H. riparium* L. (T. 1788).  
 207. *H. ruscifolium* Neck. (Brück. 1803).  
 208. *H. murale* Neck. (T. 1791) selten, z. B. an  
 der Neubrandenburger und Malchiner Stadtmauer.  
 209. *H. confertum* Dick. (Fied. 1844).  
 210. *H. megapolitanum* Bland. (1804).  
 211. *H. Schleicheri* Hedw. (Fied. 1844) um Schwerin  
 nicht selten.  
 212. *H. praelongum* L. (T. 1788).  
 213. *H. Stockesii* Turn. (Bl. 1808).  
 214. *H. strigosum* Hedw. (T. 1788).  
     β. *obtusifolium*.  
 215. *H. longirostrum* Ehr. (T. 1788).  
 216. *H. brevirostre* Ehr. (Crome 1803).  
 217. *H. triquetrum* L. (T. 1788).  
 218. *H. loreum* L. (T. 1788).  
 219. *H. stellatum* Schreb. (T. 1788) bei Malchin  
 auf der Weide beim Falärberge, bei der Brandmühle unv.  
 Neubrandenburg.  
 220. *H. chrysophyllum* Bried. (Sch. 1806).  
 221. *H. squarrosum* L. (T. 1788).  
 222. *H. cupressiforme* L. (T. 1788).  
 223. *H. silesiacum* P. B. (Häcker 1848) an der  
 mecklenb. Gränze unv. Lübeck.

224. *Hypnum fluviatile* Sw. (Sch. 1806).  
 225. *H. filicinum* Hedw. (T. 1788).  
 226. *H. commutatum* Hedw. (Bl. 1808).  
 227. *H. Crista castrensis* L. (T. 1788).  
 228. *H. molluscum* Hedw. (T. 1788).  
 229. *H. fluitans* L. (T. 1788).  
 230. *H. aduncum* L. (T. 1788).  
 231. *H. uncinatum* Hedw. (Sch. 1806).  
 232. *H. lycopodioides* Schwäg. (Sch. 1806) bei Neu-  
 brandenburg und Eichhorst an sumpfigen Stellen.  
 233. *H. scorpioides* L. (T. 1788).  
 234. *H. palustre* L. (Bl. 1806).  
 129. Fissidontae. 235. *Fissidens incurvus* Schwäg. (Fied. 1844) an  
 Grabenrändern an der Westseite des Neustädtischen Kirch-  
 hofs bei Schwerin.  
 236. *F. bryoides* L. sp. (T. 1788).  
 237. *F. osmundoides* Hedw. (Bl. 1803).  
 238. *F. taxifolius* L. sp. (T. 1788).  
 239. *F. adiantoides* L. sp. (T. 1788).

## V. Hepaticae.

(Nach Wüßnei 1854.)

130. Ricciae. 1. *Riccia fluitans* L. (T. 1788).  
 2. *R. crystallina* L. (T. 1788).  
 3. *R. natans* L. (Sch. 1819) bei Eichhorst unweit  
 Friedland, und von Wüßnei (briefliche Mitth.) auch bei  
 Schwerin gefunden.  
 4. *R. ciliata* Hoffm. (Sch. 1806) nur bei Neubran-  
 denburg auf lehmigen Brachäckern gefunden.  
 5. *R. glauca* L. (T. 1788).

6. *Anthoceros laevis* L. (T. 1788).
7. *A. punctatus* L. (T. 1788) seltener als d. vorige.
8. *Rebouillia hemisphaerica* L. sp. (Sch. 1806) bei 131. Mar-  
 Zafke (unw. Friedland) im Bruch der Pferdekoppel; bei chantiaeeae.  
 Schwerin am hohen Ufer (am Wege nach Zippendorf).
9. *Fegatella conica* L. sp. (T. 1788).
10. *Preissia commutata* N. E. (Wüst. 1855! in litt.)  
 bei Schwerin.
11. *Marchantia polymorpha* L. (L. Sch. 1777).
- \* 12. *Lunularia vulgaris* Mich. (Huth 1854) aus dem  
 südl. Europa mit Topfgewächsen eingeschleppt.
13. *Metzgeria furcata* L. sp. (T. 1788). 132. Junger-  
 manniaceae.
14. *Aneura pinguis* L. sp. (T. 1788).
15. *A. multifida* L. sp. (T. 1788).
16. *A. palmata* Hedw. (T. 1788).
17. *Blasia pusilla* Mich. (T. 1788) Malchin im  
 Hohlwege des Hainholzes an der Gielower Gränze; bei  
 Schwerin am Rande der Neumühler Wiese. In M. Strelitz  
 noch nicht gefunden.
18. *Pellia epiphylla* L. sp. (T. 1788).
19. *Fossombronina pusilla* Schmidel sp. (T. 1788).
20. *Lejeunia serpyllifolia* Dicks. sp. (L. Sch. 1819)  
 nur bei Neubrandenburg im Brodaschen Holz und bei  
 Ballin unw. Stargard gefunden.
21. *Frullania dilatata* L. sp. (T. 1788).
22. *F. tamariscifolia* L. sp. (T. 1788).
23. *Madotheca platyphylla* L. sp. (T. 1788).
24. *Radula complanata* L. sp. (L. Sch. 1777).
25. *Ptilidium ciliare* L. sp. (T. 1788).
26. *Trichocolea Tomentella* Ehr. sp. (T. 1788) nur

bei Malchin im Kalenschen Holz an dem Bach beim Mühlenbruch gefunden.

27. *Mastigobryum trilobatum* L. sp. (Sch. 1819) nur bei Neubrandenburg im Burgholze gefunden.

28. *Lepidozia reptans* L. sp. (T. 1788).

29. *Calypogeia Trichomanis* Scop. sp. (T. 1788). schon bei Neubrandenburg, Malchin, Güstrow und Schwerin gefunden.

30. *Chiloscyphus polyanthos* N. E. (Sch. 1819) bei Güstrow auf einer Wiese.

*β. rivularis* Schultz sup. p. 89. Kl. Nemerow am Mühlenbach an Baumwurzeln.

31. *Ch. pallescens* Schrad. sp. (Sch. 1806) Neubrandenburg im Brodaschen Holz.

32. *Lophoclea heterophylla* Schrad. sp. (Sch. 1819).

33. *L. bidentata* L. sp. (T. 1788).

34. *L. minor* N. E. (Wüst. 1854) bei Schwerin im Gehölze von Görslow an einer Quelle.

35. *Lioclaena lanceolata* L. sp. (T. 1791) Neubrandenburg im Brodaer Holz, Malchin im Kahlschen Holz (im ersten Hohlwege), Schwerin im Steinfelder Holz.

36. *Sphagnocretis communis* N. E., Dicks. sp. (Sch. 1806).

37. *Jungermannia trichophylla* L. (T. 1788) Neubrandenburg im Brodaschen, Malchin im Kalenschen Holz.

38. *J. setacea* Web. (Sch. 1819 = *J. Schultzii* Spr.) bei Krumbeck hinter dem Hofgarten „in turfosis paludosis“; bei Schwerin an ähnl. Localität auf dem Werder.

39. *J. connivens* Dick. (Sch. 1819).

40. *J. bicuspidata* L. (T. 1788).



41. *Jungermannia divaricata* E. B. (Sch. 1806).
42. *J. barbata* Schreb. (Sch. 1819).
43. *J. excisa* Dicks. (Sch. 1819) Neubrandenburg an den steilen Abstürzen des hohen Ufers, Schwerin auf Sand- und Haideboden.
44. *J. ventricosa* N. E. (T. 1788) bei Witzerhof unweit Malchin auf den Hügeln in den Tannen.
45. *J. inflata* Huds. (Sch. 1819) „in schattigen Wäldern auf der Erde.“
46. *J. Schultzii* N. E. (Sch. 1838); von Schultz bei Neubrandenburg gefunden.
47. *J. crenulata* Sm. (Wüst. 1854) bei Schwerin im Hasel- und Steinfeldes Holz auf feuchtem Sandboden.
48. *J. exsecta* Schm. (Sch. 1806).
49. *obtusifolia* Hook. (W. 1854) bei Schwerin im Hasel- und Steinfeldes Holz in Wegen und Vertiefungen.
50. *J. albicans* L. (W. 1854) bei Schwerin und Crivitz auf sandigem Waldboden.
51. *Scapania nemorosa* L. sp. (Sch. 1819) Neubrandenburg im Nemerower Holz, auch bei Schwerin nicht selten.
52. *S. uliginosa* N. E. (Sch. 1834 ap. Hübener) „in Mecklenburg“ — aber wo?
53. *S. undulata* L. (Sch. 1819) bei Ballin hinter dem Hofgarten in Gräben.
- β. resupinata* L. Neubrandenburg im Nemerower Holz, bei Schwerin auf dem Sachsenberger Gebiet.
54. *S. compacta* N. E. (Treviranus 1834 ap. Hüb.) „in Mecklenburg“ — aber wo?
55. *Plagiochila asplenioides* L. sp. (T. 1788).

56. *Alicularia scalaris* Schr. sp. (Sch. 1806).

57. *Sarcoscyphus Ehrharti* Corda (Sch. 1819) bei Neuendorf unv. Neubrandenburg am Eingang des Holzses, bei Krumbek in einem Bruche.

## VI. Algae.

(Geordnet nach Rabenhorst Krypt. Flora 1847.)

Anm. Ueber das Mangelhafte der nachfolgenden Aufzählung vergl. S. 194 ff. -- Die Süßwasser-Algen habe ich durch einen vorgelegten \* bezeichnet.

133. Diato-  
maceae.

1. *Eunotia granulata* Ehrb. (Koch 1860!) Ostsee:  
Doberan.

2. *E. turgida* Ehrb. (Koch 1860!) ebend.

3. *E. zebrina* Ehrb. (Koch 1860!) desgl.

4. *Diatoma tenue* Ag. (Ditm. 1806) Ostsee.

5. *Bacillaria paradoxa* Gmel. (Rab. 1847) Ostsee:  
Wismar.

6. *Surirella thermalis* Kütz. (Rab. 1847) desgl.

7. *S. Lamella* Ehrb. (1840) desgl.

8. *S. Testudo* Ehrb. (1840) desgl.

9. *S. fastuosa* Ehrb. (Koch 1860!) Ostsee: Doberan.

10. *S. splendida* Ehrb. (Koch 1860!) desgl.

11. *Synedra Gallionii* Ehrb. (1840) Ostsee: Wismar.

12. *S. Ulna* Ehrb. (Koch 1860!) Ostsee: Doberan.

13. *Ceratonëis Fasciola* Ehrb. (1840) Wismar.

14. *C. Closterium* Ehrb. (1840) desgl.

\* 15. *Navicula gibba* Ehrb. (1840) Wismar im süßen W.

16. *N. Scalprum* G. T. (Ehrb. 1840) Ostsee: Wismar.

17. *N. Hippocampus* Ehrb. (1840) desgl.

18. *N. inversa* Ehrb. (1840) desgl.

19. *N. fulva* Ehrb. (Koch 1860!) Dŕŕŕee: Doberan.

20. *N. Silicula* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

21. *Pinnularia viridis* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

22. *P. flexipinna* Ehrb. nov. sp. (Koch 1860!) deŕŕgl.

23. *Cocconema Boekii* Ehrb. (1840) Dŕŕŕee: Wiŕŕmar.

24. *Syncyclia Salpa* Ehrb. (1840) deŕŕgl.

\* 25. *Tabellaria flocculosa* Roth sp. (Ditm. 1806).

26. *Grammatophora oceanica* Ehrb. (Koch 1860!)

Dŕŕŕee: Doberan.

27. *G. stricta* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

28. *Achnanthes longipes* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

29. *Striatella arcuata* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

30. *Coscinodiscus lineatus* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

31. *Actinocyclus bioctonarius* Ehrb. (Koch 1860!)

deŕŕgleich.

32. *A. septendenarius* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

33. *A. nonarius* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

34. *Campylodiscus Remora* Ehrb. (1841) Dŕŕŕee:

Wiŕŕmar.

35. *C. Echnöis* Ehrb. (1841) deŕŕgl.

36. *C. Clypeus* Ehrb. (Koch 1860!) Dŕŕŕee: Doberan.

37. *Gallionella granulata* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

38. *G. laevis* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

39. *G. sulcata* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

40. *G. varians* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

41. *Cocconöis undulata* Ehrb. (1840) Dŕŕŕee: Wiŕŕmar.

42. *C. Navicula* Ehrb. (1840) deŕŕgl.

43. *C. borealis* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

44. *C. fennica* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

45. *C. lineata* Ehrb. (Koch 1860!) deŕŕgl.

46. *Cocconëis striata* Ehrb. (Koch 1860!) besgl.  
 47. *Dictyocha Fibula* Ehrb. (1840) Ostsee: Wismar.  
 48. *Auliscus cylindricus* Ehrb. (Koch 1860!) Ostsee:

Doberan.

49. *Diplonëis didyma* Ehrb. (Koch 1860!) besgl.

134. Desmidiaceae.

50. *Merismopoedia glauca* Ehrb. sp. (Rose 1845);  
 im Seewasser bei Wismar.

135. Nostochinae.

- \* 51. *Palmella cruenta* Ag. (Fiedler 1860!) auf Steinen in dem schnellfließenden Canale unterhalb der kleinen Schleuse im Ludwigsluster Schloßgarten.

\* 52. *Tetraspora bullosa* Roth. sp. (T. 1788) häufig in Gräben und stehenden Gewässern.

\* 53. *Nostoc commune* Vauch. (T. 1788 als *Tremella Nostoc* L.) nach Regen auf Wiesen bei Malchin u. s. w. S. 40.

\* 54. *Nostoc pruniforme* L. sp. (T. 1793) Klostoch im Wallgraben und in der Warnow; im Siggelfower See sehr häufig; Schwerin im Dstorfer See, Ludwigslust im Schloßgarten.

\* 55. *Anabaina flos aquae* Lyngb. (v. Flotow 1845 bei Rützing Phycol. germ. S. 188. — ob auch Timms *Byssus flos aq.* 1788?).

\* 56. *Cylindrospermum spirale* Ktz. (Link 1806 als *Oscillatoria decorticans*, in den N. Beitr. St. 20).

136. Oscillatoriaceae.

\* 57. *Oscillaria viridis* Vauch. (Link 1806 in den N. Beitr. St. 46).

\* 58. *Oscillaria princeps* Vauch. (Link l. c. 1806).

\* 59. *Microcolëus autumnalis* Ag. sp. (Schultz 1806 als *Conferva velutina*); in ausgetrockneten Gräben häufig.

\* 60. *Calothrix distorta* Dillw. sp. (Ditmar 1808 als *Epiphysium dist.* in N. Beitr. St. 50).



\* 61. *Sphaeroplea annulina* Roth. sp. (Link 1806 in den N. Beitr. St. 46).

62. *Physactis durissima* Ktz. Phyc. Germ. p. 186. (v. Flotow 1845) auf *Ceramium rubrum* bei Doberan.

\* 63. *Rivularia pygmaea* Ktz. l. c. p. 188. (v. Flotow 1845).

\* 64. *Draparnaldia glomerata* Ag. (Ditmar 1808 als <sup>137. Confer-</sup>  
*Batrachospermum* gl. in den N. Beitr. St. 50). <sup>vaceae.</sup>

\* 65. *Saprolegnia ferax* Ktz. (Fiedler 1860! in litt.) auf Fliegen im Wasser macerirend.

\* 66. *Oedogonium vesicatum* Vauch. sp. (Link 1806 als *Prolifera* ves. l. c. St. 46).

\* 67. *Oedogonium tumidulum* Sm. sp. (Link l. c. 1806 als *Prolifera* parasitica).

\* 68. *Conferva rivularis* L. (T. 1788) nicht selten in Bächen.

\* 69. *Conferva floccosa* Vauch. sp. (Ditmar 1806) als *Prolifera* fl. in den N. Beitr. St. 20).

\* 70. *Conferva fracta* Dillw. (Link 1806 l. c. St. 46).

\* 71. *Conferva canalicularis* Roth. (T. 1788).

72. *Conferva sericea* Huds. (Kahle 1860!) in der Ostsee bei A. Gaarz.

\* 73. *Conferva glomerata* L. (T. 1788) in Bächen.

74. *Conferva laetevirens* Dillw. var. *marina* (Link 1806 als *Polysperma abbreviata* l. c. St. 46) in der Ostsee.

75. *Conferva rupestris* L. (T. 1791) an Steinen bei Warnemünde!

76. *Aegagropila Linnaei* Ktz. (Rabenhorst 1847) in der Ostsee bei Warnemünde.

\* 77. *Aegagropila Froelichiana* Ktz. (T. 1791 als

*Conferva Aegagr.*) im Mechower See (Sonder), und auch im Krafower See und in der Müritz! besonders bei Melz (wo nach Stürmen fußhohe Haufen dieser Alge am Ufer ausgeworfen vorkommen sollen, wie Siemssen 1791 berichtet).

78. *Ectocarpus ochraceus* Ktz. (Huth 1860!) in der Ostsee bei Räggsdorf.

\* 79. *Spirogyra quinina* Müll. sp. (Link 1806 l. c. St. 46).

\* 80. *Spirogyra elongata* Vauch. sp. (Ditmar 1806).

\* 81. *Spirogyra condensata* Vauch. sp. (Ditm. 1806).

\* 82. *Spirogyra nitida* Fl. Dan. (Ditm. 1806 als *Conjugata princeps* l. c.).

\* 83. *Spirogyra decimina* Müll. sp. (Link 1806 l. c. St. 46).

\* 84. *Zygnema cruciatum* Vauch. sp. (Ditm. 1806 l. c. St. 20).

\* 85. *Zygonium ericetorum* Roth. sp. (Link 1806 l. c. St. 46); auf Torf- und Haideboden.

\* 86. *Hydrodictyon utriculatum* Roth. (G. Brückner 1860!) Ludwigslust am Bassin.

138. Ulva-  
ceae.

\* 87. *Botrydium granulatum* L. sp. (T. 1788) an überschwemmt gewesenen und wieder ausgetrockneten Orten z. B. bei Malchin auf dem Gerichtsberge.

\* 88. *Vaucheria bursata* Müll. sp. (Ditm. 1806 als *Ectosperma ovata* l. c. St. 20).

\* 89. *Vaucheria hamata* Vauch. sp. (Ditm. 1806).

\* 90. *Vaucheria Dillwynii* W. M. sp. (Link 1806 l. c.).

\* 91. *Vaucheria geminata* Vauch. sp. (Ditm. 1806 l. c.).

\* 92. *Vaucheria caespitosa* Vauch. sp. (T. 1788 als *Conferva amphibia*).

93. *Enteromorpha intestinalis* L. sp. (T. 1788) häufig in der Ostsee und um Salzquellen!

94. *Enteromorpha compressa* L. sp. (T. 1788) in der Ostsee bei Warnemünde!

95. *Ulva latissima* L. (T. 1788) Ostsee bei Warnemünde!

96. *Phycoseris Linza* L. sp. (T. 1788) Ostsee bei Warnemünde! auch am Fischlande (Zabel).

97. *Callithamnion repens* Dillw. sp. (T. 1793 als <sup>139. Ceramiacae.</sup> *Conferva tomentosa*) in der Ostsee.

98. *Ceramium diaphanum* Light. sp. (T. 1788 als *Conferva corallina*) in der Ostsee bei Warnemünde! und auch noch am Fischlande (Zabel).

99. *Ceramium rubrum* Huds. sp. (Link 1806 als *C. virgatum*) in der Ostsee bei Doberan! Warnemünde! und auch noch am Fischlande! (Zabel).

100. *Nemalion multifidum* W. M. sp. (Huth 1860!) in der Ostsee bei Rügsdorf.

101. *Furcellaria lumbricalis* Ag. sp. (G. Brück. 1860!) in der Ostsee bei Doberan! am Fischlande (Zabel)!

102. *Furcellaria fastigiata* Huds. sp. (T. 1788 als *Fucus*) in der Ostsee bei Doberan! Warnemünde!

103. *Ahnfeltia plicata* Huds. sp. (Deth. 1811 in b. N. Beitr. St. 7 als *Fucus*) in der Ostsee; auch von Zabel am Fischlande gefunden.

104. *Phyllophora membranifolia* Ag. sp. ? (Huth 1860!) in der Ostsee bei Rügsdorf.

105. *Phyllophora Brodiaei* Turn. sp. (Huth 1860!) bei Räggsdorf und auch noch am Fischlande! (Zabel).

106. *Chondrus crispus* Lyng. var. *aequalis* (T. 1788 *Fucus rubens*) bei Warnemünde und am Strande des Fischlandes.

Ann. *Gelidium cartilagineum* L. sp. (T. 1793) ist wohl nur durch Zufall an den Strand von Warnemünde verschleppt worden.

140. Sphaerococceae.

107. *Polysiphonia violacea* Ag. sp. (Link 1806 als *Ceramium* in der Ostsee, auch noch am Fischlande (Zab.)!

108. *Polysiphonia allochroa* Ag. sp. (Huth 1860!) am Strande bei Räggsdorf.

109. *Polysiphonia nigrescens* Lyngb. sp. (Zabel 1860!) am Fischlande.

110. *Rhodomela subfusca* Wood. sp. (G. Brück. 1860!) bei Doberan; am Fischlande (Zabel)!

111. *Sphaerococcus confervoides* L. sp. (Link 1806) Ostsee.

112. *Delesseria sanguinea* L. sp. (T. 1788) in der Ostsee, auch am Fischlande (Zabel)!

113. *Hypoglossum alatum* Huds. sp. (Deth. 1811 in d. N. Beitr. St. 7) Ostsee; auch von Zabel am Fischlande gefunden!

114. *Phycodrys sinuosa* Ag. sp. (Huth 1860!) in der Ostsee bei Räggsdorf und am Fischlande (Zabel).

141. Phycocae.

115. *Mesogloia vermicularis* Ag. sp. (Zabel 1860!) am Fischlande.

116. *Chorda Filum* L. sp. (T. 1788 als *Fucus*).

β. *thrix*. γ. *tomentosa*; beide Var. am Fischlande (Zabel).



117. *Stilephora rhizodes* Ag. sp. (A. F. T. Brück. 1798) nach Ausweis meines Herbariums in der Ostsee bei Warnemünde!

118. *Desmarestia viridis* Müll. sp. (Zab. 1860!) am Fischlande.

119. *Laminaria saccharina* L. sp. (Deth. 1788 bei Linné, als *Fucus*), in der Ostsee.

120. *Laminaria digitata* L. sp. (Huth 1860!) in der Ostsee bei Räggsdorf; auch noch am Fischlande (Zabel).

121. *Fucus vesiculosus* L. (T. 1788) gemein am Ostseestrande!

Anm. *F. ceranoides* L. (T. 1793) ist wohl durch Zufall an die mecklenburgische Küste verschlagen.

122. *Fucus serratus* L. (T. 1788; *setaceus* Druckfehler!) am Ostseestrande bei Warnemünde! auch noch an der Küste Rügens!

123. *Fucus canaliculatus* L.? (T. 1791) auf Steinen bei Warnemünde.

124. *Himantalia lorea* L. sp. (C. Griewank 1860!) in der Ostsee bei Vostenhagen.

125. *Halidrys siliquosa* L. sp. (T. 1791 *Fucus*) bei Warnemünde! und auch noch am Fischlande (Zabel)!

\* 126. *Nitella gracilis* Sm. sp. (Fiedler ap. Rabenhorst 1847), bei Schwerin. 142. Characeae.

\* 127. *Nitella mucronata* A. Br. (Fiedler l. c. 1847) bei Schwerin.

\* 128. *Nitella syncarpa* Thuill. (Fiedler l. c. 1847) bei Schwerin.

\* 129. *Nitella flexilis* L. sp. (T. 1788 Chara).

\* 130. *Nitella tenuissima* Desv. (Fiedler l. c. 1847) bei Schwerin.

\* 131. *Chara scoparia* Bauer (Fiedler l. c. p. 1847) bei Schwerin. — Vergl. S. 37.

\* 132. *Chara foetida* A. Br. (T. 1788 als *vulgaris*).

133. *Chara ceratophylla* Wallr. (Zabel 1860!) im Saaler Bodden.

\* 134. *Chara latifolia* W. (Schultz 1806? als *tomentosa*) Tolense, Goldberger See.

135. *Chara hispida* L. (T. 1788) in Gräben und Teichen, aber nach Zabel auch im Saaler Bodden.

\* 136. *Chara horridula* Deth. N. Beitr. 1811 St. 7, in alten Torflöchern hinter Markgrafenheide.

137. *Chara crinita* Wallr. (Zabel 1860!) im Saaler Bodden.

138. *Chara baltica* Fr. (Zab. 1860!) im Saaler Bodden.

139. *Chara aspera* Willd. (Deth. 1809) in der südlichen Hälfte von M. Strelitz häufig, aber auch im Saaler Bodden (Zabel), und im heiligen See bei Markgrafenheide.

\* 140. *Chara fragilis* Desv. (Beuthe 1837) in Gräben bei Zierke unweit Neustrelitz.

Anm. Nicht unterzubringen weiß ich: *Batrachospermum intricatum* (Vauch.) Link, *Ceramium frondulosum* und *utriculare* Lk., *Conferva arenaria* (Roth) Lk. und *furcata* Timm, *Conjugata angulata*, *porticalis* und *variabilis* Ditmar, *Fucus prolifer* (Esp.) Dethard., *Oscillatoria Adansonii*, *leptonema* und *parietina* Ditm., *Saccosphaera aggregata* und *Spirogyra aeruginosa* Link, welche in den Mügl. Beitr. 1806, 1808 und 1811, in Timms Prodrömus und in Link's dissert. bot. noch erwähnt werden.

## VII. Lichenes.

(Geordnet nach Rabenhorst 1845.)

Ann. Unsere Kenntniß auch dieser Classe ist noch sehr mangelhaft und das nachfolgende Verzeichniß der Arten ist nur ein Lückenhülfer, von dem ich wünsche, daß er bald durch eine neue, gründliche Arbeit verdrängt werden möge. Um Raum zu sparen, gebe ich daher hier nur wenige Standorte an. Vergl. S. 197.

1. *Verrucaria epidermidis* Ach. (Schultz 1806). 143. Verrucariaceae.
2. *Verrucaria carpinea* Pers. (Schultz 1806).
3. *Verrucaria nitida* Schrad. (T. 1788 als *Sphaeria*).
4. *Verrucaria punctiformis* Pers. (Sch. 1806).
5. *Pertusaria Wulfenii* var. *agelaea* Ach. (Sch. 1806 als *Urceolaria*).
6. *Pertusaria communis* DC. (T. 1791 als *Lichen pertusus*).
7. *Graphis scripta* L. sp. (T. 1788 als *Lichen*). 144. Graphideae.  
 $\beta$ . *pulverulenta* (Sch. 1806 als *Opegrapha*).  
 $\gamma$ . *serpentina* (Sch. 1806 als *Opegrapha*).
8. *Opegrapha herpetica* Ach. (Sch. 1806 als *rubella*).
9. *Opegrapha atra* Pers. (Sch. 1806 *vulgata*, *macularis*, *epipasta*).
10. *Opegrapha varia* Pers. (Sch. 1806 *notha*).
11. *Urceolaria cinerea* L. sp. (Sch. 1806). 145. Limboriaceae.
12. *Urceolaria scruposa* L. sp. (Sch. 1806).
13. *Placodium lentigerum* Web.? (Sch. 1806 als *Parmelia*). 146. Lecanorinac.
14. *Placodium saxicola* Poll. (Sch. 1806 *Parmelia*).
15. *Placodium elegans* Lk. (Sch. 1806 *Parmelia*).
16. *Placodium murorum* Hoffm. (Sch. 1806 *Parmelia*).
17. *Zeora brunnea* Sw. (Sch. 1806 *Parmelia*).

18. *Zeora hypnorum* Ach. (Wüstnei 1860!) auf Sandboden bei Schwerin.
19. *Zeora glaucoma* Ach. (Sch. 1806 *Parmelia*).
20. *Zeora icmadophila* Ehr. (Sch. 1806 *Lecidea*).
21. *Zeora vitellina* Ehr. var. *aurella* Schaer. (Dr. A. Brück. 1860!) bei Ludwigsluft.
22. *Zeora rubra* Hoffm. (Thede 1806 in den N. Beitr.) bei Wittenburg und Rostock.
23. *Zeora cerina* Hedw. (Sch. 1806 *Parmelia*).
24. *Lecanora atra* Huds. (Sch. 1806 *Parmelia*).
25. *Lecanora subfusca* L. (T. 1788 Lichen).
26. *Lecanora sophodes* Ach. (Sch. 1806 *Parmelia*).
27. *Lecanora varia* Ehr. (Sch. 1806 *Parm.*).
28. *Lecanora albella* Hoffm. (Sch. 1806 *Parm.*).
29. *Lecanora Hageni* Ach. (Sch. 1806 *Parm.*).
30. *Collema atro-coeruleum* Schaer. (T. 1788 *Tremella lichenoides*).
31. *Collema crispum* Hoffm. (T. 1788 Lichen).
32. *Micaraea Wüstneii* Auerswald (Wüstnei 1857), bei Schwerin am Ufer des Medeweger Sees.
33. *Imbricaria tiliacea* Ehr. (Sch. 1806 als *Parm.*).
34. *Imbricaria saxatilis* L. (T. 1788 Lichen).
35. *Imbricaria physodes* L. (Sch. 1806).
36. *Imbricaria Acetabulum* Neck. (Sch. 1806 *Parmelia corrugata*).
37. *Imbricaria olivacea* L. (T. 1788 Lichen).
38. *Imbricaria caperata* L. (T. 1788 Lichen).
39. *Imbricaria conspersa* Ehr. (T. 1793 als Lichen *centrifugus*?).
40. *I. diffusa* Körb. (Wüst. 1860!) an Kiefern b. Schwerin.



41. *Imbricaria parietina* L. (T. 1788 Lichen). S. 126.
42. *Imbricaria aspera* Körb. (Wüstnei 1860!) bei Schwerin an Sorbus und Pappel.
43. *Parmelia obscura* Ehr. (Sch. 1806) auch bei Schwerin.
44. *Parmelia stellaris* L. (T. 1788 Lichen).
45. *Parmelia caesia* Hoffm. (Sch. 1806).
46. *Parmelia pulverulenta* Schreb. (T. 1788 Lichen orbicularis).
47. *Sticta scrobiculata* Scop. (Sch. 1806 Parm.).
48. *Lobaria pulmonaria* L. sp. (T. 1788). S. 36. 126.
49. *Peltigera venosa* L. (T. 1788).
50. *Peltigera horizontalis* L. (T. 1788).
51. *Peltigera canina* L. (T. 1788).
52. *Peltigera polydactyla* Hoffm. (Sch. 1806).
53. *Peltigera aphtosa* L. (T. 1788).
54. *Peltigera malacea* Ach. (Flörke 182?).
55. *Calycium adpersum* Pers. (T. 1788 *Mucor* 148. Calyci-  
neus lichenoides).
56. *Calycium chlorellum* Wahlb. (Sch. 1806).
57. *Calycium hyperellum* Ach. (Sch. 1806).
58. *Calycium lenticulare* Ach. (T. 1788 *Mucor* sphaerocephalus).
59. *Coniocybe furfuracea* L. sp. (T. 1788 *Mucor*).
60. *Lecidea citrinella* Ach. (Sch. 1806). 149. Lecide-  
aceae.
61. *Lecidea abietina* Ach. (Thede 1806 in d. N. Beitr.).
62. *Lecidea albo-atra* Schaer. (Sch. 1806 *L. corticola*).
63. *Lecidea dolosa* Wahl. (Sch. 1806 *Parmelia exigua*).
64. *Lecidea sanguinaria* Hoffm. (T. 1788 Lichen).

65. *Lecidea enteroleuca* Ach. (Wüstnei 1860!) bei Schwerin an alten Weiden.

66. *Lecidea parasema* Ach. (Sch. 1806).

67. *Lecidea punctata* Fr. (Wüst. 1860!) bei Schwerin an alten Niefen die der Sonne ausgefetzt find.

68. *Lecidea geographica* L. (T. 1791 als Lichen).

69. *Biatora ferruginea* Fr. (Dr. A. Brück. 1860!) bei Schwerin.

70. *Biatora uliginosa* Schrad. (Sch. 1806 *Lecidea*).

71. *Biatora microphylla* Schrad.? (Sch. 1806 *Lecidea*?)

72. *Biatora anomala* Spr. sp. (Sch. 1806 *Lecid. cyrtella*).

73. *Biatora granulosa* Ehr. (Wüst. 1860!) auf Sandboden bei Schwerin.

74. *Biatora sphaeroides* Schaer.  $\beta$ . *effusa* (Dr. A. Brück. 1860!) Schwerin am Hafelholz und auf dem Berder an *Pinus* und *Fagus*.

75. *Biatora rubella* Ehr. (Sch. 1806 *Lecid. vernalis*).

76. *Biatora rosella* Pers. (Sch. 1806 *Lecidea*).

77. *Biatora byssoides* L. (Sch. 1806 *Baeomyces rupestris*).

78. *Baeomyces roseus* Pers. (T. 1788 Lichen *Baeomyces*).

150. Cladoniaeae.

Ann. Um die ohnehin schon groÙe Verwirrung, welche in der nachfolgenden Gattung *Cladonia* herrscht, nicht meinerseits durch vielleicht irrthümliche Unterbringung der von unseren Floristen aufgezählten Arten unter die von Rabenhorst recipirten deutschen Species noch zu vermehren, werde ich für diese Gattung Förke's *Commentatio de Cladoniis* (Nostock 1828) zu Grunde legen, in welcher die mecklenburgischen Cladonien ganz speciell berücksichtigt sind; nur einige Aenderungen in den Namen habe ich nach S. v. Flotow *Lichenes Florae Silesiae* (in der Uebersicht der Arbeiten der Schlesischen Gesellschaft u. s. w. Breslau 1850 S. 98 ff.) vorgenommen.

79. *Cladonia papillaria* L. Flörke p. 5. (1828) auf Torf- und Schlamm Boden bei Markgrafenheide.

β. *stipata* p. 6. in dem Walde „Damerow“ unweit Barnsdorf.

80. *Cladonia delicata* Ach. sp. Fl. p. 7 (Sch. 1806 als *Baeomyces*) in der Rostocker und Milbenitzer Heide.

81. *Cladonia caespiticia* Ach. sp. Flörke p. 8 (1828) in der Rostocker Heide bei Meyer's Hofstelle.

82. *Cladonia decorticata* L. Fl. p. 10 (1828) in den Gehlsdorfer-Fähr-Tannen, und auf dem Harkeberge bei Pohnsdorf unweit Teterow.

83. *Cladonia cariosa* L. Fl. p. 12 (Sch. 1806), auf sandigem Boden an Wegen und Grabenrändern in den Wäldern Damerow und Kramenberg unweit Rostock; zw. Spohnholz und Warlin in M. Strelitz.

β. *strepilis* Ach. Fl. p. 14 in Nadelholzwaldungen der Rostocker Gegend.

γ. *symphyrcarpia* Ach. Fl. p. 15 (Sch. 1806) auf Heideboden und in Nadelholzwaldungen ziemlich verbreitet.

84. *Cladonia botrytes* L. Fl. p. 18 (Sch. 1806) in der Rostocker Heide und in Nadelholzwald. bei Friedland.

85. *Cladonia incrassata* Flörke p. 21 (1828) in der Rostocker Heide.

86. *Cladonia alcicornis* Ach. Fl. p. 23 (Sch. 1806) nicht selten in M.

87. *Cladonia cervicornis* Ach. = *verticillata* Fl. p. 26 (1828) häufig in M.

β. *phyllophora* Fl. p. 28.

88. *Cladonia gracilis* L. Fl. p. 30 (Sch. 1806) desgl. in manchen Abänderungen.

*β. aspera* p. 40.

89. *Cladonia degenerans* L. Fl. p. 41. (1828) in vielen Varietäten weit verbreitet.

90. *Cladonia pyxidata* L. = *neglecta* Fl. p. 49 (1828) bei Klostodf.

91. *Cladonia fimbriata* L. = *pyxidata* Flörke p. 51 (Sch. 1806).

*β. costata* p. 66. *γ. expansa* p. 68.

*δ. pterygota* p. 69. *ε. chlorophaea* p. 70.

92. *Cladonia ochrochlora* Flör. p. 75 (1828) häufig.

*β. phyllostrota* p. 79. *γ. nana* p. 79.

93. *Cladonia pityrea* L. Fl. p. 79 (Fl. 1828) häufig.

*β. cladomorpha* p. 81. *γ. pellucida* p. 82.

*δ. hololepis* p. 83.

94. *Cladonia coniocraea* L. Flör. p. 84 (T. 1788 *Lichen cornutus*).

*β. phyllotoca* p. 87.

95. *Cladonia coccifera* L. Fl. p. 89 (T. 1788) gemein.

*β. phyllocoma* p. 94. *γ. ochrocarpia* p. 95.

96. *Cladonia Flörkeana* Fr. Fl. p. 99 (1828) hin und wieder durch M.

*β. leucophylla* p. 101.

96. *Cladonia digitata* L. Fl. p. 102 (T. 1788) gemein.

98. *Cladonia deformis* L. = *crenulata* Flör. p. 105 (1828), nicht selten.

*β. pleurota* p. 107.

99. *Cladonia macilenta* Ehr. = *polydactyla* Flör. p. 103 (Sch. 1806 als *Baeomyces bacillaris*), häufig.

100. *Cladonia uncinata* Hoffm. = *cenotea* Fl. p. 125 (1828).



*β. brachiata* Fr. (Wüstnei 1860!) bei Schwerin und Güstrow.

101. *Cladonia squamosa* L. Fl. p. 129 (1828).

*β. asperella* p. 132. *γ. lactea* p. 136.

*δ. polychonia* p. 136.

102. *Cladonia glauca* Flör. p. 140 (1828) auf Sandboden in Nadelholzwäldern bei Waren und im Damerow.

103. *Cladonia furcata* L. Fl. p. 141 (Sch. 1806).

*β. spadicea* p. 146. *γ. recurva* p. 147.

*δ. crispatella* p. 148. *ε. crispata* p. 148.

*ζ. fissa* p. 151. *η. racemosa* p. 152.

104. *Cladonia pungens* Flörke p. 156 (1828) gemein.

*β. nivea* p. 158. *γ. foliosa* p. 159.

105. *Cladonia rangiferina* L. Fl. p. 160 (T. 1788), gemein.

*β. major* p. 163. *γ. tenuis* p. 164.

*δ. alpestris* p. 165. *ε. sylvatica* p. 167.

106. *Cladonia Arbuscula* W. C. (Flörke 1828 als *C. rangif. grandis* p. 169) bei Rostock; ist nach v. Flo-tow und Rabenhorst von der vorausgehenden als Species zu trennen.

107. *Cladonia stellata* Schaer. Fl. p. 172 (1828).

108. *Stereocaulon condensatum* Hoff. (Wüstnei 1860!) in den Tannen bei Neumühl unv. Schwerin nicht selten.

109. *Stereocaulon tomentosum* Wahl. (T. 1788 als *Lichen paschalis*) durch ganz Mecklenburg.

110. *Cetraria glauca* L. sp. (T. 1788).

151. Ramali-  
neae.

111. *Cetraria saepincola* Ehr. (Sch. 1806).

112. *Cetraria juniperina* L. (T. 1788).

113. *C. pinastri* Scop. (Thede 1806 in d. N. Beitr.).

114. *Hagenia ciliaris* L. sp. (T. 1788).  
 115. *Evernia furfuracea* L. (Sch. 1806 *Parmelia*).  
 116. *Evernia prunastri* L. (T. 1788).  
 117. *Ramalina pollinaria* Ach. (Sch. 1806 *Parmelia*).  
 118. *Ramalina fraxinea* L. (T. 1788).  
 119. *Ramalina calicaris* L. (T. 1788).  
 120. *Ramalina farinacea* L. (T. 1788).  
 152. *Usnea-*  
*ceae.* 121. *Cornicularia aculeata* Schreb. (T. 1788).  
 122. *Bryopogon jubatus* L. (T. 1788).  
 123. *Usnea barbata* L. (T. 1788).  
 124. *Usnea florida* L. (T. 1788).

## VIII. Fungi.

(Geordnet nach *Nabenhorst* 1844.)

Anm. Aus dieser Classe sind in neuerer Zeit nur einige Familien genauer durchforscht und von Dr. Fiedler (vergl. S. 154) bearbeitet worden, nämlich die Familien 153 und 160 ff.; die Kenntniß der übrigen läßt noch sehr viel zu wünschen übrig. — Hinsichtlich der Standorte muß ich der Raumersparniß wegen auf die Quellen-schriften und auf *Nabenhorst's* *Kryptogamen-Flora* verweisen.

### **Ordo I. Coniomycetes (Rostpilze).**

153. *Uredi-*  
*nel.* 1. *Rhizosporium Solani* Wal. Rabh. 3. (Boll 1860).  
*Uredo utriculosa* Cord. R. 8 (F. 1848).  
*U. olivacea* DC. R. 9 (F. 1853).  
*U. Caricis* Pers. R. 10. (T. 1848).  
*U. sitophila* Ditm. 1812 t. 34. R. 11.  
*U. segetum* Pers. R. 12. Ditm. t. 33. (Sch. 1806).  
*U. Maydis* DC. R. 14. (F. 1848).  
*U. longissima* Sow. R. 18. (F. 1848).  
*U. Anemones* Pers. R. 20. (Sch. 1806).  
 10. *U. apiculata* Strauss R. 26. (F. 1848).  
*U. Ficariae* Alb. Schw. R. 29. (F. 1848).  
*U. Geranii* DC. R. 32. (F. 1848).

13. *Uredo argentatum* Schultz sp. 1806. R. 35. (= *Impatientis* Rab.).  
*U. appendiculata* Pers. R. 38. (Sch. 1806).  
*U. muricella* Wallr. R. 42. (F. 1848).  
*U. Scrophulariae* Lasch. R. p. 579 (F. 1848).  
*U. suaveolens* Pers. R. 43. (Sch. 1806).  
*U. flosculosorum* Alb. Schw. R. 44. (Sch. 1806).  
*U. formosa* Rab. 45. (F. 1848).
20. *U. Polygonorum* DC. R. 47. (F. 1848).  
*U. Rumicum* DC. R. 48. (F. 1848).  
*U. Violarum* DC. R. 49. (F. 1848).  
*U. Betae* Pers. R. 50. (F. 1848).  
*U. Galii* Rab. 53. (F. 1848).  
*U. Armeriae* Dub. R. 61. (F. 1848).  
*U. Leguminosarum* Rab. 62. (Sch. 1806).  
*U. Evonymi* Mart. R. 64. (F. 1848).  
*U. Poterii* R. 67. (F. 1848).  
*U. Lini* DC. R. 68. (F. 1848).
30. *U. Euphorbiae* Pers. R. 70. (Sch. 1806).  
*U. Capraearum* DC. R. 72. (Sch. 1806).  
*U. epitea* Kze. Rab. 73. (F. 1848).  
*U. mixta* Steud. R. 75. (F. 1848).  
*U. gyrosa* Reb. R. 78. (F. 1848).  
*U. populina* Jacq. R. 79. (Sch. 1806).  
*U. Valerianae* DC. R. 80. (F. 1848).  
*U. Pulsatillae* Steud. R. 81. (F. 1860).  
*U. Potentillarum* DC. R. 84. (F. 1848).  
*U. Pyrolae* Schultz sp. 1806 R. 85.
40. *U. Labiatarum* DC. R. 86. (Sch. 1806).  
*U. Alchemillae* Pers. R. 87. (F. 1860).  
*U. Campanularum* Pers. R. 95. (F. 1848).  
*U. Rhinanthacearum* DC. R. 96. (1848).  
*U. Circeae* Alb. Schw. R. 98. (Siems. 1806).  
*U. Caryophyllacearum* Rab. 100. (F. 1848).  
*U. miniata* Pers. R. 102. (F. 1848).

47. *Uredo Ruborum* DC. R. 103. (Sch. 1806).  
*U. Rosae* Pers. R. 104. (Sch. 1806).  
*U. Hypericorum* DC. R. 106. (F. 1848).
50. *U. fulva* Schum. C. 109. (Sch. 1806).  
*U. Senecionis* Schum. R. 110. (F. 1848).  
*U. Artemisiae* Rab. 111. (F. 1848).  
*U. oblonga* R. 113. (F. 1860).  
*U. linearis* Pers. R. 117. (F. 1848).  
*U. Rubigo-vera* DC. R. 118. (F. 1848).  
*U. candida* Pers. R. 123. (Sch. 1806).  
*Physoderma gibbosum* Wallr. R. 125. (F. 1848).  
*Aecidium Convallariae* Schum. R. 145. (F. 1848).  
*Ae. Compositarum* Mart. R. 149. (Sch. 1806).
60. *Ae. rubellatum* Rab. 150. (Sch. 1806).  
*Ae. Cichoriacearum* DC. R. 152. (F. 1848).  
*Ae. Asperifolii* Pers. R. 161. (F. 1848).  
*Ae. Urticae* Schum. R. 162. (F. 1848).  
*Ae. Grossulariae* DC. R. 163. (Sch. 1806).  
*Ae. Violae* Schum. R. 166. (F. 1860).  
*Ae. Parnassiae* Rab. 168. (F. 1848).  
*Ae. punctatum* Pers. R. 169. (Sch. 1806).  
*Ae. leucospermum* DC. R. 170. (Sch. 1806).  
*Ae. Ranunculacearum* DC. R. 181. (F. 1848).
70. *Ae. Periclymeni* DC. R. 182. (F. 1860).  
*Ae. Euphorbiae* Pers. R. 185. (Sch. 1806).  
*Ae. Leguminosarum* Lk. sp. R. 186. (Sch. 1806).  
*Ae. elongatum* Rab. 187. (Sch. 1806).  
*Ae. Phascolorum* Wallr. R. 189. (F. 1848).  
*Ae. cornutum* Pers. R. 190. (Sch. 1806).  
*Ae. Scrophularinarum* Lsch. R. p. 579 (F. 1848).  
*Ae. Ari Rudolphi* (F. 1848).  
*Ae. Umbelliferarum* Schl. (Sch. 1806 No. 1286).  
*Ae. Adoxae* Grav. (F. 1860).
80. *Ae. Orchidearum* Fied. ed. 1. No. 1690 (1860).  
*Ae. Sweertiae* Ditm. (Siems. 1806).



82. *Roestelia cancellata* L. sp. R. 192. (Sch. 1806).  
*Peridermium Pini* Wallr. R. 193. (Tode 1793).  
*Puccinia Graminis* Pers. R. 198. (Sch. 1806).  
*P. arundinacea* Hedw. R. 199. (F. 1848).  
*P. Caricis* DC. R. 201. (F. 1848).  
*P. Asparagi* DC. R. 204. (F. 1848).  
*P. Polygonorum* Schl. R. 207. (Sch. 1806).  
*P. Calthae* Lk. R. 208. (Sch. 1806).
90. *P. Circaeae* Pers. R. 213. (Sch. 1806).  
*P. Glechomatis* DC. R. 215. (Sch. 1806).  
*P. Veronicarum* DC. R. 216. (F. 1848).  
*P. Menthae* Pers. R. 218. (F. 1848).  
*P. Compositarum* Schl. R. 221. (F. 1848).  
*P. Discoidearum* Lk. R. 222. (F. 1860).  
*P. Bardanae* Corda R. 231. (F. 1848).  
*P. Tragopoginis* Corda R. 232. (F. 1848).  
*P. Galiorum* Lk. R. 235. (F. 1848).  
*P. Umbelliferarum* DC. R. 237. (F. 1848).
100. *P. Aegopodii* Lk. R. 238. (F. 1848).  
*P. Aethusae* Lk. R. 239. (F. 1848).  
*P. Pimpinellae* Lk. R. 240. (F. 1848).  
*P. Saniculae* Rab. ed. 2. No. 350 (F. 1860).  
*P. Cicutae* Lasch. (F. 1848).  
*P. Adoxae* DC. R. 241. (F. 1848).  
*P. Ribis* DC. R. 243. (F. 1848).  
*P. Epilobii* DC. R. 244. (F. 1848).  
*P. Prunorum* Lk. R. 247. (F. 1848).  
*P. Anemones* Pers. R. 248. (Sch. 1806).
10. *P. Noli tangeris* Corda R. 249. (F. 1848).  
*P. Acerum* Lk. R. 250. (Siems. ap. Link 1813).  
*P. Violarum* Lk. R. 251. (F. 1848).  
*P. Lychnidearum* Lk. R. 252. (Sch. 1806).  
*P. Spergulae* Lasch (F. 1860).  
*P. Stellariae* Dub. R. 253. (F. 1848).  
*Triphragmium Ulmariae* Lk. R. 265. (F. 1848).

117. *Sporidesmium atrum* Lk. R. 298. (Lk. 1809).  
*Phragmidium incrassatum* Lk. R. 311. (Sch. 1806).  
*Ph. asperum* Wallr. R. 314. (F. 1848).
20. *Exosporium Tiliae* Lk. R. 317. (Lk. 1809).  
*Torula expansa* Pers. 328. (F. 1860).  
*T. herbarum* Lk. R. 341. (Lk. 1809).  
*T. aurea* Pers. sp. R. 356. (Lk. 1809).  
*T. heterospora* Rab. Herb. 1268. (F. 1860).  
*T. Casei* Corda Rab. ed. 2 No. 674 (F. 1860).  
*Helicomycetes roseus* Lk. R. 370. (Dit. 1809 ap. Lk.).  
*Conoplea hispidula* Pers. R. 378. (F. 1860).  
*Bispora monilioides* Rab. 380. (Dit. 1806).  
*Phragmotrichum Bullaria* Corda. R. 387. (F. 1848).
154. Tubercularii. 30. *Fusidium griseum* Lk. R. 397. (Dit. 1809; und 1812 t. 17).  
*F. flavo-virens* Ditm. 1812, 18. R. 398.  
*F. aureum* Lk. 1809. R. 404.  
*F. candidum* Lk. 1809. R. 405.  
*Septoria populi* Desmaz. Rab. Herb. 1958. (F. 1860).  
*Melanconium sphaerospermum* Pers. sp. R. 421. (Sch. 1806).  
*M. glomeratum* Lk. 1809 (atrum). R. 438.  
*Stilbospora angustata* Pers. R. 461. (F. 1860).  
*Sporocadus Fiedleri* Rab. Herb. 882. (F. 1860).  
*Myrothecium inundatum* Tode 1790. R. 486. Dit. t. 3.
40. *M. Verrucaria* A. S., R. 487. (Ditm. 1812, 4.).  
*M. roridum* Tode 1790. R. 488.  
*Fusarium roseum* Lk. 1809. R. 498.  
*F. lateritium* Nees. R. 504. (F. 1860).  
*F. Stilbaster* Lk. R. 505. (Dit. 1809, ap. Lk.).  
*F. Betae* Rab. Fungi europ. No. 69. (F. 1860).  
*Dacryomyces Urticae* Pers. sp. R. 517. (Sch. 1806).  
*D. lacrymalis* Pers. sp. R. 519. (Ditm. 1806).  
*Tubercularia vulgaris* Tode 1790. R. 527. (T. 1788).  
*T. confluens* Pers. (F. 1858).

150. *Tubercularia granulata* Pers. (F. 1858).  
*T. ciliata* Ditm. 1812, 14. R. 538.  
*T. persicina* Ditm. 1812, 49. R. 539.  
*Dermatea carpineae* Fr. (Tode 1790).  
*Ditiola paradoxa* Hedw. sp. R. 550. (F. 1858).  
*D. radicata* Fr. (F. 1858).  
*D. volvata* Tode sp. 1790. R. 551.  
*D. sulcata* Tode sp. 1790. R. 552.  
*Epicoccum versicolor* R. 562. (Lk. 1813).  
    *α. nigrum* Lk.  
    *β. purpurascens* Ehrb. (Fiedl.).

**Ordo 2. *Hyphomycetes* (Schimmelpilze).**

- Hypha papyracea* Pers. sp. R. 578. (Sch. 1806). <sup>155. Byssa-</sup>  
60. *Xylostroma corium* R. 580. (Tode 1790). <sup>cei.</sup>  
*Ozonium auricomum* Lk. 1809. R. 581.  
*O. candidum* Huds. sp. R. 581. (Sch. 1806).  
*Dematium nigrum* Lk. 1809. R. 601.  
*Rhizomorpha subcorticalis* Pers. R. 611. (Sch. 1806).  
*R. subterranea* Pers. R. 612. (Sch. 1806).  
*Taphrina populina* Schum. sp. R. 618. (Sch. 1806).  
*Erineum roseum* Schultz 1806. R. 621.  
*E. betulinum* Schum. R. 622. (Lk. 1809).  
*E. populinum* Pers. R. 625. (Sch. 1806).  
70. *E. alneum* Pers. R. 626. (Sch. 1806).  
*E. fagineum* Pers. R. 627. (Sch. 1806).  
*E. purpurascens* Gärtn. R. 631. (Lk. 1809).  
*Phyllerium tiliaceum* Pers. R. 633. (Sch. 1806).  
*Ph. pyrinum* Pers. sp. R. 638. (Sch. 1806).  
*Ph. acerinum* Pers. sp. R. 639. (Sch. 1806).  
*Epochnium monilioides* Lk. 1809. R. 656. <sup>156. Muce-</sup>  
*Collarium nigrospermum* Lk. R. 663. (Siems. ap. <sup>dinci.</sup>  
    Lk. 1809).  
*Mycogone rosea* Lk. 1809. R. 665.  
*M. cervina* Ditm. 1812, 53. R. 666.

180. *Sepedonium mycophilum* Lk. 1809. R. 667.  
*Chloridium viride* Lk. R. 693. (Ditm. ap. Lk. 1809).  
*Geotrichum candidum* Lk. 1809. R. 720.  
*Sporotrichum laxum* N. E. R. 726. (F. 1860).  
*Sp. candidum* Lk. 1809. R. 727.  
*Sp. Fiedleri* Rab. Herb. N. 1573. (F. 1860).  
*Sp. densum* Lk. R. 735. (Ditm. ap. Lk. 1809).  
*Sp. griseum* Lk. 1809. R. 746.  
*Sp. luteo-album* Lk. 1809. R. 749.  
*Sp. vitellinum* Lk. R. 752. (Siems. 1808).
90. *Sp. aureum* Lk. 1809. R. 754.  
*Sp. croceum* Pers. Lk. sp. R. 756. (Sch. 1806).  
*Sp. roseum* Lk. 1813. R. 757.  
*Sp. fuscum* R. 766. (Lk. 1809).  
*Sp. virescens* Lk. R. 770. (*Medusula labyr.*  
*Tode* 1790).  
*Sp. olivaceum* Pers. sp. R. 772. (Lk. 1809).  
*Byssocladium fenestrata* Roth sp. R. 777. (Ditm.  
 sp. 1812. t. 1).  
*Fusisporium aurantiacum* Lk. 1809. R. 778.  
*F. Solani* Mast. R. p. 579. (Boll 1860).  
*Acremonium verticillatum* Lk. 1809. R. 796.
200. *A. alternatum* Lk. R. 797. (Ditm. 1809. ap.  
 Sturm 1812 t. 2).  
*Trichothecium roseum* Lk. 1809. R. 808.  
*Oidium Fusisporioides* Fr. R. 822. (F. 1860).  
*O. Aceris* Rab. Herb. 1892. (F. 1860).  
*O. Lamii* R. l. c. 1777. (F. 1860).  
*Peronospora Rumicis* Corda. R. 830. (F. 1860).  
*P. Umbelliferarum* Rab. Herb. ed. 2. 169. (F. 1860).  
*Stachylidium terrestre* Lk. 1809. R. 832.  
*St. bicolor* Lk. 1809. R. 833.  
*Monilia digitata* Pers. R. 841. (T. 1788).
10. *Penicillium glaucum* Lk. R. 844 (T. 1788).  
*P. candidum* Lk. 1809. R. 845.



212. *Coremium vulgare* Corda. R. 863. (Lk. 1809).  
*Aspergillus glaucus* L. sp. R. 866. (T. 1788).  
*A. virens* Lk. 1809 R. 868.  
*A. candidus* Lk. 1809. R. 871.  
*A. flavus* Lk. 1809. R. 874.  
*Dactylium nigrum* Lk. sp. R. 878. (Ditm. 1809).  
*D. macrosporum* Ditm. sp. 1809 und 1812, 50.  
 R. 884.  
*D. dendroides* Fr. R. 886. (Ditm. 1812 t. 51).
20. *Botrytis grisea* Lk. 1809. R. 889.  
*B. vulgaris* Lk. 1809. R. 895.  
*B. umbellata* Pers. sp. R. 905. (Lk. ap. Fries 1832).  
*B. parasitica* Pers. R. 907. (Lk. 1809).  
*B. elegans* Lk. 1809. R. 909.  
*B. densa* Ditm. 1812, 52. R. 910.  
*B. nigra* Lk. R. 913. (Ditm. 1809).  
*B. polyspora* Lk. 1809. Ditm. 1812, 35. R. 914.  
*B. bruneola* Rab. ed. 2, 771. (F. 1860).  
*Acrostalagmus cinnabarinus* Corda R 916. (F. 1860).
30. *Verticillium allochromum* Lk. sp. R. 922. (Ditm. 1809).  
*Haplotrichum capitatum* Lk. 1809. R. 932.  
*Acladium conspersum* Lk. 1809. R. 936.  
*A. microspermum* Lk. 1809. R. 937.  
*Gonosporium puccinoides* Lk. R. 950. (F. 1860).  
*Arthrimum caricicola* Kze. R. 951. (F. 1860).  
*Rhacodium cellare* Pers. R. 959. (Lk. 1809).  
*Myxotrichum murinum* Ditm. sp. 1812, 36. R. 964.  
*Helminthosporium velutinum* Lk. 1809. R. 982.  
*H. arundinaceum* Corda. R. 995. (F. 1860).
40. *Cladosporium herbarum* Lk. R. 1028. (Sch. 1806).  
*C. epiphyllum* Pers. sp. R. 1033. (Sch. 1806).  
*C. fasciculare* Fr. R. 1037. (Sch. 1806).  
*C. nodulosum* Corda. R. 1046. (F. 1860).  
*Cephalotrichum rigescens* Lk. R. 1065. (Ditm. 1809).  
*Periconia Stemonitis* Pers. R. 1071 (Dit. 1806).

246. *Stilbum vulgare* Tode 1790. R. 1093. Dit. t. 58.  
*St. bulbosum* Tode 1790. R. 1094.  
*St. turbinatum* Tode 1790. R. 1097.  
*St. luteum* Pers. R. 1098. (Tode 1790).
50. *St. xanthocephalum* Ditm. 1812, 60. R. 1105.  
 (Tode 1790).  
*St. erythrocephalum* Ditm. 1812, 45. R. 1106.  
*St. rigidum* Pers. (Ditm. 1812 t. 59.). R. 1107.  
*St. pubidum* Tode 1790. R. 1109.  
*St. tomentosum* Schrad. R. 1111. (Ditm. 1812, 46).  
*St. rubicundum* Tode 1790. R. 1120.  
*St. herbarum* Rab. ed. 2, 763. (F. 1860).  
*Ceratium hydnoides* Alb. Schw. R. 1136. (Lk. 1809).  
*Epichysium argenteum* Tode 1791. R. 1142.  
*Isaria farinosa* Dicks. sp. R. 1155. (Dit. 1812, 54).
60. *I. arachnophila* Ditm. 1812, 55. R. 1156.  
*I. sphaecophila* Ditm. 1812, 57. R. 1159.  
*I. citrina* Pers. R. 1161. (Ditm. 1812, 37).  
*I. clavata* Ditm. 1812, 56. R. 1165.  
*I. glauca* Ditm. 1812, 19. R. 1166.  
*I. sulphurea* Fiedler 1860. Rab. Fung. europ. 60.  
*Sporodinia grandis* Lk. R. 1174. (Ditm. 1809).  
*Ascophora Mucedo* Tode 1790. R. 1177.  
*A. elegans* Lk. sp. R. 1183. (Ditm. 1809).  
*Mucor Mucedo* L. R. 1188. (Sch. 1806).
70. *M. caninus* Pers. R. 1189. (Sch. 1806).  
*M. minimus* Tode sp. 1791. R. 1198.  
*M. tenellus* Tode sp. 1791. R. 1199.  
*M. stercoreus* Tode sp. 1791. R. 1200.  
*M. fimetarius* Lk. 1809. R. 1204.  
*M. Juglandis* Lk. 1809. R. 1207.  
*M. flavidus* Pers. R. 1210. (Ditm. 1806).  
*Eurotium herbariorum* Wig. sp. R. 1214. (Sch. 1806).  
*Syzygites megalocarpus* Ehrb. R. 1220. (Sch. 1806).

279. *Chordostylum capillare* Tode 1790. R. 1228.  
 80. *Pilobolus crystallinus* Tode 1790. R. 1229.

**Ordo 3. Dermatomyces.**

- Depazea juglandina* Fr. R. 1240. (F. 1860).  
*D. Ribicola* Fr. R. 1244. (F. 1860).  
*D. Linnaeae* Ditm. R. 1249. (v. Kptz. 1806).  
*D. Brassicaecola* Fr. R. 1255. (F. 1860).  
*D. Calthaecola* DC. R. 1261. (F. 1860).  
*D. vagans* Fr. R. 1265. (F. 1860).  
*D. Lysimachiae* Lsch. R. Herb. N. 989. (F. 1860).  
*D. Aquilegiae* R. l. c. N. 1651. (F. 1860).  
*D. Saponariae* DC. R. l. c. N. 1653. (F. 1860).  
 90. *D. Petroselini* Fiedler 1860.  
*Leptostroma scirpinum* Fr. R. 1273. (F. 1858).  
*L. Scirpi* Rab. 1274 (F. 1858).  
*L. caricinum* Fr. R. 1275. (F. 1858).  
*L. juncinum* Fr. R. 1276. (F. 1858).  
*L. filicinum* Fr. R. 1277 (F. 1858).  
*L. Spiraeae* Fr. R. 1278 (F. 1858).  
*L. areolatum* Lk. R. 1281. (Wust. 1858).  
*L. herbarum* Fr. R. 1282. (F. 1858).  
*L. hysterioides* Fr. R. 1285 (F. 1858).  
 300. *L. Sedi* Lk. R. 1290. (Wust. 1858).  
*L. Loniceraecola* Rab. (F. 1858).  
*L. Phragmitis* Fr. (F. 1858).  
*Actinothyrium graminis* Kze. R. 1291. (F. 1860).  
*Labrella Ptarmicis* Desmz. R. Herb. 1394. (F. 1860).  
*Phoma saligna* Pers. sp. R. 1296. (Sch. 1806).  
*P. Pustula* Pers. sp. R. 1297. (Sch. 1806).  
*Ascochyta Heraclei* Lib. R. 1318. (F. 1860).  
*Nemaspora aurea* Fr. R. ed. 2. 584. (F. 1860).  
*Cytispora leucomyxa* R. Herb. 1352. (F. 1860).  
 10. *C. rubescens* Fr. R. 1346. (F. 1860).  
*Sphaeronema subulatum* Tode sp. 1791. R. 1349.

158. Sphaeriaci.

312. *Sphaeronema aciculare* Fr. R. 1351. (Tode 1791).  
*Sph. Acrospermum* Tode sp. 1791. R. 1353.  
*Sph. conicum* Tode sp. 1791. R. 1356.  
*Sph. cylindricum* Tode sp. 1791. R. 1357.  
*Sph. parabolicum* Tode sp. 1791. R. 1358.  
*Sph. Uredineorum* Fiedler 1860. R. Herb. 1659.  
*Sph. Piceae* Fiedl. 1860. R. l. c. 664.  
*Excipula strigosa* Lib. sp. R. 1379. (F. 1860).
20. *Hysterium pulicare* Pers. R. 1393. (Sch. 1806).  
*H. contortum* Ditm. 1812, 32. R. 1396.  
*H. elongatum* Wahlb. R. 1397. (F. 1858).  
*H. angustatum* Pers. R. 1402. (Sch. 1806).  
*H. lineare* Fr. R. 1403 (Wüst. 1858).  
*H. degenerans* Fr. R. 1408. (F. 1858).  
*H. Fraxini* Pers. R. 1409. (F. 1858).  
*H. conigenum* MN. R. 1410. (F. 1858).  
 Ann. *H. quercinum* Pers. cf. No. 650.  
*H. Rubi* Pers. R. 1415. (F. 1858).  
*H. Pinastris* Schr. R. 1417. (Sch. 1806).
30. *H. apiculatum* Fr. R. 1428 (F. 1858).  
*H. herbarum* Fr. R. 1430. (F. 1858).  
*H. commune* Fr. R. 1431. (F. 1858).  
*H. scirpinum* Fr. R. 1432. (F. 1858).  
*H. arundinaceum* Schr. R. 1433. (F. 1858).  
*H. culmigenum* Fr. R. 1434. (F. 1858).  
*H. Taxi* Pers. (F. 1858) R. 1448?  
*Phacidium coronatum* Fr. Dit. t. 63. R. 1438 (T. 1788).  
*Ph. Rubi* Fr. 1440. (F. 1858).  
*Ph. dentatum* Schm. R. 1442 (F. 1806).
40. *Ph. Pini* Fr. R. 1450. (F. 1858).  
*Ph. carbonaceum* Fr. R. 1453. (F. 1858).  
*Ph. pulverulentum* Schm. R. 1455. (F. 1858).  
*Ph. Patella* Tode sp. 1791. R. 1457.  
*Ph. caliciiforme* Spr. R. 1459. (F. 1858).  
*Ph. pityum* Fr. R. 1461. (F. 1858).



346. *Phacidium Plinthis* Fr. (F. 1858).  
*Ph. Buxi* Lasch. (F. 1858).  
*Rhytisma Urticae* Fr. R. 1463. (Sch. 1806 No. 1017).  
*R. punctatum* Fr. R. 1465 (F. 1858).
50. *R. acerinum* Fr. R. 1466. (Sch. 1806).  
*R. confluens* Fr. (Wust. 1858).  
*R. salicinum* F. R. 1467 (F. 1858).  
*R. Andromedae* Fr. R. 1468 (Sch. 1806).  
*R. Euphorbiae* Schub. R. 1469 (F. 1858).  
*R. giganteum* Fr. R. 1470 (F. 1858).  
*R. umbonatum* Rab. 1471 (F. 1858).  
*Actidium hysterioides* Fr. R. 1472 (Sch. 1806).  
*Lophium mytilinum* Pers. sp. R. 1473 (Sch. 1806).  
*Stegilla Ilicis* R. 1478 (F. 1858).
60. *Dothidea Ribesia* Pers. sp. R. 1481 (Sch. 1806),  
*D. Sambuci* Pers. sp. R. 1482 (Sch. 1806).  
*Polystigma rubrum* Pers. sp. R. 1503. (Sch. 1806).  
*P. Ulmi* Schultz sp. No. 1190 (1806) R. 1506.  
*P. Pteridis* Reb. sp. R. 1507 (Thede 1806).  
*Pestalozzia phacidioides* Cesati. R. Herb. 724  
(F. 1860).  
*Sphaeria punctiformis* Pers. R. 1514 (Sch. 1806).  
*S. maculaeformis* Pers. R. 1515 (Sch. 1806).  
*S. alnea* Pers. sp. R. 1530 (Sch. 1806).  
*S. Grossulariae* Fr. R. 1531 (F. 1860).
70. *S. Artocreas* Tode 1791 R. 1534.  
*S. Eryngii* Fr. R. 1537 (F. 1860).  
*S. tubaeformis* Tode 1791 R. 1550.  
*S. Gnomon* Tode 1791 R. 1551.  
*S. setacea* Pers. R. 1558 (Sch. 1806).  
*S. Lingam* Tode 1791 R. 1561.  
*S. Doliolum* Pers. R. 1562. (Sch. 1806).  
*S. pulveracea* Ehr. = *mollis* Tode 1791 R. 1563.  
*S. sanguinea* Sibth. R. 1571. (Ditm. 1806).  
*S. herbarum* Pers. R. 1576 (Tode 1791).

380. *Sphaeria acuta* Hoffm. R. 1579. (F. 1851).  
*S. comata* Tode 1791. R. 1581.  
*S. pulvis pyrius* Pers. R. 1585 (Sch. 1806).  
*S. spermoides* Hoffm. R. 1588 (Tode 1793).  
*S. moriformis* Tode 1791 R. 1590.  
*S. mammaeformis* Pers. R. 1592 (Sch. 1806)  
*S. Bombarda* Batsch. R. 1593 (Sch. 1806).  
*S. mobilis* Tode 1791. R. 1599.  
*S. trichostoma* Wallr. R. 1614. (F. 1851).  
*S. orthoceras* Fr. R. 1619 (F. 1860).
90. *S. rubella* Pers. R. 1620 (Tode 1791).  
*S. foveolaris* Fr. R. 1632 (F. 1851).  
*S. inquinaus* Tode 1791 R. 1637.  
*S. Xylostei* Pers. R. 1639 (Sch. 1806).  
*S. ditopa* Fr. R. 1648 (F. 1851).  
*S. ocellata* Fr. R. 1651 (F. 1851).  
*S. pileata* Tode 1791 R. 1660.  
*S. macrostoma* Tode 1791 R. 1663.  
*S. Arundinis* Fr. R. 1667 (F. 1851).  
*S. rostellata* Fr. R. 1678 (F. 1851).
400. *S. stricta* Pers. R. 1683 (Ditm. 1806).  
*S. rostrata* Tode 1791 R. 1684.  
*S. dryina* Pers. R. 1686 (F. 1851).  
*S. lagenaria* Pers. R. 1689 (F. 1851).  
*S. Trifolii* Pers. R. 1694 (Sch. 1806).  
*S. Podagrariae* Roth. R. 1695 (F. 1851).  
*S. Aegopodii* Schultz! 1806. R. p. 580.  
*S. Asteroma* Wallr. R. 1704 (F. 1851).  
*S. Anemones* DC. sp. R. 1705 (F. 1851).  
*S. frondicola* Fr. R. 1706 (Sch. 1806).
10. *S. fimbriata* Pers. R. 1707 (T. 1788).  
*S. Evonymi* Kze. R. 1709 (F. 1851).  
*S. Graminis* Pers. R. 1711 (Sch. 1806).  
*S. episphaerica* Tode 1691. R. 1714.  
*S. Peziza* Tode 1791. R. 1715.

415. *Sphaeria lecanodes* Cesati. R. ed. 2. 525 (F. 1860).  
*S. Anethi* Pers. R. 1724 (F. 1851).  
*S. nebulosa* Pers. R. 1725 (Sch. 1806).  
*S. longissima* Pers. R. 1726. (F. 1851).  
*S. rudis* Fr. R. 1741 (F. 1851).
20. *S. exigua* Fiedler 1860 R. Herb. 970.  
 Num. „*S. exili* A. S. *simillima*, sed differt perithecio globoso, ascis clavatis, sporis ellipticis. — Ad ligna pinea.“ Fiedler.
- S. calva* Tode 1791. R. 1747.  
*S. pilosa* Pers. R. 1750 (Ditm. 1806).  
*S. hispida* Tode 1791. R. 1752.  
*S. mutabilis* Pers. R. 1765 (Ditm. 1812, 64).  
*S. mucida* Fr. R. 1767 (Tode 1791).  
*S. ovina* Pers. R. 1768 (Tode 1791).  
*S. tristis* Tode 1791. R. 1776.  
*S. byssiseda* Tode 1791. R. 1778.  
*S. Aquila* Fr. R. 1779. (Tode 1791).
30. *S. fissa* Pers. (= *Myrothecium dubium* Tode 1790)  
 R. 1791.  
*S. Spartii* NE. R. 1792 (F. 1851).  
*S. Dulcamarae* Schm. R. 1796 (F. 1851).  
*S. Dothidea* Moug. R. 1799 (F. 1851).  
*S. Berberidis* Pers. R. 1807 (F. 1851).  
*S. Cucurbitula* Tode 1791. R. 1810.  
*S. Laburni* Pers. R. 1816 (F. 1851).  
*S. Coluteae* Rab. Herb. 1239 (F. 1860).  
*S. Pteleae* Rab. Herb. 1238 (F. 1860).  
*S. Ribis* Tode 1791 R. 1818.
40. *S. coccinea* Pers. R. 1819 (Tode 1791).  
*S. cinnabarina* Tode 1791. R. 1823.  
*S. convergens* Tode 1791. R. 1825.  
*S. quaternata* Pers. R. 1830 (Sch. 1806).  
*S. pulchella* Pers. R. 1840 (Sch. 1806).  
*Sphaeria stilbostoma* Fr. R. 1845. (Tode 1791).

446. *S. ambiens* Pers. R. 1846 (Tode 1791).  
*S. salicina* Pers. R. 1848 (Tode 1791).  
*S. deplanata* NE. R. 1849 (F. 1860).  
*S. turgida* Pers. R. 1851 (Sch. 1806).
50. *S. tessellata* Pers. R. 1860 (Thede 1806).  
*S. leucostoma* Pers. R. 1874 (Tode 1791).  
*S. nivea* Hoffm. R. 1875 (Tode 1791).  
*S. Carpini* Pers. R. 1877 (Sch. 1806).  
*S. Hystrix* Tode 1791 R. 1886.  
*S. ceratosperma* Tode 1791. R. 1887.  
*S. ferruginea* Pers. R. 1888 (F. 1851).  
*S. lata* Pers. R. 1897 (Tode 1791).  
*S. spinosa* Pers. R. 1900. (F. 1851).  
*S. insitiva* Tode 1791. R. 1903.
60. *S. quercina* Pers. R. 1906 (Sch. 1806).  
*S. scabrosa* DC. R. 1909. (Ditm. 1808).  
*S. uda* Pers. R. 1910 (Ditm. 1806).  
*S. flavovirens* Pers. R. 1911 (Sch. 1806).  
*S. disciformis* Hoffm. R. 1915 (Sch. 1806).  
*S. Stigma* Hoffm. R. 1917 (Sch. 1806).  
*S. bullata* Ehr. R. 1919 (Tode 1791).  
*S. lenta* Tode 1791. R. 1920.  
*S. succenturiata* Tode 1791. R. 1923.  
*S. nummularia* DC. R. 1924 (Tode 1791).
70. *S. deusta* Hoffm. R. 1927 (Tode 1791).  
*S. incrustans* Pers. R. 1928 (Sch. 1806).  
*S. confluens* Tode 1791. R. 1930.  
*S. rubiginosa* Pers.? Tode 1791. R. 1934.  
*S. rosea* Pers. R. 1939 (Ditm. 1808).  
*S. gelatinosa* Tode 1791. R. 1944.  
*S. multiformis* Fr. R. 1946. (F. 1851).  
*S. cohaerens* Pers. R. 1948 (Sch. 1806).  
*S. fusca* Pers. R. 1949 (Sch. 1806).  
*S. fragiformis* Pers. R. 1952 (Tode 1791).
480. *S. concentrica* Bolt. R. 1953 (T. 1788).



481. *Sphaeria Delphinii* Rab. Herb. 747 (F. 1860).  
*S. Carduorum* Wallr. R. l. c. 1560 (F. 1860).  
*S. Racodium* Pers. R. l. c. ed. 2. 649 (F. 1860).  
*Hypoxylon vulgare* Lk. R. 1954 (Sch. 1806).  
*H. polymorphum* Pers. sp. R. 1956. (Sch. 1806).  
*H. carpophilum* Pers. sp. R. 1958 (Sch. 1806).  
*Poronia punctata* L. sp. R. 1961 (T. 1788).  
*Cordyceps ophioglossoides* Ehr. sp. R. 1965  
 (Sch. 1806).  
*Illosporium roseum* Fr. R. 1967 (Sch. 1806).
90. *Perisporium populinum* Pers. sp. R. 1992 (Sch. 1806).  
*Erysibe macularis* Schl. R. 2011. (T. 1788).  
*E. holosericea* Lk. R. 2014. (F. 1860).  
*E. lamprocarpa* Lk. R. 2016 (F. 1860).  
*E. communis* Lk. R. 2019 (F. 1851).  
*E. lenticularis* Wallr. sp. R. 2020 (F. 1860).  
*E. guttata* Lk. R. 2021 (Sch. 1806).  
*E. horridula* Wallr. sp. R. 2025 (F. 1860).  
*E. adunca* Wallr. sp. R. 2026 (F. 1860).  
*E. penicillata* Wallr. sp. R. 2027 (F. 1860).
500. *E. tridactyla* Wallr. R. 2030 (F. 1860).  
*Antennataria cellaris* Fr. R. 2034 (Sch. 1806).  
*Sclerotium Clavus* DC. R. 2037 (F. 1851).  
*S. Pustula* DC. R. 2039 (Sch. 1806).  
*S. immersum* Tode 1790 R. 2058.  
*S. muscorum* Pers. R. 2065 (Tode 1790).  
*S. truncorum* Fr. R. 2066 (Tode 1790).  
*S. fungorum* Pers. R. 2067 (Sch. 1806).  
*S. Semen* Tode 1790 R. 2077.  
*S. complanatum* Tode 1790. R. 2080.
10. *S. aurantiaco-fuscum* Rab. Herb. 936 (F. 1860).  
*S. populinum* Pers. R. l. c. ed. 2. 494. (F. 1860).  
*S. calathiforme* Lk. 1813 p. 45.

159. Lycoperdacei.

Num. „Flavicans, durum, hinc convexum, inde excavatum. In superficie terrae tanta copia et tam subito

saepe provenit in Ducatu Megapolitano, ut crediderint semina e coelo delapsa. Interior compages vesiculosa seminum contextum vesiculosum non malo refert. Aestate praesertim pluviosa provenit.“

513. *Acrospermum*: pyramidale Tode 1790. R. 2084.  
*A. compressum* Tode 1790. R. 2088.  
*A. graminum* Lib. R. 2090 (F. 1860).  
*Anixia glabra* Fr. R. 2091 (Tode 1790).  
*Endogone pisiforme* Lk. 1809. R. 2094.  
*Tuber cibarium* Sib.? R. 2103 (Boll 1860: foff auf dem Sonnenberge bei Parchim gefunden sein).  
*Spumaria alba* DC. R. 2131 (Sch. 1806).
20. *Aethalium septicum* L. sp. R. 2133 (T. 1788).  
*Reticularia maxima* Fr. R. 2135 (Lk. 1809).  
*R. umbrina* Fr. R. 2137 (Ditm. 1808 u. 1817, 38).  
*R. muscorum* AS. sp. R. 2140 (Ditm. 1809).  
*Lycogala epidendron* Buxb. sp. R. 2145. (T. 1788).  
*Arcyria ochroleuca* Trentep. sp. R. 2149 (Ditm. 1817, 8).  
*A. nutans* Bull. sp. R. 2151 (Sch. 1806).  
*A. cinerea* Pers. R. 2153 (Sch. 1806).  
*A. incarnata* Pers. R. 2157 Ditm. t. 44. (Sch. 1806).  
*A. punicea* Pers. R. 2159 (T. 1788).
30. *Trichia varia* Pers. R. 2162 (Sch. 1806).  
*T. circumscissa* Wallr. R. 2163 (F. 1860).  
*T. chryso sperma* Bull. R. 2164 (T. 1788).  
*T. clavata* Pers. R. 2168 Ditm. t. 25. (Sch. 1806).  
*T. fallax* Pers. R. 2169 (Ditm. 1806).  
*T. pyriformis* Hoff. R. 2172 (Ditm. 1806).  
*T. rubiformis* Pers. R. 2173 (T. 1788).  
*Perichaena strobilina* AS. sp. R. 2176. (Ditm. 1817, 20).  
*Licea contorta* Ditm. sp. 1817, 5. R. 2189.  
*L. variabilis* Schr. R. 2192 (Thede 1806).
40. *Tubulina cylindrica* DC. R. 2193 (Sch. 1806).

541. *Dictydium umbilicatum* Schr. R. 2205 (Sch. 1806).  
*D. trichioides* Bull. sp. R. 2207 (Sch. 1806).  
*Stemonitis fusca* Roth. R. 2211 (T. 1788).  
*St. typhoides* Bull. sp. R. 2213 (Sch. 1806).  
*St. ovata* Pers. R. 2216 (T. 1788).  
*Diachea elegans* Trent. sp. R. 2223 (Dit. 1806).  
*Cupularia leucocephala* Pers. sp. R. 2224 (Ditm. 1817, 11.).  
*Craterium pedunculatum* Trent. R. 2227 Dit. t. 9. (Lk. 1809).  
*C. pyriforme* Ditm. 1817, 10. R. 2228.
50. *Physarum album* Fr. R. 2234 (F. 1860).  
*Ph. sinuosum* Bull. sp. R. 2237 (Ditm. 1808).  
*Ph. conglobatum* Ditm. 1817, 40. R. 2240.  
*Ph. virescens* Ditm. 1817, 61. R. 2241.  
*Ph. bullatum* Ditm. 1817, 22. R. 2257.  
*Ph. psittacinum* Ditm. 1817, 62. R. 2258.  
*Ph. alatum* Trentepohl 1800? R. 2262.  
*Ph. sulcatum* Lk. 1809. R. 2263.  
*Ph. aureum* Pers. R. 2267. (Ditm. 1817, 23).  
*Ph. nutans* Pers. R. 2268. Ditm. t. 24 n. 41 (Lk. 1809).
60. *Cionium farinaceum* Lk. 1809. R. 2269.  
*C. xanthopus* Dit. 1817, 43. R. 2270.  
*C. Iridis* Lk. 1809. R. 2271. Dit. t. 7.  
*Didymium cinereum* Pers. sp. R. 2273 (Sch. 1806).  
*D. rufipes* Fr. R. 2281 (Sch. 1806).  
*D. farinaceum* Pers. sp. R. 2287 (Sch. 1806).  
*D. nigripes* Lk. sp. 1809. R. 2288. Dit. t. 42.  
*D. leucopus* Lk. sp. 1809. R. 2291.  
*Diderma muscicola* Lk. 1809. R. 2292.  
*D. contextum* Pers. R. 2294 (Dit. 1817, 39).
70. *D. ochraceum* Hoffm. R. 2295 (Sch. 1806).  
*D. globosum* Pers. R. 2305 (Ditm. 1817, 6).  
*Leocarpus vernicosus* Pers. sp. R. 2312 (Sch. 1806).  
*L. spermoides* Lk. 1809. R. 2313.

574. *Leocarpus calcareus* Lk. R. 2314 (Dit. 1809).  
*L. cyanescens* Fr. R. Herb. 992 (F. 1860).  
*Leangium floriforme* Pers. sp. R. 2315 (Lk. 1809).  
*L. stellare* Pers. sp. R. 2316 (Dit. 1806).  
*L. lepidotum* Ditm. 1817, 21. R. 2318.  
*Aegerita candida* Pers. R. 2321 (Lk. 1809).
80. *Trichoderma viridis* Pers. R. 2328 (Tode 1790).  
*T. dubium* AS. R. 2330 (Tode 1790).  
*Hyphelia terrestris* Fr. R. 2332 (F. 1860).  
*Onygena equina* Pers. R. 2338 (Sch. 1806).  
*O. corvina* AS. R. 2339 (Dit. 1817, 12).  
*Asterophora agaricoides* Fr. R. 2341 (Dit. 1817, 26).  
*Elaphomyces granulatus* NE. R. 2346 (T. 1788).  
*Scleroderma vulgare* Fr. R. 2370. (Sch. 1806).  
*Tulostoma mammosum* Fr. R. 2376 (Lk. 1795).  
*T. fimbriatum* Fr. R. 2378. (Sch. 1806).
90. *Lycoperdon pyriforme* Schäf. R. 2381 (Sch. 1806).  
*L. gemmatum* Batsch. R. 2382 (T. 1788).  
*L. Bovista* L. R. 2385 (Sch. 1806).  
*Bovista plumbea* Pers. R. 2388 (Lk. 1809).  
*B. nigrescens* Pers. R. 2390 (Sch. 1806).  
*Geaster rufescens* Pers. sp. R. 2393 (Sch. 1806).  
*G. fimbriatus* Batsch sp. R. 2396 (Lk. 1795).  
*G. striatus* Fr. R. 2398 (Lk. 1832? pr. Rostock).  
*Sphaerobolus stellatus* Tode 1790. (R. 2400).  
*Thelebolus stercoreus* Tode 1790. R. 2403.
600. *Polyangium vitellinum* Lk. R. 2405 (Dit. 1809;  
 1817, 27).  
*Cyathus Crucibulum* Hoffm. R. 2411 (T. 1788).  
*C. Olla* Pers. R. 2412 (T. 1788).  
*C. striatus* W. R. 2413 (T. 1788).  
*Phallus impudicus* L. R. 2415 (Sch. 1806).  
*Ph. caninus* Huds. R. 2416 (Tode 1792 semel  
 tantum lectum!)  
*Pyrenium terrestre* Tode 1790. R. 2427.



607. *Tremella sarcoides* With. R. 2435 (Tode 1790).  
*Exidia repanda* Fr. R. 2446 (F. 1855).  
*E. glandulosa* Fr. R. 2449 (T. 1788).
10. *E. recisa* Fr. R. 2451 (Dit. 1808 u. 1817 t. 13).  
*E. Auricula Judae* Fr. R. 2452 (Sch. 1806).  
*Cyphella muscigena* Fr. R. 2457 (F. 1855).  
*Helotium glabrum* Tode 1790. R. 2461.  
*H. hirsutum* Tode 1790. R. 2462.  
*Pistillaria pusilla* Fr. R. 2464 (F. 1855).  
*P. ovata* Fr. R. 2466 (F. 1855).  
*P. quisquilinaris* Fr. R. 2467 (F. 1855).  
*P. culmigena* Fr. R. 2468 (F. 1855).  
*P. coccinea* Fr. R. 2469 (F. 1855).
20. *P. micans* Fr. R. 2470 (F. 1855).  
*Typhula Todei* Fr. R. 2472 (Tode 1790).  
*Calocera cornea* Fr. R. 2483 (T. 1788).  
*C. viscosa* Fr. R. 2485 (Boll 1845!).  
*Clavaria contorta* Holms. R. 2494 (F. 1855).  
*C. Lingula* Schaeff. R. 2495 (Lk. 1795).  
*C. pistillaris* L. R. 2496 (T. 1788).  
*C. fragilis* Holms. R. 2501 (F. 1855).  
*C. inaequalis* Mull. R. 2504 (F. 1855).  
*C. formosa* Pers. R. 2522 (Ditm. 1806).
30. *C. rugosa* Bull. R. 2531 (Ditm. 1809).  
*C. cristata* Pers. R. 2532 (F. 1855).  
*C. coralloides* L. R. 2534 (T. 1788).  
*C. muscoides* L. R. 2536 (T. 1788).  
*C. fastigiata* L. R. 2537 (T. 1788).  
*C. amethystina* Bull. R. 2538 (F. 1855).  
*C. flava* Pers. R. 2540 (Lk. 1795).  
*Geoglossum carneum* Schultz 1806. R. 2541.  
*G. hirsutum* Pers. R. 2544 (Sch. 1806).  
*G. viride* Pers. Ditm. t. 48. R. 2550 (Sch. 1806).
40. *Mittrula paludosa* Fr. R. 2552 (F. 1858).  
*M. cucullata* Fr. R. 2553 (Thede 1806).

162. Helvel-  
lacc.

642. *Spathulea flavida* Fr. R. 2554 (F. 1858).  
*Sparassis crispa* Fr. R. 2555 (Sch. 1806).  
*Stictis versicolor* Fr. R. 2557 (F. 1858).  
*St. radiata* Fr. R. 2567 (Tode 1790).  
*St. arundinacea* Pers. R. 2569 (F. 1858).  
*St. Lecanora* Fr. R. 2572 (F. 1858).  
*St. longa* Reb. 2574 (Sch. 1806).  
*St. Tiliae* Lasch (F. 1858).
50. *Cenangium ferruginosum* Fr. R. 2575 (F. 1858).  
*C. quercinum* Fr. R. 1411 (Tode 1791).  
*C. Urceolus* Fr. R. 2576 (F. 1858).  
*C. Aucupariae* Fr. R. 2580 (Tode 1791).  
*C. Prunastri* Fr. R. 2581 (F. 1858).  
*C. Ribis* Fr. R. 2583 (Sch. 1806).  
*C. Populi* Lasch (F. 1858).  
*Tympanis conspersa* Fr. R. 2585 (Tode 1791  
*Sphaeria fissivela*).  
*T. cupularis* Wallr. R. 2586 (Tode 1791).  
*T. saligna* Tode 1790. R. 2587.
60. *T. obtexta* Wallr. R. 2596 (F. 1860).  
*T. viticola* Schw. R. Herb. 139 (F. 1860).  
*Volutella volvata* Tode 1790 R. 2602.  
*Bulgaria sarcoides* Fr. R. 2604 (Sch. 1806).  
*B. inquinans* Fr. 2606 (T. 1788).  
*Ascobolus furfuraceus* Pers. R. 2619 (Ditm. 1806).  
*A. denudatus* Fr. R. 2620 (Tode 1790).  
*Lecanidion atrum* R. 2623 (F. 1858).  
*Peziza fimetaria* Fr. R. 2626. (F. 1858).  
*P. acicularis* Fr. R. 2628 (Ditm. 1806).
70. *P. aurea* Fr. R. 2629 (F. 1858).  
*P. epiblastematica* Wallr. R. 2632 (F. 1858).  
*P. Artemisiae* Lasch. R. 2636 (F. 1858).  
*P. atrata* Pers. R. 2651 (F. 1858).  
*P. Pteridis* Alb. Schw. R. 2662 (Thede 1806).  
*P. lacustris* Fr. R. 2663 (F. 1858).

676. *Peziza cinerea* Batsch. R. 2664 (F. 1858).  
*P. uda* Pers. 2665 (Ditm. 1806).  
*P. chrysocoma* Bull. R. 2671 (F. 1858).  
*P. Ulmariae* Lasch (F. 1858).
80. *P. epiphylla* Pers. R. 2677 (F. 1858).  
*P. faginea* Pers. R. 2678 (F. 1858).  
*P. Humuli* Lasch (F. 1858).  
*P. herbarum* Pers. R. 2679 (F. 1858).  
*P. salicella* Fr. R. 2686 (F. 1858).  
*P. lenticularis* Bull. R. 2688 (Sch. 1806).  
*P. chionea* Fr. R. 2690 (F. 1858).  
*P. citrina* Batsch. R. 2692 (T. 1788).  
*P. aeruginosa* Pers. R. 2694 (Ditm. 1806).  
*P. Calyculus* Sow. R. 2697 (T. 1788).
90. *P. Volutella* Fr. R. 2701 (Tode 1790).  
*P. cyathoidea* Bull. R. 2705 (F. 1858).  
*P. Capula* Act. Hafn. R. 2706 (F. 1858).  
*P. striata* Nees. R. 2708 (F. 1858).  
*P. Personii* Moug. R. 2715 (F. 1858).  
*P. coronata* Bull. R. 2718 (F. 1858).  
*P. fructigena* Bull. R. 2721 (F. 1858).  
*P. Lonicerae* Alb. Schw. R. 2724 (F. 1858).  
*P. Pinicola* Reb. R. 2732 (W. 1858).  
*P. sanguinea* Pers. R. 2741 (Schultz 1806 N. 1500).
700. *P. Kneiffii* Wallr. R. 2744 (F. 1858).  
*P. caesia* Pers. R. 2746 (Ditm. 1817. 31).  
*P. fibrillosa* Wallr. R. 2747. (F. 1858).  
*P. poriaeformis* DC. R. 2749 (F. 1858).  
*P. anomala* Pers. R. 2750 (F. 1858).  
*P. punctiformis* Fr. R. 2753 (F. 1858).  
*P. Arundinis* Fr. R. 2754 (F. 1858).  
*P. sulphurea* Pers. R. 2757 (Sch. 1806).  
*P. aterrima* Lasch. R. 2763 (W. 1858).  
*P. pineti* Batsch. R. 2765 (W. 1858).
10. *P. flavo-fuliginea* Alb. Schw. R. 2768 (Ditm. 1809).

711. *Peziza rufo-olivacea* Alb. Schw. R. 2769 (W. 1858).  
*P. hispidula* Schr. R. 2773 (F. 1858).  
*P. flammea* Alb. Schw. R. 2774 (Wüst. 1858).  
*P. corticalis* Pers. R. 2775 (F. 1858).  
*P. sphaerocephala* Wallr. R. 2783 (F. 1858).  
*P. caulicola* Fr. R. 2784 (F. 1858).  
*P. clandestina* Bull. R. 2785 (F. 1858).  
*P. sericea* Alb. Schw. R. 2788 (Wüst. 1858).  
*P. cerina* Pers. R. 2789 (Wüst. 1858).
20. *P. bicolor* Bull. R. 2790 (F. 1858).  
*P. calycina* Schum. R. 2791 (Sch. 1806).  
*P. nivea* Fr. R. 2794 (Link 1795).  
*P. virginea* Batsch. R. 2796 (Sch. 1806).  
*P. ciliaris* Schr. R. 2797 (F. 1858).  
*P. stercorea* Pers. R. 2802 (Sch. 1806).  
*P. scutellata* L. R. 2805 (T. 1788).  
*P. umbrosa* L. R. 2807 (F. 1858).  
*P. hemisphaerica* Wig. R. 2815 (Tode 1790?).  
*P. fusco-atra* Reb. R. 2817 (Sch. 1806).
30. *P. coccinea* Jacq. R. 2821 (T. 1788).  
*P. leucoloma* Rehb. R. 2840 (Sch. 1806).  
*P. cupularis* L. R. 2855 (Link 1795).  
*P. tuberosa* Bull. R. 2863 (T. 1788).  
*P. macropus* Pers. R. 2866 (Sch. 1806).  
*P. vesiculosa* Bull. R. 2873 (T. 1788).  
*P. Marsupium* Pers. R. 2874 (A. Brück. 1858).  
*P. repanda* Wahl. R. 2876 (F. 1858).  
*P. cochleata* Huds. R. 2878 (Link 1795).  
*P. aurantia* Oed. R. 2879 (Sch. 1806).
40. *P. onotica* Pers. R. 2880 (Ditm. 1817 t. 16).  
*P. leporina* Batsch. R. 2881 (L. Sch. 1777).  
*P. abietina* Pers. R. 2883 (Ditm. 1808).  
*P. Acetabulum* L. R. 2889 (T. 1788).  
*Leotia lubrica* Pers. R. 2892 (Ditm. 1808).  
*Verpa conica* Sw. R. 2895 (T. 1788).



746. *Helvella esculenta* Pers. R. 2911 (F. 1858).  
*H. lacunosa* Afz. R. 2913 (L. Sch. 1777).  
*H. crispa* Fr. R. 2914 (A. Brück. 1858).  
*H. sulcata* Afz. (Lk. 1795).
50. *Morchella esculenta* Pers. R. 2915 (L. Sch. 1777).  
 Berzlj. S. 112.  
*Phlebia merismoides* Fr. R. 2932 (F. 1855). 163. Pileati.  
*Thelephora calcea* Pers. R. 2934 (Sch. 1806 N. 1499).  
*Th. comedens* Fr. R. 2938 (F. 1855).  
*Th. incarnata* Pers. R. 2945 (F. 1855).  
*Th. cinerea* Pers. R. 2946 (F. 1855).  
*Th. quercina* Pers. R. 2947 (Sch. 1806).  
*Th. cinnamomea* Pers. R. 2953 (F. 1855).  
*Th. sulphurea* Fr. R. 2954 (Sch. 1806).  
*Th. radiosa* Fr. R. 2959 (F. 1855).
60. *Th. lactea* Fr. R. 2960 (Sch. 1806).  
*Th. gigantea* Fr. R. 2961 (F. 1855).  
*Th. aurea* Schaef. (A. Brück. 1858).  
*Th. mesenterica* Pers. R. 2970 (T. 1788).  
*Th. Pini* Fr. R. 2976 (F. 1858).  
*Th. rugosa* Pers. R. 2978 (F. 1858).  
*Th. tabacina* Fr. R. 2984 (F. 1855).  
*Th. rubiginosa* Schr. R. 2985 (F. 1855).  
*Th. sanguinolenta* Alb. Schw. R. 2987 (F. 1855).  
*Th. spadicea* Pers. R. 2988 (F. 1855).
70. *Th. hirsuta* Willd. R. 2989 (Lk. 1795).  
*Th. purpurea* Schum. R. 2990 (Sch. 1806 N. 1498).  
*Th. ferruginea* Pers. R. 2995 (Sch. 1806).  
*Th. chalybaea* Pers. R. 2996 (F. 1855).  
*Th. domestica* Fr. R. 2997 (Sch. 1806).  
*Th. puteanea* Schum. R. 3001 (F. 1855).  
*Th. laciniata* Pers. R. 3007 (T. 1788).  
*Th. terrestris* Ehr. R. 3011 (F. 1855).  
*Th. caryophyllea* Pers. R. 3014 (F. 1855).  
*Th. radiata* Fl. D. R. 3016 (F. 1855).

780. *Craterellus cornucopioides* Fr. R. 3021 (T. 1788).  
*Grandinia crustosa* Fr. R. 3023 (F. 1855).  
*Radulum fagineum* Fr. R. 3028 (Sch. 1806).  
*R. quercinum* Fr. R. 3031 (Sch. 1806).  
*R. orbiculare* Fr. R. 3032 (F. 1855).  
*Jrpex fusco-violaceus* Fr. R. 3040 (F. 1858).  
*Hydnum mucidum* Pers. R. 3052 (F. 1855).  
*H. macrodon* Pers. R. 3055 (F. 1855).  
*H. cirrhatum* Pers. R. 3066 (Sch. 1806).  
*H. gelatinosum* L. R. 3067 (T. 1788).
90. *H. Erinaceus* Bull. R. 3068 (Dr. A. Brück. 1855).  
*H. coralloides* Scop. R. 3069 (G. Brück. 1855).  
*H. Auriscalpium* L. R. 3070 (T. 1788).  
*H. tomentosum* L. R. 3072 (F. 1855).  
*H. connatum* Schultz 1806. R. 3075.  
*H. ferrugineum* Fr. R. 3081 (F. 1855).  
*H. compactum* Pers. R. 3083 (F. 1855).  
*H. repandum* L. R. 3088 (T. 1788).  
*H. laevigatum* Sw. R. 3090 (Sch. 1806).  
*H. imbricatum* L. R. 3093 (T. 1788).
800. *Fistulina hepatica* Fr. R. 3094 (T. 1788).  
*Merulius lacrymans* Schum. R. 3099 (Tode 1790?)  
*M. serpens* Tode 1790? R. 3100.  
*M. Corium* Fr. R. 3105 (F. 1855).  
*M. tremellosus* Schr. R. 3106 (F. 1855).  
*Daedalea unicolor* Fr. R. 3108 (Sch. 1806).  
*D. quercina* Pers. R. 3109 (T. 1788).  
*Trametes gibbosa* Fr. R. 3110 (F. 1855).  
*Tr. suaveolens* Fr. R. 3113 (T. 1788). S. 126.  
*Polyporus reticulatus* NE. R. 3116 (F. 1855).
10. *P. vaporarius* Fr. R. 3118 (F. 1855).  
*P. Radula* Fr. R. 3119 (F. 1855).  
*P. sanguinolentus* Fr. R. 3120 (W. 1855).  
*P. obducens* Fr. R. 3125 (F. 1855).  
*P. mucidus* Fr. R. 3127 (W. 1855).

815. *Polyporus Medulla panis* Fr. R. 3128 (T. 1788).  
*P. micans* Fr. R. 3129 (F. 1855).  
*P. violaceus* Fr. R. 3130 (F. 1855).  
*P. rufus* Fr. R. 3132 (F. 1855).  
*P. contiguus* Fr. R. 3135 (Sch. 1806).
20. *P. abietinus* Fr. R. 3138 (T. 1788).  
*P. versicolor* Fr. R. 3140 (T. 1788).  
*P. velutinus* Fr. R. 3142 (W. 1855).  
*P. hirsutus* Fr. R. 3143 (Link 1795).  
*P. radiatus* Fr. R. 3149 (W. 1855).  
*P. marginatus* Fr. R. 3159 (Sch. 1806).  
*P. salicinus* Fr. R. 3162 (F. 1855).  
*P. conchatus* Fr. R. 3163 (F. 1855).  
*P. Ribis* Fr. R. 3164 (W. 1855).  
*P. fulvus* Fr. R. 3165 (Sch. 1806).
30. *P. ignarius* Fr. R. 3166 (T. 1788).  
*P. nigricans* Fr. R. 3167 (Siemerling 1858).  
*P. fomentarius* Fr. R. 3168 (T. 1788). ☉. 126.  
*P. applanatus* Fr. R. 3169 (F. 1855).  
*P. betulinus* Fr. R. 3171 (Sch. 1806).  
*P. hispidus* Fr. R. 3178 (F. 1855).  
*P. amorphus* Fr. R. 3179 (W. 1855).  
*P. adustus* Fr. R. 3182 (F. 1855).  
*P. fumosus* Fr. R. 3183 (F. 1855).  
*P. rutilans* Fr. R. 3184 (Sch. 1806).
40. *P. destructor* Fr. R. 3187 (F. 1855).  
*P. alligatus* Fr. R. 3196 (F. 1855).  
*P. sulphureus* Fr. R. 3198 (F. 1855).  
*P. giganteus* Fr. R. 3200 (Sch. 1806).  
*P. cristatus* Fr. R. 3203 (F. 1855).  
*P. frondosus* Fr. R. 3205 (F. 1855).  
*P. umbellatus* Fr. R. 3206 (Sch. 1806).  
*P. lucidus* Fr. R. 3207 (T. 1788).  
*P. varius* Fr. R. 3210 (T. 1788).  
*P. Michellii* Fr. R. 3215 (F. 1855).

850. *Polyporus squamosus* Fr. R. 3217 (T. 1788).  
*P. pictus* Fr. R. 3219 (Sch. 1806).  
*P. perennis* Fr. R. 3220 (T. 1788).  
*P. leptocephalus* Fr. R. 3223 (Sch. 1806).  
*P. brumalis* Fr. R. 3226 (F. 1855).  
*Boletus cyanescens* Bull. R. 3236. (F. 1855).  
*B. scaber* Bull. R. 3238. (Sch. 1806).  
*B. edulis* Bull. R. 3243. (G. Brück, 1849).  
*B. luridus* Schaef. R. 3246. (F. 1855).  
*B. pachypus* Fr. R. 3250. (F. 1855).
60. *B. subtomentosus* L. R. 3255. (Link 1795).  
*B. variegatus* Fr. R. 3257. (F. 1855).  
*B. piperatus* Bull. R. 3260. (Dit. 1806).  
*B. bovinus* L. R. 3264. (T. 1788).  
*B. luteus* L. R. 3267. (T. 1788).  
*Lenzites sepiaria* Fr. R. 3270. (Sch. 1806).  
*L. trabea* Fr. R. 3271. (W. 1855).  
*L. betulina* Fr. R. 3273 (F. 1855).  
*Schizophyllum commune* Fr. R. 3274 (T. 1788).  
*Cantharellus crispus* Fr. R. 3275 (Sch. 1806).
70. *C. lobatus* Fr. R. 3278 (F. 1855).  
*C. retirugus* Fr. R. 3279 (F. 1855).  
*C. muscigenus* Fr. R. 3283 (Sch. 1806).  
*C. cinereus* Fr. R. 3284 (Dr. A. Brück. 1858).  
*C. lutescens* Fr. R. 3286 (W. 1855).  
*C. tubaeformis* Bull. sp. R. 3287 (Ditm. 1806  
und 1817 t. 30).  
*C. umbonatus* Fr. R. 3289 (F. 1855).  
*C. aurantiacus* Fr. R. 3290 (Sch. 1806).  
*C. cibarius* Fr. R. 3291 (T. 1788).  
*Nyctalis asterophora* Fr. R. 3292 (Ditm. 1806).
80. *Russula alutacea* Pers. R. 3298 (F. 1855).  
*R. emetica* Fr. R. 3307 (T. 1788).  
*R. virescens* Pers. R. 3310 (Ditm. 1817 t. 47).  
*R. adusta* Pers. R. 3318 (Sch. 1806).



884. *Gomphidius glutinosus* Fr. R. 3320 (Link 1795).  
*Rhymovis pannoides* Fr. R. 3322 (F. 1855).  
*R. atro-tomentosa* Fr. R. 3323 (Sch. 1806).  
*R. involuta* Fr. R. 3324 (Link 1795).  
*Agaricus domesticus* Pers. R. 3329 (Lk. 1795).  
*A. radiatus* Bolt. R. 3330 (Dit. 1808).
90. *A. narcoticus* Batsch. R. 3331 (T. 1788).  
*A. deliquescens* Bull. R. 3335 (F. 1858).  
*A. papillatus* Batsch. R. 3337 (Lk. 1795).  
*A. micaceus* Bull. R. 3339 (Sch. 1806).  
*A. fimetarius* L. R. 3341 (T. 1788).  
*A. atramentarius* Bull. R. 3346 (Sch. 1806).  
*A. comatus* Müll. R. 3348 (Sch. 1806).  
*A. disseminatus* Pers. R. 3349 (Sch. 1806).  
*A. papilionaceus* Bull. R. 3362 (Sch. 1806).  
*A. campanulatus* L. R. 3363 (T. 1788).
900. *A. titubans* Bull. R. 3366 (Sch. 1806).  
*A. spadiceo-griseus* Schäf. R. 3375 (Sch. 1806).  
*A. callosus* Fr. R. 3381 (Sch. 1806).  
*A. fascicularis* Huds. R. 3399 (T. 1788).  
*A. lateritius* Batsch. R. 3401 (Sch. 1806).  
*A. semiglobatus* Batsch. R. 3403 (Sch. 1806).  
*A. stercorarius* Schum. R. 3404 (A. Brück. 1858).  
*A. squamosus* Pers. R. 3405 (Lk. 1795).  
*A. aeruginosus* Curt. R. 3407 (F. 1855).  
*A. arvensis* Schäf. R. 3414 (Lk. 1795).
10. *A. campestris* L. R. 3415 (T. 1788). ☉. 112.  
*A. depluens* Batsch. R. 3419 (Sch. 1806).  
*A. variabilis* Pers. R. 3420 (Sch. 1806).  
*A. mollis* Schäf. R. 3424 (Lk. 1795).  
*A. Hypnorum* Bat. R. 3430 (Sch. 1806).  
*A. tener* Schäf. R. 3436 (Dit. 1808).  
*A. carbonarius* Fr.? R. 3468 (Lk. 1795).  
*A. fastibilis* Pers. R. 3484 (Sch. 1806).  
*A. geophyllus* Bull. R. 3488 (Ditm. 1806).

919. *Agaricus rimosus* Bull. 3491 (Sch. 1806).
20. *A. mutabilis* Schäf. R. 3502 (Lk. 1795).  
*A. adiposus* Bat. R. 3508 (F. 1855).  
*A. squarrosus* Müll. R. 3511 (T. 1788).  
*A. radicosus* Bull. R. 3513 (Lk. 1795).  
*A. praecox* Pers. R. 3514 (F. 1855).  
*A. castaneus* Bull. R. 3526 (W. 1855).  
*A. bulbosus* Sow.? R. 3546 (Dit. 1806).  
*A. bivelus* Fr. R. 3547 (Dit. 1808).  
*A. cinnamomeus* L. R. 3552 (T. 1788).  
*A. violaceus* L. R. 3568 (T. 1788).
30. *A. fulgens* A. Schw. R. 3585 (F. 1855).  
*A. euchrous* Pers. R. 3619 (Dit. 1806).  
*A. clypeatus* L. R. 3636 (T. 1788).  
*A. phlebophorus* Dit. 1817 t. 15. R. 3642.  
*A. nanus* Pers. R. 3646 (F. 1858).  
*A. cervinus* Schäf. R. 3652. Dit. t. 28 (Lk. 1795).  
*A. volvaceus* Bull. R. 3656 (Wüst. 1855).  
*A. applicatus* Bat. R. 3662 (T. 1788).  
*A. nidulans* Pers. R. 3667 (T. 1855).  
*A. mitis* Pers. R. 3672 (Sch. 1806).
40. *A. stypticus* Bull. R. 3673 (T. 1788).  
*A. serotinus* Pers. R. 3674 (F. 1855).  
*A. petaloides* Bull. R. 3675 (F. 1855).  
*A. conchatus* Bull. R. 3676 (T. 1788).  
*A. ulmarius* Bull. R. 3686 (Wüst. 1855).  
*A. tigrinus* Bull. R. 3692 (F. Koch 1858).  
*A. umbelliferus* L. R. 3701 (T. 1788).  
*A. pyxidatus* Bull. R. 3706 (F. 1855).  
*A. corticola* Pers. R. 3715 (Sch. 1806).  
*A. stylobates* Pers. R. 3720 (Dit. 1817 t. 29).
50. *A. citrinellus* Pers. R. 3722 (Sch. 1806).  
*A. vulgareis* Pers. R. 3723 (Sch. 1806).  
*A. alliaceus* Jacq. R. 3732 (T. 1788).  
*A. atro-albus* Bolt. R. 3741 (Sch. 1806).

954. *Agaricus galericulatus* Scop. R. 3743 (F. 1855).  
*A. lacteus* Pers. R. 3749 (Lk. 1795).  
*A. rosellus* Fr. R. 3757 (Sch. 1806).  
*A. epiphyllus* Pers. R. 3763 (Sch. 1806).  
*A. perforans* Hoffm. R. 3764 (Wüst. 1855).  
*A. Rotula* Scop. R. 3765 (Sch. 1806).
60. *A. androsaceus* L. R. 3766 (T. 1788).  
*A. ramealis* Bull. R. 3769 (Sch. 1806).  
*A. scorodonius* Fr. R. 3771 (W. 1855).  
*A. Clavus* L. R. 3779 (T. 1788).  
*A. dryophilus* Bull. R. 3781 (Sch. 1806).  
*A. oreades* Bolt. R. 3790 (F. 1855).  
*A. tuberosus* Bull. R. 3798 (Sch. 1806).  
*A. confluens* Pers. R. 3802 (Sch. 1806).  
*A. velutipes* Curt. R. 3804 (Sch. 1806).  
*A. radicans* Relh. R. 3812 (F. 1855).
70. *A. laccatus* Scop. R. 3813 (Lk. 1795).  
*A. gibbus* Pers. R. 3828 (Dit. 1806).  
*A. candicans* Pers. R. 3835 (Sch. 1806).  
*A. odoratus* Bull. R. 3847 (A. Brück. 1855).  
*A. nebularius* Bat. R. 3864 (Sch. 1806).  
*A. glyciosmus* Fr. R. 3869 (W. 1855).  
*A. rufus* Scop. R. 3873 (F. 1855).  
*A. subdulcis* Bull. R. 3876 (Sch. 1806).  
*A. volemus* Fr. R. 3880 (W. 1855).  
*A. deliciosus* L. R. 3894 (Lk. 1795).
80. *A. vellereus* Fr. R. 3895 (F. 1855).  
*A. piperatus* L. R. 3896 (T. 1788).  
*A. pergamenus* Sw. R. 3898 (Lk. 1795).  
*A. torminosus* Schäf. R. 3918 (F. 1855).  
*A. scrobiculatus* Scop. R. 3919 (F. 1855).  
*A. brevipes* Bull. R. 3923 (F. 1855).  
*A. personatus* Fr. R. 3928 (F. 1855).  
*A. graveolens* Pers. R. 3934 (W. 1855).  
*A. chrysenus* Bull. R. 2940 (Fleischer 1844).

989. *Agaricus sulphureus* Bull. R. 3945 (W. 1855).  
 90. *A. vaccinus* Pers. R. 3957 (Lk. 1795).  
     *A. Columbeta* Fr. R. 3959 (Sch. 1806).  
     *A. rutilans* Schaef. R. 3963 (F. 1855).  
     *A. Russula* Schaef. R. 3964 (Lk. 1795).  
     *A. equestris* L. R. 3973 (F. 1855).  
     *A. conicus* Scop. R. 3978 (Sch. 1806).  
     *A. puniceus* Fr. R. 3980 (F. 1855).  
     *A. coccineus* Pers. R. 3982 (Sch. 1806).  
     *A. virgineus* Jacq. R. 3990 (F. 1855).  
     *A. pratensis* Pers. R. 3991 (Lk. 1795).  
 1000. *A. limacinus* Scop. R. 3997 (Sch. 1806).  
     *A. hypothejus* Fr. R. 4000 (W. 1855).  
     *A. eburneus* Bull. R. 4004 (Sch. 1806).  
     *A. mucidus* Schr. R. 4008 (W. 1855).  
     *A. melleus* Vahl. R. 4011 (Sch. 1806).  
     *A. granulosus* Bat. R. 4023 (Sch. 1806).  
     *A. cepaestipes* Sow. R. 4024 (Lehmeyer 1855).  
     *A. cristatus* Fr. R. 4030 (Sch. 1806).  
     *A. excoriatus* Schaef. R. 4036 (W. 1855).  
     *A. procerus* Scop. R. 4037 (Sch. 1806).  
 10. *A. vaginatus* Bull. R. 4038 (F. 1855).  
     *A. rubescens* Fr. R. 4044 (W. 1855).  
     *A. pantherinus* DC. R. 4049 (Sch. 1806).  
     *A. muscarius* L. R. 4050 (T. 1788). S. 140.  
     *A. phalloides* Fr. R. 4052 (Sch. 1806).

\*            \*            \*

1015. *Wüstneia sordida* Rab. (W. 1859) vergl. Archiv  
 XIII. S. 3. — Wo diese Pilzgattung einzureihen  
 sei, habe ich noch nicht in Erfahrung bringen  
 können.



## X. Schluß.

(Berichtigungen und Zusätze.)

Hiermit hätte ich den vaterländischen Botanikern die erste vollständige, d. h. alle Pflanzenclassen und Landes- theile umfassende Flora von Mecklenburg vorgelegt. Ich weiß sehr wohl, daß diese Arbeit nicht ohne Mängel ist, bitte aber, sie deswegen nicht etwa sogleich in Hausch und Bogen zu verwerfen, sondern wenigstens zu versuchen, ob nicht durch Beseitigung derselben in ihr ein Fundament für einen weiteren Fortbau gewonnen werden könnte. Begründete Kritiken und Berichtigungen, die man mir *sine ira* giebt, werden mir immer willkommen sein. Ich bitte im Interesse der Sache recht sehr um solche, und damit man sehe, daß es mir mit dieser Bitte Ernst sei, will ich selbst mit Angabe der Berichtigungen und Zusätze, die sich noch während des Druckes mir herausgestellt haben, hier vorangehen. Dieselben scheinen zahlreicher, als sie es in der That sind, weil die Anlage meiner Arbeit es mit sich bringt, daß ein und derselbe Fehler in verschiedenen Capiteln wiederkehrt, also an mehreren Stellen berichtigt werden muß, was in den späteren Abschnitten zum Theil während des Druckes schon geschehen ist. Manche derselben hätte ich vermieden, wenn ich den IX. Abschnitt, die systematische Aufzählung der Pflanzen, zuerst definitiv abgeschlossen und, da er die Grundlage für die übrigen Capitel bildet, dem Ganzen vorangestellt hätte, was mir auch noch in anderer Weise die Arbeit wesentlich erleichtert haben würde; ich erwähne diesen Umstand, damit vielleicht Andere durch diese von mir zu meinem Nachtheile gemachte Erfahrung bei ähnlichen Arbeiten vor einem gleichen Miß-

griffe sich warnen lassen. Die Berichtigungen und Zusätze, welche ich jetzt schon zu geben habe, sind folgende:

§. 18 Col. 2 unten ist hinter *Viola Rivin.* einzuschließen: *Viola lactea.*

§. 19 Col. 1 ist *Elatine triandra* zu streichen und Col. 2 das Wort *Moenchii* etwas einzurücken und statt *Potentilla opaca* zu lesen „*Viola*“ *opaca*; ebenda ist hinter *Rumex palustris* einzuschließen *Polygonum* mite und *Hydropiper*, zu streichen aber *Salix angustifolia*.

§. 23 ist hinter *Salix Russel.* einzuschließen: *Smithiana.*

§. 30 Z. 4 v. u. hinter „Erdbeeren“ einzuschließen: auch im holländischen heißen dieselben *aardbezie*.

§. 31 ist hinter dem Artikel „Brookwied“ einzuschließen: „Buchweizen s. Archiv VIII. S. 137.

§. 36 Z. 1 v. u. *Molinia* statt *Melica*.

§. 37 Z. 10 v. o. *Stellaria* st. *Alsine*.

Z. 4 v. u. ist hinter *Ledum palustre* einzuschließen: (vergl. S. 269 unten).

§. 38 hinter *Quitschenboom* ist hinzu zu fügen: (*Sorbus Aucuparia*).

§. 38 Z. 7 v. u. hinter (Franz) einzuschalten: „*Convallaria Polygonatum* und.“

§. 39 Z. 9 v. o. *Ribes* st. *Rubus*.

Z. 7 u. 6 v. u. sind zu streichen die Worte „(vielleicht aus“ u. „corrupt)“.

§. 41 Z. 5 v. o. *cathartica*.

§. 49 Col. 1 Z. 8 v. u. *carinata* st. *coronata* u. Col. 2 Z. 7 v. u. *ochroleuca*.

§. 53 Col. 1 ist hinter *Dianthus aren.* einzuschließen: *Geranium sylvaticum*, Col. 2 aber *Narthecium ossifragum* zu streichen.

§. 91 Z. 3 v. o. statt *Linnaei Griew.* (*officinalis* und *anglica* L.), zu lesen: „*Cochlearia anglica* L.“

§. 93 Z. 5 v. v. sind die Worte: *c. var.?* *filiformis* zu streichen.

§. 96 Z. 14 v. o. *derselben* st. *denselben*.

§. 123 Z. 14 v. o. *Verbascum phlomoides* st. *Thapsus*.

§. 133 Z. 12 v. u. ist *Viburnum Opulus* zu streichen.

§. 135 Z. 5 v. u. l. Wasser-Schierling.

§. 144 ist hinter Z. 3 einzuschalten: 1860 Eggers Flora excurs.

§. 148 Z. 7 v. o. hinter *Arundo varia* einzuschreiben: *Meesia Albertini*.

§. 150 Z. 8 v. u. hinzuzufügen: *Stilephora rhizoides*.

Z. 5 v. u. statt „seit 1814 ff.“ zu lesen: seit 1813 praktischer Arzt in Ludwigslust und gestorben daselbst am 30. März 1860: einen ausführlicheren Nekrolog über ihn findet man in dem vorliegenden XIV. Jahrgange dieses Archivs.

§. 151 Z. 3 v. o. *Fucus serratus* zu streichen.

§. 153 Z. 14 v. u. l. 95 Pilzarten.

Hinter dem Artikel „Drewes“ ist einzuschreiben:

Eggers G., Lieutenant in Neustrelitz, veröffentlichte während des Druckes dieser Arbeit eine „Flora excursoria. Botanisches Taschenbuch zum Gebrauch auf Excursionen in Mecklenburg. Neustrelitz 1860.“ 12mo. 195 S. 10 Sgr.; dieselbe ist nach dem linneischen Systeme geordnet, und hat mehr einen populären als einen kritischen Zweck.

§. 154 Z. 8 v. u. l. 359 Pilzarten.

§. 155. Nach Förste trägt auch die in den süddeutschen Alpen wachsende *Primula Flörkeana* Schr. den Namen.

§. 156 Z. 3 v. o. ist *Lepturus incurvatus* zu streichen und in Z. 13 v. o. zu versetzen, da nach einem Briefe G. Brückners an mich d. d. 8. April 1845 dies Gras damals schon von Häcker in M. entdeckt war.

§. 156 Z. 12 v. u. *Stilephora rhizoides* zu streichen.

§. 157 Koch F., Baumeister, bereicherte unsere Flora auch noch durch die Entdeckung von 29 mikroskopischen Algen, vergl. §. 194 Num.

§. 159 Z. 11 v. o. ist *Narthecium ossifragum* einzuschreiben.

§. 159. Nach v. Dörken benannte F. Schultz ein von jenem auf dem Monte Rosa entdecktes Laubmoos *Grimmia Oertzeniana* (Syll. Ratisb. 1828 p. 124), und auch eine Mikrolepidoptere trägt nach ihm den Namen *Eudorea Oertziella* (Archiv IV. 13).

§. 160. A. Schmidt ist am 23. März 1860 in seinem 92. Lebensjahre gestorben.

§. 162 Z. 12 v. u. Meesia Albertini zu streichen.

§. 163 Z. 13 v. o. l. 220 neue Arten.

§. 173 Z. 9 v. u. l. 78.

§. 174 Z. 15 v. o. l. 106 Arten st. 108.

§. 179 ff. Tabelle A. ist folgendermaßen zu ändern:

Col. 1 Phan. zu lesen: Griewant 17. Häcker 1. Nolte 4. — S. 1023.

Col. 3 M. Fr.: Beuthe 1. Schultz 45.

Col. 5 Alg.: Koch F. 29. — S. 140.

Col. 7 Fungi: Ditmar 95. Fiedler 359. Schultz 220. Timm  
Z. 78. Tode 106. — S. 1015.

Col. 8 S. S. Beuthe 6. Ditmar 108. Fiedler 385. Griewant  
18. Häcker 3. Koch F. 30. Nolte 4. Schultz 375. Timm 643. Tode  
106. — S. 2634.

Diese Aenderungen der Zahlen bitte ich auch bei den statistischen  
Angaben §. 187 ff. zu berücksichtigen.

§. 182 Tabelle B. ist zu ändern.

Col. 1 Phan. VI. 62. — S. 1023.

Col. 5 Alg. IX. 49. — S. 140.

Col. 7 Fung. II. 121. IV. 340. V. 46. IX. 336. — S. 1015.

Col. 8 S. S. II. 396. IV. 614. V. 93. VI. 87. IX. 419. —

S. 2634.

§. 184 Z. 2 v. o. lies statt Sanguisorbeae und der dahin ge-  
hörigen Zahlen: (S. G.)

Sanguisorbeae 4 . . . 4 . 4

Pomaceae 5 . 1 . . 6 . 6

§. 186 bei Lilaceae ist aus der Columne der zweifelhaften Arten  
die Zahl 1 zu streichen, und dafür in der ersten Col. st. 12 zu lesen 13.  
Die Summe der eingebor. Monocotyledonen ist demnach 245, die  
der zweifelhaften nur 1.

§. 191 Z. 16 v. o. Narthecium ossifr. zu streichen; Z. 4 v.  
u. st. 94 zu lesen 93.

§. 192 Z. 5 v. o. l. „Isfriens“ statt Italiens.

§. 217 Z. 10 v. u. l. meinem st. mein.

§. 252 No. 358. Hr. Arndt fand am 21. April d. Js. im  
Zinkenthaler Holz bei Onoien zwei Exemplare blühenden Epheus.



S. 362–376, wo mehrere Male Ditmar 1812 steht, ist statt jener Zahl 1817 zu lesen. Die vier von Ditmar bearbeiteten Hefte von Sturms Flora sind nämlich in verschiedenen Jahren erschienen, und haben erst im J. 1817 einen Gesamttitel erhalten; da ich S. 153 letzteres Jahr, als das, worin jene Arbeit veröffentlicht ist, angegeben habe, muß dies auch hier, um Irrthümern vorzubeugen, festgehalten werden.

S. 362 in der Anm. Z. 3 l. 158 ff. statt 160 ff.

S. 372 in der Anm. lies 651.

\*            \*

Sollte es möglich sein, die vorliegende Arbeit auf dem von mir angedeuteten Wege zu einem von unsern botanischen Autoritäten anerkannten floristischen Codex umzugestalten, der die Resultate der sämmtlichen bisherigen Forschungen im Bereiche der mecklenburgischen Flora umfaßte, so würde man letztere für die Zukunft vor neuen Verwirrungen wohl am besten dadurch bewahren können, daß (etwa von Seiten unseres Vereins) ein Normal-Herbarium angelegt würde, in welchem alle neuen Entdeckungen, welche in der Landesflora Aufnahme beanspruchten, niedergelegt werden müßten. Andere deutsche Länder sind uns in dieser zweckmäßigen Einrichtung schon vorangegangen, warum sollten wir zurückbleiben?

---

## Register der Gattungsnamen.

(Wo mehrere Seitenzahlen stehen, bezieht sich die letzte auf die systematische Aufzählung der Pflanzen in Abschnitt IX.)

**Abies** 301.  
**Acer** 228.  
**Achillea** 258.  
**Achnanthes** 195. 347.  
**Achyrophorus** 263.  
**Acladium** 369.  
**Aconitum** 208.  
**Acorus** 306.  
**Acremonium** 368.  
**Acrosperrnum** 378.  
**Acrostalagmus** 369.  
**Actaea** 208.  
**Actidium** 373.  
**Actinococcus** 195.  
**Actinoocyclus** 347.  
**Actinothyrium** 371.  
**Adonis** 189.  
**Adoxa** 253.  
**Aecidium** 364.  
**Aegagropila** 349.  
**Aegerita** 380.  
**Aegopodium** 249.  
**Aesculus** 133.  
**Aethalium** 378.  
**Aethusa** 250.  
**Agaricus** 389.  
**Agrimonia** 241.  
**Agrostemma** 223.  
**Agrostis** 319.  
**Ahnfeltia** 351.  
**Aira** 191. 321.  
**Ajuga** 288.  
**Alchemilla** 241.  
**Alicularia** 346.  
**Alisma** 302.  
**Alliaria** 214.  
**Allium** 311.  
**Alnus** 301.  
**Alopecurus** 191. 319.  
**Alsine** 225.  
**Althaea** 227.  
**Alyssum** 189. 215.  
**Amaranthus** 292.  
**Amblyodon** 336.  
**Ammophila** 320.  
**Ampelopsis** 133.

**Amphiptera** 195.  
**Amphitetras** 195.  
**Amphora** 195.  
**Amygdalus** 133.  
**Anabaina** 348.  
**Anacalypta** 332.  
**Anacamptis** 308.  
**Anagallis** 290.  
**Anchusa** 275.  
**Andromeda** 269.  
**Anemone** 189. 204.  
**Aneura** 193. 343.  
**Angelica** 251.  
**Anixia** 378.  
**Anomodon** 339.  
**Antennataria** 377.  
**Anthemis** 258.  
**Anthericum** 310.  
**Anthoceros** 343.  
**Anthoxanthum** 319.  
**Anthriscus** 252.  
**Anthyllis** 231.  
**Antirrhinum** 280.  
**Apera** 319.  
**Apium** 114. 138. 249.  
**Aquilegia** 208.  
**Arabis** 212.  
**Archangelica** 251.  
**Arctostaphylos** 269.  
**Arcyria** 378.  
**Arenaria** 225.  
**Aristolochia** 133. 297.  
**Armeria** 291.  
**Armoracia** 215.  
**Arnica** 259.  
**Arnoseris** 262.  
**Arrhenatherum** 321.  
**Artemisia** 258.  
**Arthrimum** 369.  
**Arum** 306.  
**Asarum** 191. 297.  
**Ascobolus** 382.  
**Ascochyta** 371.  
**Ascophora** 370.  
**Asparagus** 114. 309.  
**Aspergillus** 369.

**Asperugo** 275.  
**Asperula** 253.  
**Aspidium** 327.  
**Asplenium** 326.  
**Aster** 190. 256.  
**Asterophora** 380.  
**Astragalus** 189. 233.  
**Athyrium** 327.  
**Atriplex** 190. 294.  
**Atropa** 139. 277.  
**Avena** 114. 321.  
**Aulacomnion** 336.  
**Auliscus** 348.  
**Auricularia** 385.

**Bacillaria** 346.  
**Baeomyces** 358.  
**Ballota** 288.  
**Bangia** 196.  
**Barbarea** 212.  
**Barbula** 332.  
**Bartramia** 336.  
**Batrachium** 10. 205.  
**Batrachospermum** 195.  
**Bellis** 256.  
**Berberis** 133. 209.  
**Berula** 250.  
**Beta** 114. 190.  
**Betckea** 147.  
**Betonica** 288.  
**Betula** 301.  
**Biatora** 358.  
**Bidens** 257.  
**Biotia** 256.  
**Bispora** 366.  
**Blandowia** 148.  
**Blasia** 343.  
**Blechnum** 326.  
**Blitum** 293.  
**Boletus** 388.  
**Borago** 117. 275.  
**Botrychium** 328.  
**Botrydium** 350.  
**Botrytis** 369.  
**Bovista** 380.

- Brachypodium 323.  
 Brassica 114. 214.  
 Briza 321.  
 Bromus 323.  
 Bryonia 190. 246.  
 Bryopogon 362.  
 Bryopsis 196.  
 Bryum 193. 335  
 Bulgaria 382.  
 Bunias 218.  
 Bupleurium 250.  
 Butomus 302.  
 Buxbaumia 338.  
 Buxus 133.  
 Byssocladium 368.  
  
**Cakile 218.**  
 Calamagrostis 320.  
 Calamintha 285.  
 Calendula 260.  
 Calla 306.  
 Callithamnion 196.  
     351.  
 Callitriche 246.  
 Calluna 269.  
 Calocera 381.  
 Calothrix 348.  
 Caltha 207.  
 Calycanthus 133.  
 Calycium 357.  
 Calypogeia 344.  
 Camelina 189. 216.  
 Campanula 190. 267.  
 Campylodiscus 347.  
 Cannabis 298.  
 Cantharellus 388.  
 Capsella 217.  
 Cardamine 213.  
 Carduus 260.  
 Carex 191. 316.  
 Carlina 261.  
 Carpinus 298. 4  
 Carum 249.  
 Castanea 133.  
 Caucalis 251.  
 Cenangium 382.  
 Centaurea 261.  
 Centunculus 290.  
 Cephalanthera 308.  
 Cephalotrichum 369.  
 Ceramium 351.  
 Cerastium 225.  
 Ceratium 370.  
 Ceratodon 333.  
 Ceratonöis 346.  
 Ceratophyllum 246.  
 Cetraria 361.  
 Chaerophyllum 114.  
     252.  
 Chaiturus 288.  
 Chamagrostis 191.  
 Chara 74. 354.  
 Chelidonium 210.  
 Chenopodina 292.  
 Chenopodium 190.  
     293.  
 Chilosecyphus 344.  
 Chloridium 368.  
 Chondrilla 264.  
 Chondrus 196. 352.  
 Chorda 197. 352.  
 Chordostylum 371.  
 Chrysanthemum 258.  
 Chrysosplenium 248.  
 Cicēndia 272.  
 Cichorium 114. 262.  
 Cicuta 249.  
 Cinclidotus 338.  
 Cineraria 259.  
 Cionium 379.  
 Circaea 244.  
 Cirsium 260.  
 Cladium 314.  
 Cladonia 358.  
 Cladosporium 369.  
 Cladostephus 196.  
 Clavaria 381.  
 Clematis 133.  
 Climacium 339.  
 Clinopodium 285.  
 Cnidium 250.  
 Cochlearia 215.  
 Cocconöis 195. 347.  
 Cocconema 347.  
 Colchicum 312.  
 Collarium 367.  
 Collema 356.  
 Collomia 273.  
 Colutea 133.  
 Comarum 233.  
 Conferva 195. 349.  
 Coniocybe 357.  
 Conium 252.  
 Conoplea 366.  
 Convallaria 310.  
 Convolvulus 273.  
 Conyza 190.  
 Corallorrhiza 309.  
 Cordyceps 377.  
 Coremium 369.  
 Cornicularia 362.  
 Cornus 133. 252.  
 Coronilla 189.  
 Corrigiola 247.  
 Corticium 385.  
 Corydalis 210.  
 Corylus 114. 298.  
 Corynephorus 321.  
 Coscinodiscus 347.  
 Cotula 190.  
 Crambe 218.  
 Crataegus 133. 242.  
 Craterellus 386.  
 Craterium 379.  
 Crepis 190. 265.  
 Cruoria 195.  
 Cucubalus 223.  
 Cupularia 379.  
 Cuscuta 273.  
 Cyathus 380  
 Cydonia 133. 190.  
 Cylindrospermum  
     195. 348.  
 Cynanchum 271.  
 Cynoglossum 275.  
 Cynosurus 322.  
 Cyperus 313.  
 Cyphella 381.  
 Cyripedium 191.  
 Cystoclonium 196.  
 Cystopteris 327.  
 Cytispora 371.  
 Cytisus 133. 189. 231.  
  
**Dacryomyces 366.**  
 Dactylis 322.  
 Dactylium 369.  
 Daedalea 386.  
 Daphne 296.  
 Datura 277.  
 Daucus 114. 251.  
 Delesseria 352.  
 Delphinium 208.  
 Dematium 367.  
 Dentaria 214.  
 Depazea 371.

- Dermatea 367.  
 Desmarestia 197. 353.  
 Dethardingia 153.  
 Deutzia 133.  
 Diachea 379.  
 Dianthus 189. 221.  
 Diatoma 346.  
 Dieranum 333.  
 Dictydium 379.  
 Dietyocha 195. 348.  
 Dietyosiphon 196.  
 Diderma 379.  
 Didymium 379.  
 Diervillia 133.  
 Digitalis 279.  
 Diphyscium 338.  
 Diplonëis 348.  
 Diplostromium 196.  
 Diplotaxis 189. 214.  
 Dipsacus 117. 255.  
 Distichium 332.  
 Ditiola 367.  
 Ditmaria 153.  
 Dothidea 373.  
 Draba 215.  
 Draparnaldia 349.  
 Drosera 220.  
 Dumontia 196.  
  
**E**chinops 260.  
 Echinopsilon 293.  
 Echinospermum 275.  
 Echium 276.  
 Ectocarpus 196. 350.  
 Elachista 197.  
 Elaphomyces 380.  
 Elatine 226.  
 Elsholtzia 285.  
 Elymus 325.  
 Empetrum 297.  
 Encalypta 338.  
 Endogone 378.  
 Enteromorpha 196.  
     351.  
 Epichysium 370.  
 Epicoccum 367.  
 Epilobium 190. 244.  
 Epimedium 209.  
 Epipactis 309.  
 Epipogon 308.  
 Epochnum 367.  
 Equisetum 329.  
  
 Eranthis 208.  
 Erica 269.  
 Erigeron 256.  
 Erineum 367.  
 Eriophorum 315.  
 Erodium 229.  
 Ervum 114. 235.  
 Eryngium 249.  
 Erysibe 377.  
 Erysimum 214.  
 Erythraea 272.  
 Eunotia 195. 346.  
 Eupatorium 255.  
 Euphorbia 297.  
 Euphrasia 283.  
 Eurotium 370.  
 Evernia 362.  
 Evonymus 230.  
 Exacum 272.  
 Excipula 372.  
 Exidia 381.  
 Exosporium 366.  
  
**F**agus 298.  
 Falcaria 249.  
 Farsetia 215.  
 Fegatella 343.  
 Festuca 323.  
 Ficaria 207.  
 Fiedleria 154. 193.  
 Filago 257.  
 Fissidens 342.  
 Fistulina 386.  
 Floerkea 155.  
 Fontinalis 338.  
 Fossombronia 343.  
 Fragaria 113. 239.  
 Fraxinus 271.  
 Frullania 343.  
 Fucus 128. 353.  
 Fumaria 189. 211.  
 Funaria 331.  
 Furcellaria 351.  
 Fusarium 366.  
 Fusidium 366.  
 Fuisporium 368.  
  
**G**agea 311.  
 Galanthus 309.  
 Galega 233.  
 Galeobdolon 286.  
 Galeopsis 286.  
  
 Galium 190. 254.  
 Gallionella 347.  
 Gaudinia 324.  
 Geaster 380.  
 Gelidium 352.  
 Genista 128. 230.  
 Gentiana 271.  
 Geocalyx 194.  
 Geoglossum 381.  
 Geotrichum 368.  
 Geranium 228.  
 Geum 236.  
 Glaucium 210.  
 Glaux 291.  
 Glechoma 285.  
 Gleditschia 133.  
 Glyceria 322.  
 Gnaphalium 257.  
 Gomphidius 389.  
 Gomphonema 195.  
 Gonosporium 369.  
 Goodyera 309.  
 Grammatophora 347.  
 Grandinia 386.  
 Graphis 355.  
 Gratiola 279.  
 Grimmia 337.  
 Grischowia 178.  
 Gumbelia 337.  
 Gymnadenia 307.  
 Gymnostomum 333.  
 Gypsophila 189. 221.  
  
**H**agenia 362.  
 Halianthus 225.  
 Halidrys 353.  
 Halorrhiza 197.  
 Haplomitrium 194.  
 Haplotrichum 369.  
 Hedera 252.  
 Heleocharis 191. 314.  
 Helvella 385.  
 Helianthemum 218.  
 Helianthus 114. 257.  
 Helichrysum 257.  
 Helicomyces 366.  
 Helleborus 208.  
 Helminthia 263.  
 Helminthosporium  
     369.  
 Helosciadium 249.  
 Helotium 381.



Hepatica 204.  
 Heracleum 251.  
 Herminium 308.  
 Herniaria 247.  
 Hesperis 214.  
 Heteractis 195.  
 Hieracium 190. 265.  
 Hierochloa 318.  
 Hildebrandtia 197.  
 Himantalia 353.  
 Hippophaë 296.  
 Hippuris 245.  
 Holcus 321.  
 Holosteum 225.  
 Honckenya 225.  
 Hordeum 114. 325.  
 Hormidium 195.  
 Hormiscia 196.  
 Hottonia 291.  
 Humulus 116. 298.  
 Hydnum 386.  
 Hydrilla 191.  
 Hydrocharis 302.  
 Hydrocotyle 249.  
 Hydrodictyon 350.  
 Hymenostomum 333.  
 Hyoscyamus 277.  
 Hypericum 223.  
 Hypna 367.  
 Hypnelia 380.  
 Hypnum 339.  
 Hypochaeris 263.  
 Hypoglossum 352.  
 Hypoxylon 377.  
 Hysterium 372.  
  
**J**asione 267.  
 Ilex 270.  
 Illecebrum 247.  
 Illosporium 377.  
 Imbricaria 356.  
 Impatiens 229.  
 Inula 190. 256.  
 Iris 309.  
 Iripex 386.  
 Isaria 370.  
 Isnardia 190.  
 Isoetes 192.  
 Juglans 116.  
 Juncus 128. 191. 312.  
 Jungermannia 193.  
 344.

Juniperus 301.  
 Jurinea 261.  
  
**K**amptzia 156.  
 Kerria 133.  
 Knautia 255.  
 Kochia 293.  
 Koeleria 320.  
  
**L**abrella 371.  
 Lactuca 264.  
 Laminaria 353.  
 Lamium 286.  
 Lampsana 262.  
 Lappa 261.  
 Laserpitium 251.  
 Lathraea 284.  
 Lathyrus 235.  
 Leangium 380.  
 Leathesia 197.  
 Lecanidion 382.  
 Lecanora 356.  
 Lecidea 357.  
 Ledum 269.  
 Leersia 319.  
 Leibleinia 195.  
 Lejeunia 343.  
 Lemna 305.  
 Lenzites 388.  
 Leocarpus 379.  
 Leontodon 262.  
 Leonurus 288.  
 Leotia 384.  
 Lepidium 217.  
 Lepidozia 344.  
 Lepigonum 224.  
 Leptobymenium 338.  
 Leptostroma 371.  
 Lepturus 325.  
 Leskea 339.  
 Leucodon 338.  
 Leucojum 309.  
 Levisticum 250.  
 Libanotis 250.  
 Licea 378.  
 Lichnia 197.  
 Ligustrum 133. 271.  
 Limnanthemum 271.  
 Limosella 282.  
 Linaria 190. 280.  
 Linkia 158.  
 Linnæa 253.

Linosyris 190.  
 Linum 115. 226.  
 Lioclaena 344.  
 Liparis 309.  
 Listera 191. 309.  
 Lithospermum 276.  
 Littorella 292.  
 Lobaria 357.  
 Lobelia 267.  
 Lolium 325.  
 Loniceræ 133. 253.  
 Lophium 373.  
 Lophoclea 344.  
 Lotus 13. 233.  
 Lunularia 343.  
 Lupinus 114.  
 Luzula 313.  
 Lychnis 223.  
 Lycium 133. 277.  
 Lycogala 378.  
 Lycoperdon 380.  
 Lycopodium 329.  
 Lycopsis 276.  
 Lycopus 285.  
 Lyngbya 195.  
 Lysimachia 290.  
 Lythrum 190.  
  
**M**adotheca 343.  
 Majanthemum 310.  
 Malachium 225.  
 Malaxis 309.  
 Malva 226.  
 Marchantia 343.  
 Marrubium 288.  
 Mastigobryum 193.  
 344.  
 Matricaria 258.  
 Medicago 231.  
 Meesia 336.  
 Melampyrum 190. 282.  
 Melanconium 366.  
 Melandrium 223.  
 Melica 321.  
 Melilotus 232.  
 Melosira 195.  
 Mentha 284.  
 Menyanthes 271.  
 Mercurialis 298.  
 Merismopodia 348.  
 Merulius 386.  
 Mesogloia 197. 352.

*Mespilus* 30. 113.  
*Metzgeria* 343.  
*Micaraea* 356.  
*Microcoleus* 348.  
*Microstylis* 191.  
*Milium* 320.  
*Mitrulea* 381.  
*Mnium* 334.  
*Moehringia* 225.  
*Moenchia* 189.  
*Molinia* 322.  
*Monilia* 368.  
*Monotropa* 270.  
*Montia* 247.  
*Morchella* 385.  
*Morus* 116 f.  
*Mucor* 370.  
*Muscari* 312.  
*Mycogone* 367.  
*Myosotis* 276.  
*Myosurus* 205.  
*Myrica* 301.  
*Myrionema* 196.  
*Myriophyllum* 245.  
*Myriotheceum* 366.  
*Myxotrichum* 369.

*Najas* 191. 305.  
*Narcissus* 309.  
*Nardus* 326.  
*Narthecium* 191. 312.  
*Nasturtium* 211.  
*Navicula* 195. 346.  
*Neckera* 339.  
*Nemalion* 351.  
*Nemaspora* 371.  
*Neottia* 309.  
*Nepeta* 285.  
*Nephrodium* 327.  
*Neslea* 217.  
*Nicandra* 277.  
*Nicotiana* 114.  
*Nigella* 189.  
*Nitella* 197. 353.  
*Nonnea* 275.  
*Nostoc* 348.  
*Nuphar* 209.  
*Nyctalis* 388.  
*Nymphaea* 209.

*Obione* 293.  
*Odontites* 283.

*Oedogonium* 349.  
*Oenanthe* 250.  
*Oenothera* 117. 244.  
*Oidium* 368.  
*Omphalodes* 275.  
*Ononis* 231.  
*Onopordon* 261.  
*Onygena* 380.  
*Opegrapha* 355.  
*Ophioglossum* 328.  
*Ophrys* 308.  
*Orchis* 191. 306.  
*Origanum* 285.  
*Ornithogalum* 310.  
*Ornithopus* 233.  
*Orobanche* 190. 283.  
*Orobis* 235.  
*Orthotrichum* 193.  
 337.  
*Oscillaria* 348.  
*Osmunda* 328.  
*Oxalis* 229.  
*Ozonium* 367.  
*Ozothallia* 197.

*Palmella* 348.  
*Paludella* 336.  
*Panicum* 318.  
*Papaver* 210.  
*Parietaria* 298.  
*Paris* 310.  
*Parmelia* 357.  
*Parnassia* 221.  
*Pastinaca* 251.  
*Paxillus* 389.  
*Pedicularis* 282.  
*Pellia* 343.  
*Peltigera* 357.  
*Penicillium* 368.  
*Peplis* 246.  
*Perichaena* 378.  
*Periconia* 369.  
*Peridermium* 365.  
*Perisporium* 377.  
*Peronospora* 368.  
*Persica* 113.  
*Pertusaria* 355.  
*Pestalozzia* 373.  
*Petasites* 190. 256.  
*Peucedanum* 251.  
*Peziza* 382.  
*Phacidium* 372.

*Phalaris* 318.  
*Phallus* 380.  
*Phaseum* 331.  
*Phaseolus* 113.  
*Philadelphus* 133.  
*Phlebia* 385.  
*Phleum* 319.  
*Phoenixopus* 264.  
*Phoma* 371.  
*Phormidium* 195.  
*Phragmidium* 366.  
*Phragmites* 128. 320.  
*Phragmotrichum* 366.  
*Phycodrys* 352.  
*Phycolapathum* 196.  
*Phycoseris* 351.  
*Phyllactidium* 196.  
*Phyllerium* 367.  
*Phyllitis* 197.  
*Phyllophora* 351.  
*Physactis* 195. 349.  
*Physalis* 277.  
*Physarum* 379.  
*Physcomitrium* 331.  
*Physoderma* 364.  
*Phyteuma* 267.  
*Picris* 262.  
*Pilobolus* 371.  
*Pilularia* 329.  
*Pimpinella* 249.  
*Pinguicula* 289.  
*Pinnularia* 347.  
*Pinus* 133. 301.  
*Pistillaria* 381.  
*Pisum* 235.  
*Placodium* 355.  
*Plagiochila* 345.  
*Plantago* 292.  
*Platanthera* 191. 307.  
*Poa* 322.  
*Podosphenia* 195.  
*Polemonium* 273.  
*Polyangium* 380.  
*Polycnemum* 293.  
*Polygala* 189. 221.  
*Polygonum* 115. 295.  
*Polypodium* 327.  
*Polypogon* 320.  
*Polyporus* 386.  
*Polyisiphonia* 196. 352.  
*Polystichum* 327.  
*Polystigma* 373.

- Polytrichum 338.  
 Populus 133. 300.  
 Poronia 377.  
 Porphyra 196.  
 Portulaca 247.  
 Potamogeton 191. 302.  
 Potentilla 239.  
 Poterium 242.  
 Pottia 193. 331.  
 Preissia 343.  
 Primula 290.  
 Prismatocarpus 269.  
 Prunella 288.  
 Prunus 113. 236.  
 Ptelea 133.  
 Pteris 326.  
 Ptilidium 343.  
 Puccinia 365.  
 Pulicaria 257.  
 Pulmonaria 276.  
 Pulsatilla 204.  
 Punctaria 197.  
 Pyramidium 193.  
 Pyrenia 380.  
 Pyrola 270.  
 Pyrus 113. 243.  
 Quercus 298.  
 Racomitrium 193.  
 337.  
 Radiola 226.  
 Radula 343.  
 Radulum 386.  
 Ramalina 362.  
 Ranunculus 205.  
 Raphanus 218.  
 Raphidogloea 195.  
 Rebouillia 343.  
 Reseda 220.  
 Reticularia 378.  
 Rhabdonema 195.  
 Rhacodium 369.  
 Rhamnus 230.  
 Rhinanthus 283.  
 Rhizomorpha 367.  
 Rhizosporium 362.  
 Rhodomela 352.  
 Rhus 138.  
 Rhymovis 389.  
 Rhynchospora 314.  
 Rhytisma 373.  
 Ribes 114. 133. 248.  
 Riccia 342.  
 Rivularia 195. 349.  
 Robinia 133.  
 Roepera 160.  
 Roestelia 365.  
 Rosa 133. 241.  
 Rubia 117.  
 Rubus 113. 190. 237.  
 Rudbeckia 257.  
 Rumex 191. 294.  
 Ruppia 304.  
 Russula 388.  
 Sagina 189. 223.  
 Sagittaria 302.  
 Salicornia 293.  
 Salix 21. 133. 191. 299.  
 Salsola 292.  
 Salvia 190. 285.  
 Salviniia 192.  
 Sambucus 252.  
 Samolus 291.  
 Sanguisorba 241.  
 Sanicula 249.  
 Saponaria 222.  
 Saprolegnia 349.  
 Sarcoseyphus 194.  
 346.  
 Sarothamnus 230.  
 Saxifraga 248.  
 Scabiosa 255.  
 Scandix 251.  
 Scapania 194. 345.  
 Scheuchzeria 302.  
 Schistidium 193. 337.  
 Schizogonium 195.  
 Schizonema 195.  
 Schizophyllum 388.  
 Schizosiphon 195.  
 Schoberia 292.  
 Schoenus 313.  
 Schultzia 161.  
 Schwerinia 178.  
 Scirpus 191. 315.  
 Scleranthus 247.  
 Scleroderma 380.  
 Sclerotium 377.  
 Scorzonera 114. 190.  
 263.  
 Scrophularia 279.  
 Scutellaria 288.  
 Sedum 247.  
 Seligeria 193.  
 Selinum 251.  
 Sempervivum 131.  
 248.  
 Senebiera 189. 217.  
 Senecio 190. 259.  
 Sepedonium 368.  
 Septoria 366.  
 Serratula 261.  
 Seseli 250.  
 Setaria 318.  
 Sherardia 253.  
 Silene 189. 223.  
 Silybum 260.  
 Sinapis 214.  
 Sisymbrium 214.  
 Sium 250.  
 Smilacina 310.  
 Solanum 116. 277.  
 Solidago 256.  
 Sonchus 264.  
 Sorbus 243.  
 Sparassia 382.  
 Sparganium 306.  
 Spathulea 382.  
 Specularia 269.  
 Spergula 114. 224.  
 Spergularia 224.  
 Sphaacelaria 196.  
 Sphaeria 373.  
 Sphaerobolus 380.  
 Sphaerococcus 196.  
 352.  
 Sphaeronema 371.  
 Sphaeroplea 349.  
 Sphagnocoetis 344.  
 Sphagnum 330.  
 Spiraea 133. 190. 236.  
 Spiranthus 309.  
 Spirogyra 350.  
 Splachnum 331.  
 Sporidesmium 366.  
 Sporoëadus 366.  
 Sporodinia 370.  
 Sporotrichum 368.  
 Spumaria 378.  
 Stachylidium 368.  
 Stachys 287.  
 Stannia 178.  
 Staphylea 133.  
 Statice 292.

- Stegilla 373.  
 Stellaria 189. 225.  
 Stemonitis 379.  
 Stenactis 190.  
 Stereocaulon 361.  
 Stereum 385.  
 Stieta 357.  
 Stictis 382.  
 Stilbospora 366.  
 Stilbum 370.  
 Stilephora 197. 353.  
 Stipa 320.  
 Stratiotes 128. 302.  
 Strelitzia 178.  
 Striatella 195. 347.  
 Sturmia 309.  
 Stypocaulon 196.  
 Succisa 255.  
 Surirella 346.  
 Sweertia 271.  
 Symphoricarpos 133.  
 Symphytum 190. 276.  
 Syncyelia 347.  
 Synedra 195. 346.  
 Syringa 133.  
 Syzygites 370.  
  
**T**abellaria 347.  
 Tanacetum 258.  
 Taphrina 367.  
 Taraxacum 264.  
 Taxus 301.  
 Teesdalea 217.  
 Tessella 195.  
 Tetragonolobus 169.  
 Tetraxis 338.  
 Tetraspora 348.  
 Teucrium 190. 289.  
 Thaliotrum 189. 203.  
 Thelebolus 380.  
 Thelephora 385.  
 Thesium 296.  
 Thlaspi 217.  
  
 Thrincia 262.  
 Thuja 133.  
 Thymus 285.  
 Thysanomitrium 334.  
 Thysselinum 251.  
 Tilia 227.  
 Timmia 169. 336.  
 Tithymalus 297.  
 Todea 175.  
 Torilis 251.  
 Torula 366.  
 Tragopogon 263.  
 Trametes 386.  
 Trapa 69. 190. 244.  
 Trematodon 333.  
 Tremella 381.  
 Trevirana 176.  
 Trichia 378.  
 Trichocolea 343.  
 Trichoderma 380.  
 Trichostomum 332.  
 Trichothecium 368.  
 Trientalis 290.  
 Trifolium 114. 232.  
 Triglochin 302.  
 Triodia 321.  
 Triphragmium 365.  
 Triticum 114. 324.  
 Trollius 207.  
 Tuber 378.  
 Tubercularia 366.  
 Tubulina 378.  
 Tulipa 310.  
 Tulostoma 380.  
 Turritis 212.  
 Tussilago 256.  
 Tympanis 382.  
 Typha 305.  
 Typhula 381.  
  
**U**lex 230.  
 Ulva 196. 351.  
 Ulmus 298.  
  
 Urceolaria 355.  
 Uredo 362.  
 Urtica 298.  
 Usnea 362.  
 Utricularia 289.  
  
**V**accinium 111.  
 128. 269.  
 Valeriana 254.  
 Valerianella 254.  
 Vaucheria 196. 350.  
 Verbascum 277.  
 Verbena 289.  
 Veronica 190. 280.  
 Verpa 384.  
 Verrucaria 355.  
 Verticillium 369.  
 Viburnum 33. 253.  
 Vicia 114. 189. 234.  
 Villarsia 271.  
 Vinca 271.  
 Viola 189. 218.  
 Viscum 252.  
 Vitis 115.  
 Volutella 382.  
  
**W**eigelia 133.  
 Weisia 333.  
 Wredowia 177.  
 Wüstneia 177. 392.  
  
**X**anthium 190. 266.  
 Xylostroma 367.  
  
**Z**annichellia 191.  
 305.  
 Zea 115.  
 Zeora 355.  
 Zostera 128. 305.  
 Zygnuma 350.  
 Zygogonium 350.







Boll, Ernst/Flora von Meklenburg, in 9



3 5185 00089 5662



8 032919 990020

